

การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฟอยกำจัดแมลงคัตตูรูพีชแบบทำใช้เอง



นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
กรมวิชาการเกษตร

Facebook: กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพีช

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
จำนวน 3,000 เล่ม

การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบทำใช้เอง

ผลงานวิจัย : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย : ดร. นุชนาารถ ตั้งจิตสมคิด
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
E-mail : nuchanart@yahoo.com

Facebook: กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

บทนำ

กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรหลักในการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้ได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำไปขยายผลและถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยในเรื่อง “การจัดการศัตรูพืช” เป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกที่จะต้องมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ที่มุ่งลดการใช้สารเคมีหลายวิธี ได้แก่ การคัดพันธุ์พืชด้านท่านโrocแมลงวิเคราะห์ต่ำที่ปฏิบัติได้จริง และวิธีทางพันธุวิศวกรรม รวมถึงการพัฒนาสารชีวภัณฑ์ต่างๆ มาใช้กำจัดศัตรูพืช โดยทำการศึกษาทดลองตั้งแต่ในระดับห้องปฏิบัติการ โรงเรือน แปลงทดลอง จนถึงการทดสอบร่วมกับเกษตรกรในแปลงปลูก เพื่อได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมวิชาการเกษตรคือ การขับเคลื่อนเทคโนโลยีต่างๆ สู่ผู้ใช้ประโยชน์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นำความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเกษตรกรรมให้สามารถนำไปใช้ได้จริง เกิดการยอมรับของผู้ใช้เทคโนโลยีนั้นๆ และมีการใช้อย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในภาคการเกษตรต่อไป

สารบัญ

หน้า

ความสำคัญ.....	1
ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ไทย.....	2
แหล่งอาศัย.....	2
การเป็นพา拉斯ิตในตัวแมลง.....	2
รูปร่างและลักษณะสำคัญ.....	3
ระยการเจริญเติบโต.....	4
กลไกการฟ้าแมลง.....	5
วงจรชีวิต.....	6
การขยายพันธุ์.....	7
ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง.....	8
ศักยภาพของไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย.....	9
กระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยแบบทำใช้อ่อง.....	11
ชุดผลิตไส้เดือนฝอยพร้อมใช้.....	12
ขั้นตอนการผลิต.....	13
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง.....	13
ขั้นตอนที่ 2 การคลอกอาหารและบรรจุในภาชนะเพาะเลี้ยง.....	14
ขั้นตอนที่ 3 การนึ่งฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุอาหารเพาะเลี้ยง.....	15
ขั้นตอนที่ 4 การใส่หัวเชือไส้เดือนฝอย.....	16
ขั้นตอนที่ 5 การบ่มเพาะเลี้ยง.....	17
ข้อพึงระวังในการกระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย.....	18
งบลงทุนและต้นทุนการเพาะเลี้ยงใช้อ่อง.....	19
การแยกผลผลิตไส้เดือนฝอยจากภาชนะเพาะเลี้ยง.....	20
แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในผัก.....	21
การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูผักอย่างถูกวิธี.....	24
อัตราการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูผัก.....	25
คำแนะนำวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืช.....	26
ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ.....	26
บทสรุป.....	27
บรรณานุกรม.....	28

ความสำคัญ

ปัจจัย กระแสการตื่นตัวของผู้บริโภคพากปลดภัยจากสารพิษมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจากไร่นาจนถึงเบปรูปเป็นอาหารสู่ผู้บริโภค โดยรัฐฯ เร่งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การเกษตรที่ให้ผลผลิตปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรุพืชจึงเป็นงานวิจัยหนึ่งที่กรมวิชาการเกษตร ได้วิจัยและพัฒนาเพื่อได้ชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพนำมาทดสอบหรือลดการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรุพืชลง ในระดับที่ปลอดภัย ไส้เดือนฝอยสกุล *Steinernema* sp. จึงเป็นอีกหนึ่งชีวภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการกำจัดแมลงศัตรุพืช ได้หลายชนิด แต่อย่างไรก็ตาม ไส้เดือนฝอยที่มีจำนวนน้อยเป็นการค้าในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง หาซื้อยาก อาจประสบปัญหาขณะเก็บรักษา และช่วงเวลาในการขนส่งผลิตภัณฑ์ยังมีผลทำให้ไส้เดือนฝอยลดประสิทธิภาพในการฆ่าแมลงได้ จึงทำให้การใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยไม่แพร่หลายเท่าที่ควร

กรมวิชาการเกษตร ได้วิจัยพัฒนาไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ไทย (*Steinernema* sp. Thai strain) ที่มีคุณสมบัติทนทานอุณหภูมิได้สูง มีศักยภาพในการกำจัดแมลงเทียบได้กับสายพันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า นอกจากนี้ยังสามารถเพาะเลี้ยงขยายปริมาณได้ดีในอาหารเทียมราคากูก และมีต้นทุนการผลิตต่ำ ดังนั้น ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยจึงเป็นชีวภัณฑ์อีกชนิดที่สามารถนำไปขยายผลสู่เกษตรกรให้มีการใช้กำจัดแมลงให้แพร่หลายเพิ่มขึ้น โดยกรมวิชาการเกษตร มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตอย่างง่าย ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยใช้เอง ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายในการซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรุพืช หรือสารชีวภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาแพง และเกณฑ์รกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนการใช้ไส้เดือนฝอยยังมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลิตผลเกษตร และปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งไส้เดือนฝอยที่เพาะเลี้ยงเองและนำไปใช้ทันทีจะมีความแข็งแรงและมีศักยภาพในการฆ่าแมลงได้ดี ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการควบคุมแมลงโดยชีววิธีที่เกษตรกรสามารถทำใช้เองได้

ໄສເດືອນຝອຍກໍາຈັດແມລງສາຍພັນຊີ່ໄທຍ

ໄສເດືອນຝອຍກໍາຈັດແມລງສາຍພັນຊີ່ໄທຍ ມີຊື່ອສກລວ່າ *Steinernema* sp. ຈະເປັນສິ່ງມີชົວຫາມາດເລັກ ໄດຍໄສເດືອນຝອຍຮະບະເຂົ້າທ່າລາຍແມລງມອງໄມ້ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ມີລັກຂະນະລຳຕົວກລມຍາວຄລ້າຍເສັນດ້າຍ ມີຄວາມຍາວລຳຕົວເຈລື່ຍ 0.432 ມິລີລິມີຕຣ ແລະຄວາມກວ້າງເຈລື່ຍ 0.022 ມິລີລິມີຕຣ ລຳຕົວໄມ້ແປ່ງເປັນຂັ້ນປັບປຸງລັອງ ມີຜັນໜັ້ນອົກເປັນຮອຍຫຍຸກ ຍືດຫຍຸນໄດ້ ມີວ່າຍະເພື່ອການດ້າຮັງຊົວປະກອບດ້ວຍ ຂອງຂັ້ນຄ່າຍທາງພົວໜັນ ເສັນປະສາທ ທາງເດີນອາຫານ ອົງວ່າຍະສົນພັນຊີ່ແບບແຍກເປັດຜູ້ເປັດເມື່ຍ ແລກລ້າມນີ້ອ ແຕ່ໄມ້ພົບຮະບນໃຫລວຽນໂລທິດ ແລະຮະບນຫາຍໃຈ

ແຫລ່ງອາຄັຍ

ຕົວອ່ອນຮະບະທີ່ 3 ຂອງໄສເດືອນຝອຍຫີ່ອຮະບະເຂົ້າທ່າລາຍແມລງ ຈະອາຄັຍອູ່ໃນດິນທີ່ຮະດັບຄວາມສຶກ 4-6 ນິວ ຊຶ່ງມີການກະຈາຍຕົວໃນໜ່າຍພື້ນທີ່ຂອງປະເທດໄທຍ ພົບໃນເນື້ອດິນທີ່ໜີນິດດິນຮ່ວມ ດິນຮ່ວມປັນທຽມ ແລະດິນເໜີຍວາ ສາມາດຄອງຢູ່ໃນດິນໄດ້ນານ 6-8 ເດືອນ ໂດຍຕົວອ່ອນຮະບະທີ່ 3 ນີ້ຈະໄມ້ກິນອາຫານແລະໄມ້ເຈົ້າຢູ່ເຕີບໂຕໃນຂະອູ່ໃນດິນ ສ່ວນໄສເດືອນຝອຍທີ່ຮະບະການເຈົ້າຢູ່ເຕີບໂຕອື່ນໆ ຈະອາຄັຍອູ່ກາຍໃນຕົວແມລງເທົ່ານັ້ນ ແລະໄມ້ຖນທານຕ່ອສກາພແວດລ້ວມກາຍນອກຕົວແມລງ

ການເປັນພາරາສີໃນຕົວແມລງ


ໄສເດືອນຝອຍ *Steinernema* sp. ເປັນພາරາສີໄດ້ທັງໃນຮະບະຕ້າຫນອນແລະຕົວເຕີນວ້າຍຂອງແມລງ ສາມາດເຈົ້າຢູ່ເຕີບໂຕແລະຂໍຍາຍພັນຊີ່ໃໝ່ລູກຮຸ່ນໃໝ່ກາຍໃນລຳຕົວ



ຂອງຫນອນຍ່າງຕ່ອງເນື່ອງ ຈະແມລງຫີ່ອຫນອນ ເໜລືອແຕ່ໜ້າກ ຈຶ່ງເຄີ່ອນທີ່ອອກຈາກໜ້າກເໜື້ອໃນໜ້າງທີ່ເປັນຕົວອ່ອນຮະບະທີ່ 3 ລົງສຸດດິນ ຊຶ່ງຕົວອ່ອນຮະບະທີ່ 3 ນີ້ ມີຄວາມທານທານຕ່ອສກາພແວດລ້ວມໄດ້ດີທີ່ສຸດ ສາມາດຄອງຢູ່ໃນດິນເພື່ອຮອ່ຍແມລງໃໝ່ໄດ້ນັກກວ່າ 6 ເດືອນ ໂດຍພົບວ່າແມລງຮະບະຕ້າຫນອນ ລ່າຍໜີນິດເປັນແໜ່ງອາຫານທີ່ດີຂອງໄສເດືອນຝອຍສາຍພັນຊີ່ໄທຍ ເມື່ອເຂົ້າໄປເປັນພາරາສີໃນຕົວຫນອນ ຈະສາມາດເຈົ້າຢູ່ເຕີບໂຕແລະຂໍຍາຍພັນຊີ່ໄດ້ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ໃ້ວລູກຮຸ່ນໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ 10,000-100,000 ຕັ້ວຕ່ອງຫນອນ 1 ຕົວ (ຢືນກັບໜີນິດແລະຂະນາດຂອງຫນອນ)

รูปร่างและลักษณะสำคัญ


ตัวอ่อนระยะที่ 3




ริมฝีปากและช่องปากเพศเมีย



อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย




อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้



ระยะการเจริญเติบโต

ໄສເດືອນຝ່ອຍກໍາຈັດແມ່ລົງສາຍພັນອີໄທຍ ມີຮະຍາກເຈົ້າຈຸດຕະຫຼາດໄຊມີ
ການພັດນາຈຸນເປັນຕົວອ່ອນຮະຍະທີ 1 ຈາກນັ້ນເຈົ້າຈຸດຕະຫຼາດໄຊມີ
4 ໂດຍວິທີລອກຄຽບ ແລະພັດນາເປັນຕົວເຕີມວ້າຍແບ່ງແຍກເປັດເປັນເປັດຜູ້ແລະເປັດເມີຍ

ໄສເດືອນຝ່ອຍຮະຍະຕົວອ່ອນມືຂັ້ນນາດເລີກນາກ ມອງໄມ່ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ຕົ້ນໃໝ່
ກລັອງຈຸລທຣສົນໜີ້ວ່າເລັນສົ່ງຍາຍນາດ 30 ເທົ່ານັ້ນໄປ ຈຶ່ງສາມາດຄົມອງເຫັນໄດ້



กลไกการฆ่าแมลง

เมื่อไสเดือนฝอยที่อาศัยอยู่ในดินพบรแมลงเหี้ย จะเคลื่อนที่เข้าสู่ตัวแมลงโดยผ่านทางช่องเปิดตามธรรมชาติได้แก่ ทางปาก ช่องขับถ่าย หรือรูหายใจทางผิวนัง จำนวนนี้เข้าสู่ช่องว่างภายในตัวแมลงซึ่งมีน้ำเลือด ไสเดือนฝอยจะปลดปล่อยแบคทีเรียแกรมลบ *Xenorhabdus* sp. ที่อาศัยอยู่บริเวณลำไส้ส่วนหน้าของไสเดือนฝอยระยะเข้าทำลายลงสู่กระเพาะเลือดของแมลง โดยแบคทีเรียดังกล่าวจะสามารถสร้างสารพิษที่มีผลทำให้แมลงเกิดภาวะเลือดเป็นพิษ และตายอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง และสีของลำตัวแมลงจะเปลี่ยนเป็นสีดำแต่ไม่น่าจะ




วงจรชีวิต

วงจรชีวิตเริ่มจากไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 เข้าสู่ตัวแมลงโดยแมลงกินเข้าไปหรือเข้าตามซ่องเปิดตามธรรมชาติของแมลง จากนั้นเคลื่อนตัวเข้าสู่น้ำเลือดของแมลงพร้อมปล่อยแบคทีเรียที่เรียกว่าสารพิษเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เลือดแมลงเป็นพิษ แมลง死ยีอจะตายภายในเวลา 12-24 ชั่วโมง เชลล์ของแบคทีเรียสามารถเพิ่มปริมาณในน้ำเลือดของแมลง และไส้เดือนฝอยจะใช้เชลล์ของแบคทีเรียในการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ โดยไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 เมื่ออยู่ในตัวแมลงจะเจริญเติบโตโดยวิธีการลอกคราบ จากตัวอ่อนระยะที่ 3 เป็นตัวอ่อนระยะที่ 4 จากนั้นพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยแยกเพศผู้และเพศเมีย โดยตัวเต็มวัยเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ 3 เท่า สามารถผลิตไข่ได้มากกว่า 800-1,000 ฟอง ต่อตัวเมีย 1 ตัว มีการจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อไข่ได้รับการผสมจะพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะที่ 1 ในไข่ และฟักออกจากไข่ ลอกคราบเป็นตัวอ่อนระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ตามลำดับ ใช้เวลาประมาณ 4-5 วันต่อ 1 รอบวงจรชีวิต โดยจะช้าหรือเร็วขึ้นกับอุณหภูมิและชนิดของแมลง死ยีอ และจำนวนรอบของวงจรชีวิตยังขึ้นกับขนาดของแมลง อยู่ระหว่าง 1-3 ชั่วอายุ เมื่อแมลงเริ่มแห้งเป็นซาก ไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 จะสะสมอาหารสำรองประเภทไขมันบริเวณเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างผิวนังกับกล้ามเนื้อซ่องห้อง และดุดกกลืนเชลล์แบคทีเรียเก็บไว้บริเวณลำไส้ส่วนหน้า ก่อนเคลื่อนตัวออกจากการดูดของแมลง เพื่อรอแมลง死ยีอตัวใหม่ต่อไป



การขยายพันธุ์



ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง

ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง หมายถึง “ไส้เดือนฝอยที่มีชีวิตและมีคุณสมบัติในการข่าแมลง” ได้หลายชนิด ในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง สามารถผลิตขยายได้ในอาหารเที่ยมปริมาณมากๆ มีวิธีการนำไปใช้ที่ง่ายและสะดวก โดยการพ่นไปกับน้ำให้ถูกตัวแมลงระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย หรือใช้วิธีรดหรือคลุกคืนในบริเวณที่มีแมลงศัตรุพืชระบาด รวมทั้งชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยมีความปลอดภัยต่อพืช สัตว์เลือดอุ่น มนุษย์ และไม่มีมลพิษต่อสภาพแวดล้อม

การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงเป็นการค้า มีจำนวนน่ายในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย กันอย่างแพร่หลาย โดยชนิดของไส้เดือนฝอยที่นำมาผลิตมีจำนวน 12 ชนิด 2 สกุล คือ *Steinernema carpocapsae*, *S. feltiae*, *S. glaseri*, *S. kraussei*, *S. kushidai*, *S. riobrave*, *S. scapterisci*, *Heterorhabditis bacteriophora*, *H. indica*, *H. marelata*, *H. megidis* และ *H. zealandica* ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง เช่น บรรจุผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยในตันทรายตันเนี้ยวย และตันร่วน บรรจุในสารอัลจิเนต และบรรจุในฟองน้ำสังเคราะห์ เป็นต้น รวมทั้งประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยจำนวนน่ายเป็นการค้า บรรจุในสารโพลิเมอร์ในถุงรูปทรงสามเหลี่ยม

ผลิตภัณฑ์จำนวนน่ายในอเมริกา



ชื่อผลิตภัณฑ์ NemAttack
ของบริษัท ARBICO Organics
บรรจุ 5 ล้านตัว
ราคาจำนวนน่าย 512 บาท

ผลิตภัณฑ์จำนวนน่ายในไทย



ชื่อผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย
ของกรมวิชาการเกษตร
บรรจุ 5 ล้านตัว
ราคาจำนวนน่าย 40 บาท

ศักยภาพของไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย

ไส้เดือนฝอย *Steinernema* สายพันธุ์ไทย มีศักยภาพในการควบคุมแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ แมลงในกลุ่มหนอนผึ้งเลือด และกลุ่มหนอนด้วง เช่น หนอนไข่ผัก หนอนกระทุ่นมอ หนอนกระทุ่นผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย ด้วงหมัดผัก หนอนด้วงในฟาร์มไก่ ด้วงกุหลาบ หนอนด้วงแมลงปุนหลวง ตลอดจนมีศักยภาพในการใช้กำจัดปลวกในสวนผลไม้ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และปลวกทำลายกล้าไม้สวนปา

นอกจากนี้ ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยมีคุณสมบัติทนทานอุณหภูมิได้สูง 38 องศาเซลเซียส เหมาะสมที่จะนำมาใช้กำจัดแมลงในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนเช่น ประเทศไทย และยังเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณได้ง่ายในอาหารเทียมราคากูก กเกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเพาะเลี้ยงใช้เองได้ด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ไม่ยุ่งยากใน การเตรียม ทำเองได้ง่าย และต้นทุนต่ำ เพื่อนำไปใช้กำจัดแมลงศัตรูเป้าหมาย ทดแทนสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ความสำเร็จของเทคโนโลยีได้เทคโนโลยีหนึ่งที่นักวิจัยคิดค้นได้มากนั้น
ไม่เพียงแต่ได้ทฤษฎีหรือกระบวนการหรือรูปแบบหรืออุปกรณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงความ
สามารถในการนำไปขยายผลและใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสิ่งสำคัญคือ
การยอมรับของผู้ใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีนั้นจึงจะประสบ
ผลสำเร็จอย่าง

ແທ້ຈິງ
ເຕັມໄຕ
ເປົກອະນຸມາເມຍ
ກະຊະເຈດເສດຖະກູບຜູ້ກະຍາ
ຜູ້ກະຍາແຫຼງໃຈເຕັມໄຕ
ອຸປະກອນເມືອນສາຍາ ແລະ ອຸປະກອນເກມພາຫຼາ
ຽນຄູ່ຈຳຕະຫຼາດໃຈເຕັມໄຕ
ກະຊະເຈດເສດຖະກູບຜູ້ກະຍາ
ກະຊະເຈດເສດຖະກູບຜູ້ກະຍາ

กระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฟอยแบบทำใช้เอง

การเพาะเลี้ยงไส้เดือนฟอยสายพันธุ์ไทยใช้เอง เป็นเทคโนโลยีการเพิ่มขยายไส้เดือนฟอยให้ได้ปริมาณมากๆ เพื่อนำไปใช้พ่นกำจัดแมลงศัตรูเป้าหมาย ในแปลงปลูก โดยเฉพาะแมลงที่เป็นคัต|รุสาคัญในผัก ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนกระทุ่อม หนอนกระทุ่ม และด้วงหมัดผัก รวมทั้งการใช้กำจัดด้วยกุหลาบ หนอนแมลงนุนหลวงและปลวกทำลายรากมันสำปะหลัง ด้วยวิธีทำอย่างง่ายๆ สะดวก ประหยัดเวลา และลดต้นทุน โดยการใช้ชุดผลิตไส้เดือนฟอยสำเร็จรูปพร้อมใช้ ซึ่งประกอบด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ที่มีราคาถูก ใช้งานง่าย มีขั้นตอนการเตรียมไม่ยุ่งยาก และใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงเพียง 1-2 ตารางเมตรเท่านั้น สามารถผลิตไส้เดือนฟอยได้จำนวนมากเพียงพอต่อการใช้พ่นเพื่อกำจัดแมลงครอบคลุมพื้นที่ปลูก 1 ไร่ ต่อ 1 รอบการผลิต และผลิตขยายได้อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะเลี้ยงด้วยตนเอง และจะมีไส้เดือนฟอยใช้กำจัดแมลงตลอดฤดูปลูก ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
| |



ผลผลิตไส้เดือนฟอยระยะเข้าทำลายแมลง
ที่เพาะเลี้ยงจากอาหารเทียม

ஆட்டுப்பிளிட் லைடீவன் பாய்ப்ராம் இசை



ஆப்ராண்ட் ஆட்டுப்பிளிட்

1. மஹாநீங்கூரை அலை விழா 1,500 வட்டி ஞாட லைன் பாஸ்கூனிய்கலாங் 40 செ. ஸுங் 40 செ. ப்ராம் பென் தெரங்கரங் வாங் மஹாநீங்கூரை பீங் காங்கி வை காஷநை சென்றா ஜான்வன் 1 னை
2. காஷநை பல அலை பாபீட் ப்ரீமாட்ர 1.6 லிட்டர் ஜான்வன் 1 னை
3. காஷநை கலுகா அலை லைன் பாஸ்கூனிய்கலாங் 30 செ. ஸுங் 12 செ. ஜான்வன் 1 னை
4. காஷநை பருஞா அலை ரூப்ட்ரங்கரங்காக லைன் பாஸ்கூனிய்கலாங் 11 செ. ஸுங் 9 செ. மீரு ஜெலெகி தீ பாபீட் ஜான்வன் 20 னை
5. குங்கா ஸ்திக்கநர் ஒன்னாட 24 x 36 நீங் ஜான்வன் 1 னை
6. கர்஬ங்கி எலக்கா சோட் 70% ஸ்தா ஹ்ரங்கை சென்றா
7. ஆப்ராண்ட் ஹ்ரங்கை டையானாட 20 மி. ப்ராம் பீம் பெர் 18
8. பாசீட் தமது வகை சாதா 1 பீன்
9. குங்கா மெல்ல ஸ்தா ஹ்ரங்கை பாய்ப்ராம் பாய் லீயங் கந்மை பாய் ஜான்வன் 1 னை
- காட்டுப்பிளிட்
 10. அலை பாய் லீயங் (இந்த 4 பாங் + நீங்கூரை 130 மி.ல் + நீங் 260 மி.ல் தோகா பாய் லீயங் 1 க்ரங்கு)
 11. காங்கா ஹ்ரங்கை ஸ்தா ஹ்ரங்கை 1 x 1 செ. (நீங்கூரை 40 க்ரங்கு தோகா பாய் லீயங் 1 க்ரங்கு)
 12. ஹ்ரங்கை லைடீவன் பாய் ஜான்வன் 1 குங் (ப்ராஜி 1 லான்தா தோகா பாய் லீயங் 1 க்ரங்கு)

12

Facebook: கலூம் நான் விஜியகார் இசை ஸ்தா ஹ்ரங்கை கால்த்துறை பீங்

ขั้นตอนการผลิตไส้เดือนฟอย

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง

สูตรอาหารเที่ยมชนิดแข็งกึ่งเหลวที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงขยายไส้เดือนฟอย ประกอบด้วยแหล่งสารอาหาร 2 ชนิดที่สำคัญคือ โปรตีนจากไข่ไก่หรือไข่เป็ด ผสมไขมันที่ได้จากสัตว์ (น้ำมันหมู) เป็นแหล่งอาหารที่สามารถหาได้ง่าย และราคาถูก มีอัตราส่วนผสมคือ

สูตรอาหาร : ไข่ไก่หรือไข่เป็ด + น้ำมันหมู + น้ำสะอาด อัตราส่วน 4 : 2 : 4

เตรียมอาหารปริมาณ 650 มล. ประกอบด้วยไข่ไก่หรือไข่เป็ด (4-5 ฟอง) 260 มล. + น้ำมันหมู 130 มล. + น้ำสะอาด 260 มล. ผสมอัตราส่วนดังกล่าวในภาชนะผสมอาหาร ปิดฝาให้สนิท และเขย่าให้อาหารรวมเป็นเนื้อเดียวกัน



ขั้นตอนที่ 2 การคลุกอาหารและบรรจุในภาชนะเพาะเลี้ยง



1

นำแผ่นฟองน้ำจำนวน 4 แผ่น ตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 1x1 ซม. ได้ก้อนฟองน้ำหนานนัก 40 กรัม ใส่ในภาชนะ จากนั้นเทอาหารเพาะเลี้ยงสูตรไข่ผสมน้ำมันหมูผสมน้ำที่เตรียมแล้วลงบนก้อนฟองน้ำ ใช้มือคลุกเคล้าผสมให้อาหารดูดซึบในก้อนฟองน้ำให้ทั่วทุกภายนอก ได้เป็นก้อนอาหาร จากนั้นนำไปบรรจุในภาชนะแบบใส่ลงในภาชนะบรรจุอาหารรูปทรงกระบอก จำนวน 20 ใบ เหลือเท่ากัน และปิดภาชนะด้วยฝาที่มีรูขนาดเล็ก ซึ่งจะเจาะไว้บริเวณกลางฝา เตรียมนำไปอบนึ่งฆ่าเชื้อในขั้นตอนต่อไป



2



4



3



5

14

Facebook: กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ขั้นตอนที่ 3 การนึ่งขาเขือภาคและบรรจุอาหารเพาะเลี้ยง

เติมน้ำลงในหม้อปริมาตร 5 ลิตร แล้วนำตะแกรงรองใส่ลงไปในหม้อเพื่อกันภาชนะบรรจุก่อนอาหารแช่น้ำ จากนั้นนำถุงพลาสติกทันร้อนขนาด 24 x 36 นิ้ว ที่ตัดปลายก้นถุงทึบสองด้านสวมลงไปในหม้อ และนำภาชนะบรรจุก่อนอาหารเพาะเลี้ยงที่เตรียมไว้ใส่ในถุงพลาสติก เรียงเป็นวงตามรูปทรงของหม้อ ในແຄວที่ 1 จำนวน 8 ใบ ແຄວที่ 2 และ 3 จำนวน 7 และ 5 ใบ ตามลำดับ โดยวางสับหว่างกันในແຕ່ລະແກ້ รวมทั้งหมด 20 ใบต่อการนึ่ง 1 ครั้ง รวมปากถุงพลาสติกหลุมๆ จากนั้นทำการปิดฝาหม้อ เสียบปลั๊กไฟ หมุนปุ่มปรับกำลังไฟที่ระดับ 5 และหมุนปุ่มตั้งเวลาอัตโนมัติที่ 60 นาที เมื่อครบเวลาจะให้พักภาชนะบรรจุอาหารไว้ในหม้อประมาณ 30 นาที และจึงนำออกมาทำการเชี่ยวภาคและบรรจุอาหารเบาๆ ให้ก่อนอาหารกระจายไม่ติดเป็นกลุ่ม นำไปตั้งวางให้เย็นก่อนใส่หัวเชือก่อนใส่เดือนฝอย




ขั้นตอนที่ 4 การใส่หัวเชือไส้เดือนฟอย

ใช้แอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นลงบนผ้าสะอาด นำผ้าไปเช็ดฝ่าเชือบริเวณพื้นที่ใส่หัวเชือ มือของผู้ปฏิบัติ และภาชนะบรรจุอาหารเพาะเลี้ยงที่ผ่านการนึ่งแล้วโดยเฉพาะบริเวณฝาภาชนะ จากนั้นใช้กระบอกฉีดยาปิมิตาร 20 มิลลิลิตร พ่วงเข็มเบอร์ 18 ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แทงผ่านถุงบรรจุหัวเชือและดูดไส้เดือนฟอยจากถุงหักหมัดในครั้งเดียว และนำไปฉีดผ่านรูที่ฝาของภาชนะบรรจุอาหาร ลงสู่ก้อนอาหาร โดยแบ่งใส่ประมาณ 1 มิลลิลิตรต่อภาชนะ (1 มิลลิลิตร มีหัวเชือ 50,000 ตัว) รวม 20 ภาชนะ และทำการเขย่าภาชนะเบาๆ ให้หัวเชือไส้เดือนฟอยกระจายทั่ว ก้อนอาหาร



ขั้นตอนที่ 5 การปั่นเพาะเลี้ยง

นำภาชนะบรรจุก้อนอาหารที่ใสหัวเชื้อแล้วไปตั้งวางในถุงมังกันแมลงนำไปปั่นเพาะในห้องที่มีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิขณะปั่นเพาะไม่ร้อนเกินไป (อุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่าง $27\text{--}33^{\circ}\text{C}$ และไม่เกิน 35°C) ใสเดือนฟอยจะเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ภายในภาชนะเพาะเลี้ยงจนอาหารหมด ใชเวลาประมาณ 7 วัน อาจสังเกตเห็น ใสเดือนฟอยเคลื่อนที่กระบวนการเพาะเลี้ยงเป็นเส้นทางข่ายสีขาวหรือรวมกลุ่มกันเป็นกระจุก



การใสหัวเชื้อใสเดือนฟอยเริ่มต้นจำนวน 50,000 ตัวต่อภาชนะเพาะเลี้ยง และตั้งวางปั่นเพาะเป็นเวลา 7 วัน ใสเดือนฟอยจะเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ในอาหารเพาะเลี้ยง เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 300 เท่า หรือเฉลี่ยเท่ากับ 15 ล้านตัวต่อภาชนะ

ดังนั้น การเตรียมอาหารปริมาตร 650 มิลลิลิตร เพาะเลี้ยงได้ 20 ภาชนะ ใช้เวลาในการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ เตรียมอาหาร และใสหัวเชื้อ ไม่เกิน 30 นาที และรอเวลาการนึ่งผ้าเชื้อและให้อาหารเย็นก่อนใสหัวเชื้อประมาณสองชั่วโมง เกษตรกรสามารถเพาะขยายใสเดือนฟอยได้ 250-350 ล้านตัวต่อ 1 รอบการผลิต และนำไปใช้พ่นกำจัดแมลงศัตรูพืชครอบคลุมพื้นที่ 1 ไร่ (ขึ้นกับชนิดและขนาดของแมลง)

ข้อพึงระวังในการกระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฟอย

ทุกขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฟอยในอาหารสูตรไข่ผสมน้ำมันหมู และน้ำ มีข้อพึงระวังดังต่อไปนี้ 1 จนถึงขั้นตอนที่ 1 ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่ประสบผลสำเร็จในการเพาะขยาย สาเหตุมาจากการปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ไส้เดือนฟอยไม่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์หรือเพิ่มจำนวนได้น้อยคือ

1. การใช้อาหารเพาะเลี้ยงที่ไม่มีคุณภาพ ได้แก่ ไข่หมุดอ่าย น้ำมันหมูเก็บไวนานเกินไป และน้ำไม่สะอาด นำมาใช้เป็นวัตถุคิด ทำให้คุณค่าของสารอาหารไม่เพียงพอให้ไส้เดือนฟอยเจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์ลดลง

2. การผสมสูตรอาหารไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน ไข่แดงยังเป็นก้อนไม่แตกรวมกับน้ำมันหมูและน้ำ ทำให้เนื้อของอาหารไม่สม่ำเสมอเมื่อนำไปคลุกกับก้อนฟองน้ำ

3. การคลุกอาหารกับก้อนฟองน้ำไม่ทั่วถึงทุกก้อน บางก้อนมีอาหารและเกินไป หรือบางก้อนแห้ง

4. เกิดการปนเปื้อนจากจุลทรรศน์อื่นๆ ได้แก่ รา และแบคทีเรีย มีโอกาสปนเปื้อนมากที่สุดในช่วงการใส่หัวเชื้อผ่านรูที่ฝาภาชนะบรรจุอาหาร ซึ่งมีสปอร์ของจุลทรรศน์แพร่กระจายทั่วในอากาศ พื้นที่ใส่หัวเชื้อ และมือของผู้ปฏิบัติ จึงควรทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนใส่หัวเชื้อ รวมทั้งในช่วงตั้งวางปุ่มเพาะไม่ควรหยิบจับภาชนะเพาะเลี้ยง และควรตั้งวางในพื้นที่ที่สะอาด ปราศจากมด เมลงหรี่เมลงวัน หรือเมลงอื่นๆ เลือดลอดเข้ามาในถุงมุ้ง



5. การใช้หัวเชื้อไส้เดือนฟอยที่หมดอายุแล้ว จึงควรตรวจสอบวันหมดอายุก่อนใช้ทุกครั้ง โดยหัวเชื้อมีอายุ 1 เดือน ซึ่งมีระบุวันที่ผลิตบนถุงบรรจุ

6. การนำอุปกรณ์ชุดผลิตมาใช้ครั้งต่อไป ควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานหรือน้ำสบู่ และผึ่งให้แห้งก่อนใช้ ได้แก่ ภาชนะผสมอาหาร ภาชนะคลุกอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร และระบบออกซิเจนพาร์กัมเข้ม

งบลงทุนและต้นทุนการเพาะเลี้ยงไข้ส่อง

การเพาะเลี้ยงไข้ส่องเดือนฟอยแบบทำไข้ส่อง ประกอบด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นในกระบวนการเพาะเลี้ยง โดยแบ่งเป็นอุปกรณ์การเพาะเลี้ยงคิดเป็นงบลงทุนเริ่มต้น และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติต่อครั้งคิดเป็นต้นทุน ดังนี้

งบลงทุนเริ่มต้น	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)
ชุดผลิตไข้ส่องฟอยพร้อมใช้		
1. ชุดหม้อนึ่งไข้อาหารชนิดไฟฟ้า 1,500 วัตต์	1 ชุด	7,000
2. ภาชนะผสมอาหาร	1 ใบ	30
3. ภาชนะคลุกอาหาร	1 ใบ	25
4. ภาชนะเพาะเลี้ยง	20 ใบ	160
5. ถุงพลาสติกทนร้อน	1 ใบ	5
6. กระบอกน้ำดีพาร์กอัลกอร์ 70%	1 ใบ	60
7. กระบอกน้ำดียาพาร์กอัลกอร์	1 ชุด	20
8. ผ้าเช็ดทำความสะอาด	1 ผืน	20
9. ถุงมุ้งกันแมลง	1 ใบ	180
รวมงบลงทุนเริ่มต้น		7,500

หมายเหตุ : อุปกรณ์สามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ได้มากครั้ง

ต้นทุนการเพาะเลี้ยงต่อครั้ง	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1. ไข่ไก่/ไข่เป็ด	4 ฟอง	20
2. น้ำมันหมู	130 มล.	10
2. แผ่นฟองน้ำ 4 แผ่น ตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม 1x1 ซม. 40 กรัม	40 กรัม	40
3. หัวเชือกไข้ส่องฟอย	1 ถุง	20
รวมต้นทุนต่อครั้ง		90

การแยกผลผลิตไสเดือนฟอยจากภาชนะเพาะเลี้ยง

ไสเดือนฟอยสายพันธุ์ไทยที่บ่มเพาะเลี้ยงในภาชนะเป็นเวลา 7 วัน จะได้เป็นสารชีวภัณฑ์พร้อมใช้ทันที หรือเรียกว่า เชื้อสด เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 8 จนถึง 14 วันหลังบ่มเพาะ 7 วัน วิธีการแยกไสเดือนฟอยออกจากก้อนอาหาร ปฏิบัติได้ดังนี้

1. เก็บก้อนอาหารที่บ่มเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 7 วัน ลงในภาชนะ (กระถางมังหรือถังพลาสติก) ใช้น้ำล้างไสเดือนฟอยที่ติดอยู่รอบๆ ภาชนะเพาะเลี้ยงออกให้หมด



- 2.เติมน้ำให้ท่วมก้อนอาหารพร้อมหมัดน้ำยาล้างจานลงไปเล็กน้อยเพื่อช่วยลดคราบไขมัน จากนั้นใช้มือกวนและขยี้ก้อนอาหารให้ไสเดือนฟอยหลุดออกจากมอยในน้ำ และบีบก้อนฟองน้ำแยกทิ้งไป



3. เทน้ำที่ได้ทิ้งหมดผ่านตะแกรงหยาบหรือกระชอนเพื่อกรองแยกก้อนฟองน้ำที่เหลืออยู่ทิ้งไป ส่วนของน้ำที่ผ่านตะแกรงลงสู่ภาชนะรองรับ จะมีไสเดือนฟอยจำนวนมาก จากนั้นนำไปใส่ถังพ่นสารชนิดสะพายหลัง เติมน้ำครบ 20 ลิตร



แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในนา



แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในผัก

แมลงศัตรูสำคัญในแปลงผักที่พบสร้างความเสียหายในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะผัก กินใบ ผู้ปลูกควรทราบลักษณะการทำลาย วิธีรักษาของแมลง เพื่อวางแผนในการป้องกันกำจัดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แมลงศัตรูผักที่สำคัญคือ



หนอนไยผัก ระบาดทำความเสียหายอย่างรุนแรงกับพืชผัก ตระกูลกระหลาชนิดต่างๆ โดยตัวหนอนจะหักกินผิวใบเป็นด้านล่าง เป็นวงกว้างและมักทิ้งผิวใบเป็นบ่นซึ่งมีลักษณะโปรงแสง เอาไว้ หากมีการระบาดรุนแรงจะกัดกินใบจนเป็นรูพรุนเหลือแต่ก้านใบหรือถ้าเกิดกับผักในระยะต้นอ่อน หนอนจะกัดทำลายส่วนยอดจนผักจะงอกการเจริญเติบโต สำหรับผักในระยะออกดอก – ติดฝัก ดอกและฝักอาจถูกทำลายหมดไปได้ นิสัยของหนอนไยผักเมื่อถูกตัวจะดันและสร้างไบ ทิ้งตัวห้อยลงบนพื้นดิน จึงเรียกชื่อของหนอนชนิดนี้ว่า หนอนไยผัก

วิธีรักษา ตัวเมียเดิมวัยวานไปเป็นกล่มๆ ละ 2 – 3 ฟอง ใต้ใบผัก ไข่จะมีขนาดเล็ก สีเหลือง ลักษณะค่อนข้างกลมแบน ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนภายใน 3 วัน ตัวหนอน เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดยาว 10 มม. ลักษณะของตัวหนอนส่วนหัวและส่วนท้ายจะแหลม ส่วนท้ายจะมีปุ่มยื่นเป็น 2 แฉก สีลำตัวอาจเป็นสีเขียวเหลืองหรือเขียวปนเหลือง ระยะตัวหนอนใช้เวลาประมาณ 7 วัน และจะเข้าดักแด้ โดยมีไข่บางๆ หุ้มอยู่บริเวณใต้ใบ ระยะตัวแรก 3 – 4 วัน และออกเป็นตัวเต็มวัย ผสมพันธุ์-วางไข่ต่อไป ตัวเต็มวัยมีอายุสั้นประมาณไม่เกิน 7 วัน ดังนั้นการปลูกผักฤดูหนึ่งๆ จะมีหนอนทำลายหลายครั้ง

ตัวหน้มดผัก พนเข้าทำลายพืชผัก 2 ชนิด คือ ตัวหน้มดผัก แอบลาย และตัวหน้มดผักสิน้ำเงิน เป็นแมลงปีกแข็ง ขนาดลำตัวยาว 2 มม. มีขาคู่หลังที่แข็งแรง สามารถจะกระโดดหนีได้เมื่อถูกรบกวน ตัวเต็มวัยของตัวหน้มดทำลายพืชผัก โดยการกัดกินใบจนเป็นรูพรุน ถ้าเป็นผักในระยะกล้าจะกระแทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโต ในผักที่เติบโตแล้วก็จะทำให้คุณภาพของผักลดลง ตัวหนอนของตัวหน้มดจะอาศัยกัดกินรากพืชผักและวัชพืช ทั่วๆ ไปอยู่ในดิน ผักจำพวกผักกาดที่มีกลิ่นฉุน เช่น ผักกาดหัว ผักกาดเขียว ผักกาดตั้ง และผักขม เป็นพืชผักที่ตัวหน้มดชอบทำลาย สำหรับผักกาดหัวตัวเต็มวัยของตัวหน้มดจะทำลายส่วนของใบ และตัวหนอนจะทำลายส่วนของหัวให้ติด



วิธีรักษา ตัวเต็มวัยจะวางไข่ในดินใกล้กับรากพืช ตัวหนอนจะเจริญเติบโตอยู่ในดิน เมื่อโตเต็มที่จะมีลักษณะผอมยาว สีใส และเข้าดักแด้ในดิน หลังจากนั้นก็จะออกมาระบุในตัวเต็มวัย



หนอนกระทุ่ห้อม เป็นหนอนที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในภาคกลาง หนอนกระทุ่ห้อมมีนิสัยกัดกินส่วนต่างๆ ของพืช และระบาดค่อนข้างรวดเร็ว หนอนจะหลบซ่อนตัวตามซากใบในภาคกลางทำให้การพ่นยาถูกตัวได้ยาก ปัจจุบันพื้นที่ปลูกห้อมในภาคกลางกำลังลดลง เนื่องจากหนอนชนิดนี้กำจัดยาก จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับชาวสวนผักจำพวกกะหล่ำ

วงจรชีวิต ตัวเมียวางไข่ครั้งละ 20-80 ฟอง มีไข่สีขาวปุกคลุม ระหว่างเวลา 16.00-20.00 น. ไข่จะพักเป็นตัวหนอนภายใน 72 ชั่วโมง มี 6 วัย ตัวหนอนมีลำตัวตรงราบเรียบ เท่ากันตลอดตัวแต่หัวถึงท้ายลำตัว มีแคนสีขาวข้างลำตัว แคนสีมีได้หลายสีด้วยกัน หนอนโตเต็มที่ยาว 2.5-3.0 ซม. ระยะหนอน 14-17 วัน เข้าดักแด๊ในเดือน 5-7 วัน ก็เป็นผีเสื้อ ตัวเมียตัวหนึ่งวางไข่ได้หลายร้อยฟอง

หนอนกระทุ่ผัก พับปอยในผักจำพวกกะหล่ำ คะน้า และผักกาด ความรุนแรงมักเกิดจากตัวหนอนที่มีขนาดโตกัดกินใบหรือก้าน หรือเข้าไปทำลายในหัวหรือดอกของกะหล่ำ การระบาดเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆ เนื่องจากแมลงผีเสื้อวางไข่เป็นกลุ่ม เมื่อพืกออกมาระบุไข่จะรุนทำลายใบหรือต้นผักทันที ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรวดเร็ว



วงจรชีวิต ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน วางไข่เป็นกลุ่มๆ บนใบพืช 200-300 ฟอง กลุ่มไข่มีขนสีน้ำตาลปุกคลุม ระยะไข่ 3-7 วัน หนอนเมื่อออกจากไข่ใหม่ๆ มีสีเขียวอ่อน อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เมื่อหนอนอยู่ในวัยที่ 2-3 วัน แฉกกลุ่มกันออกทำลายพืชไปจนโต หนอนโตเต็มที่วัดได้ 3-4 ซม. ระยะหนอนประมาณ 14-21 วัน เข้าดักแด๊ในเดือนตุลาคม แต่จะระเหงหรือกองเศษพืช ดักแด๊เมื่อสิ้นตุลาคมต่อ ยาว 1.5-1.8 ซม. ระยะดักแด๊ 7-12 วัน




หนอนคีบ เป็นหนอนผีเสื้อที่สำคัญมากชนิดหนึ่ง ทำความเสียหายให้แก่ผักในตระกูลกะหล่ำหลายชนิด โดยเฉพาะกะหล่ำ และคะน้า โดยหนอนกัดกินใบเป็นส่วนใหญ่ การทำลายจะเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อหนอนโตขึ้น หนอนคีบจะกัดกินเนื้อใบและเหลือไว้แต่เส้นใย เมื่อเกิดระบาดมักจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตัวแมลงผีเสื้อจะวางไข่กระจัดกระจายทั่วไปในแปลงผัก

วงจรชีวิต แมลงผีเสื้อวางไข่ใบเดี่ยวๆ ลักษณะกลมสีครีม ระยะจัดการจ่ายอยู่ต่ำไปผัก ระยะไข่กินเวลา 3 วัน จึงพกออกมาระบุเป็นตัวหนอน ตัวหนอนเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดยาว 40 มม. ลำตัวมีสีเขียวอ่อน มีเส้นสีขาวพาดยาวตามลำตัว ระยะหนอนใช้เวลา 14 วัน จึงเข้าดักแด๊ตัวใบผักโดยมีเส้นใบบางๆ คลุมไว้ ระยะดักแด๊ 7 วัน จึงออกมาระบุเป็นตัวเต็มวัย

การใช้ไสเดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูผักอย่างถูกวิธี

การใช้ไสเดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเพื่อกำจัดแมลงศัตรูผัก ได้แก่ คบง หวาน หวานตุ้ง และผักกาดขาว ซึ่งมีอายุปุลก 45 วัน และแมลงศัตรูลำคำัญที่พบเข้าทำลายใบผักคือ หนอนใยผัก หนอนกระทุ้นผัก หนอนกระหุ่ม หนอนคีบ และตัวหมัดผัก การใช้ไสเดือนฝอยพ่นกำจัดแมลงเป้าหมายเหล่านี้ จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตและการระบาดของแมลง เพื่อวางแผนการเพาะเลี้ยงไสเดือนฝอย และการใช้ที่เหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพ่นเชื้อภัยที่ไสเดือนฝอย ซึ่งขึ้นกับอัตราและจำนวนครั้งของการพ่นสัมพันธ์กับการระบาดของแมลงในแปลงปุลก หากพบรอบมากควรพ่นทุก 5-7 วัน ถ้าระบาดหน้อยสามารถลดจำนวนครั้งลงเป็นทุก 10 วัน

ดังนั้น เกษตรกรจึงควรสำรวจ แปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบแมลงศัตรูผักลำคำัญ 5 ชนิดนี้ จำนวน 1 ตัวต่อ 2 ต้น ควรทำการใช้ไสเดือนฝอยพ่นกำจัดทันที เพื่อความคุ้มประชารกร และการแพร่ระบาดของแมลงเหล่านี้ ก่อนที่มาความเสียหายให้กับใบผัก



วัตถุการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงคัตตูร์ผัก

ชนิดของแมลง	อัตราการใช้	วิธีการใช้ *
หนอนใยผัก หนอนกระทุ่ห้อม หนอนกระทุ่ผัก หนอนคีน หนอนเจาสมอฝ่าย	4 ภาชนะเพาะเลี้ยง (ไส้เดือนฝอย 60 ล้านตัว) เติมน้ำครับ 20 ลิตร ใช้พ่น กำจัดแมลง ครอบคลุม พื้นที่ 5 ร่องผัก ขนาด แบ่ง กว้าง 1.5 เมตร ยาว 20-25 เมตร	เริ่มพ่นเมื่อพันตัวหนอน 1 ตัวต่อ 2 ตัน ด้วยถัง พ่นสารแบบสะพายหลัง พ่นให้ถูกตัวหนอนให้ มากที่สุด
หนอนตัวงอมมัดผัก และตัวเต็มวัย	8 ภาชนะเพาะเลี้ยง (ไส้เดือนฝอย 120 ล้านตัว) เติมน้ำครับ 20 ลิตร ใช้พ่น กำจัดแมลง ครอบคลุม พื้นที่ 5 ร่องผัก ขนาด แบ่ง กว้าง 1.5 เมตร ยาว 20-25 เมตร	เริ่มพ่นลงตินก่อนปลูก เพื่อกำจัดตัวอ่อนในดิน ¹ และพ่นเมื่อสำราญพบ ตัวเต็มวัย 1 ตัวต่อ 2 ตัน ด้วยถังพ่นสารแบบ สะพายหลัง พ่นให้ถูก ตัวแมลงให้มากที่สุด

* ขณะพ่นไส้เดือนฝอย ควรเขย่าถังพ่นสารบ่อยครั้ง เพื่อป้องกันไส้เดือนฝอยตกตะกอนลงสู่ก้นถัง



คำแนะนำวิธีการใช้ไสเดือนฟอยกำจัดแมลงศัตรุพืช

1. ควรพ่นไสเดือนฟอยในช่วงเย็นหรือเช้า เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่ทำให้ไสเดือนฟอยตายหรือลดประสิทธิภาพในการกำจัดแมลง
2. การพ่นไสเดือนฟอยให้ถูกตัวแมลงมากที่สุด ช่วยให้ไสเดือนฟอยเข้าสู่ตัวแมลงได้เร็วขึ้น
3. ควร瓜นหรือเขย่าถังพ่นสารป้องกัน หรือทุก 10 นาที เพื่อป้องกันการตกตะกอนของไสเดือนฟอยลงสู่ก้นถัง
4. ผลผลิตไสเดือนฟอยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 7 วัน ควรนำไปใช้กำจัดแมลงศัตรุพืชให้หมดภายใน 5-7 วัน



ข้อควรปฏิบัติอีนๆ

1. กำจัดวัชพืชซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของแมลงในแปลง จะช่วยลดการแพร่ระบาดของแมลง ไม่รุนแรงจนเกิดความเสียหาย
2. ในแปลงผักควรเก็บต้นผักที่หลงเหลือในแปลงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว นำไปเผาทำลายนอกแปลง ไม่ให้ค้างหรือกองอยู่ในแปลง เพราะจะเป็นที่อู่อาศัยของแมลง
3. สูตรตรวจไสเดือนผัก หากพบไข่หรือตัวหนอน รีบกำจัดออกนอกแปลง
4. ปลูกพืชสลับหมุนเวียนในแปลง จะช่วยควบคุมประชากรของแมลงศัตรุพืช
5. ปลูกพืชหลายชนิดในแปลงผัก

บทสรุป

การเพาะเลี้ยงไส้เดือนฟอยสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้วัสดุ-อุปกรณ์การผลิตที่จัดรวมเป็นชุดเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย แข็งแรงทนทาน สามารถล้างทำความสะอาดได้เงา มีขั้นตอน ใช้ใหม่ได้ จัดเป็นเทคโนโลยีย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถทำได้เอง มีขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา และแรงงาน รวมถึงต้นทุนต่ำ ช่วยลดรายจ่ายในการ ซื้อผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฟอยที่มีจำหน่ายเป็นการค้าได้มากกว่า 10 เท่า ตลอดจน การเพาะเลี้ยงใช้เองทันทีนั้น จะได้ไส้เดือนฟอยที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพใน การกำจัดแมลงได้ดี

วิธีการพ่นไส้เดือนฟอยเพื่อกำจัดแมลงในแปลงปลูก ควรปฏิบัติตาม คำแนะนำอย่างถูกต้อง รวมทั้งเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก ในการฆ่าแมลงของไส้เดือนฟอย และรู้จักวิธีการเจริญเติบโตของ แมลงศัตรูพืชแต่ละชนิด จะช่วยให้การใช้ไส้เดือนฟอยหรือสารชีวภัณฑ์อื่นๆ ประสบผลสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม การผสมผสานเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช หลายวิธีร่วมกับการใช้ไส้เดือนฟอย เช่น การกำจัดวัชพืชและเศษซากพืชหลัง การเก็บเกี่ยวน้ำไปเพาทำลายนอกแปลง การปลูกพืชหลายชนิดในช่วงฤดูปลูก เดียวกัน การปลูกพืชล้อมแมลง การใช้แสงไฟดักจับแมลงตอนกลางคืน การ ปลูกพืชลับหมุนเวียนเพื่อลดประชากรแมลง เป็นต้น จัดเป็นวิธีผสมผสานที่มี ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เพียงวิธีเดียว

ดังนั้น การเพาะขยายไส้เดือนฟอยใช้เอง เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเพื่อ การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยการทำใช้เองนั้นหมายความว่าเกษตรกรราย ย่อยหรือกลุ่มเกษตรกรผลิตพืชผักอินทรีย์ ผักอนามัย ผักปลอดสารพิษ และ กลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาแมลงดื้อยา

ไส้เดือนฟอยสายพันธุ์ไทย จึงเป็นชีวินทรีย์ที่สามารถเพาะเลี้ยงได้เอง และมีศักยภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด นำมาใช้ทดแทนหรือลด จำนวนครั้งของการใช้สารเคมี ได้ผลิตผลเกษตรที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บรรณานุกรม

- นุชนารรถ ตั้งจิตสมคิด. 2541. ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ไทย *Steinernema thailandensis* n. sp. (Rhabditida : Steinernematidae). วารสารวิชาการเกษตร 16 (3) : 185-193.
- นุชนารรถ ตั้งจิตสมคิด. 2545. ไส้เดือนฝอย *Steinernema thailandense* และการกำจัดศัตรูพืช. วารสาร โรคพืช 16 (1-2) : 61-70.
- นุชนารรถ ตั้งจิตสมคิด. 2546. การเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงอย่างง่าย. เอกสารประกอบการฝึกอบรม. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักษาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 20 หน้า.
- นุชนารรถ ตั้งจิตสมคิด. 2547. การพัฒนากระบวนการผลิตไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงอย่างง่ายเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2547. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ. 182 หน้า.
- นุชนารรถ ตั้งจิตสมคิด. 2551. เทคโนโลยีการผลิตไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงอย่างง่าย. วารสารอาชีวศึกษาพืช 3 (1-2) : 83-90.
- นุชนารรถ ตั้งจิตสมคิด. 2552. โรงเรือนต้นแบบและเทคโนโลยีการผลิตไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในชุมชนเกษตรกรรม. ใน รายงานฉบับสมบูรณ์ สำรวจวิจัยแห่งชาติ, กรุงเทพฯ. 43 หน้า.
- นุชนารรถ ตั้งจิตสมคิด. 2553. การผลิตและการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในกลุ่มเกษตรอินทรีย์. ใน สรุปผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 6 หน้า.
- นุชนารรถ ตั้งจิตสมคิด ขวัญชัย เจริญกุล สิทธิ์ศักดิ์ แสงศาลา และ ณัฐสิรีมา โพธิ์ตเจริญกุล. 2552. การพัฒนาชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวกในเชิงพาณิชย์. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ. 131 หน้า.
- นุชนารรถ ตั้งจิตสมคิด สาโรจน์ ประชาครรภ์สมเดช และ หิรัญ หิรัญประดิษฐ์. 2543. การตรวจวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อการคัดเลือกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง. ช่าวาระโรคพืชและจุลชีววิทยา 10 (3) : 1-12.
- นุชนารรถ ตั้งจิตสมคิด อัจฉรา ตันติโชคดิ ตาราง เวชกิจ และ ณัฐสิรีมา โพธิ์ตเจริญกุล. 2550. การพัฒนาโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในเชิงพาณิชย์ กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 53 หน้า.
- นุชนารรถ ตั้งจิตสมคิด และ ณัฐสิรีมา โพธิ์ตเจริญกุล. 2552. สำรวจรวมรวมและศึกษาสายพันธุ์ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช. ใน ผลงานวิจัยเรื่องเติม สำนักวิจัยพัฒนาการอารักษาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
- นุชนารรถ ตั้งจิตสมคิด และ สาโรจน์ ประชาครรภ์สมเดช. 2547. การใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดแมลงศัตรูก็จะดี. วารสารวิชาการเกษตร 22(2) : 145-156.
- Tangchitsomkid, N. 2000. A new entomopathogenic nematode (Rhabditida : Steinernematidae) in Thailand : Taxonomy, biology and its potential for biological control. Ph.D. thesis, Kasetsart University, Bangkok.
- Tangchitsomkid, N. 2011. Research and development of entomopathogenic nematodes in Thailand. Pp. 76. In International Conference in Biopesticides 6 (ICOB 6). December 11-16, 2011 Imperial Mae Ping, Chiang Mai.
- Tangchitsomkid, N. and S. Sontirut. 1998. Occurrence of entomopathogenic nematodes in Thailand. Kasetsart Journal (Nat.Sci.) 32 (3) : 347-354.



Facebook: กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช



ผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุน
การทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

Facebook: กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช