

โรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava mosaic disease; CMD)

สาเหตุโรค : เชื้อ *Cassava mosaic virus*

โรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัส ในวงศ์ Geminiridae

สกุล Begomovirus ปัจจุบันมีรายงานทั้งหมด 10 ชนิด พบใน

ทวีปแอฟริกา 8 ชนิด และในทวีปเอเชีย 2 ชนิด ได้แก่ *Indian*

*cassava mosaic virus* (ICMV) พบในประเทศอินเดีย และ *Sri*

*Lankan cassava mosaic virus* (SLCMV) พบในประเทศศรีลังกา

อินเดีย เวียดนาม และกัมพูชา

ลักษณะอาการของโรค : ใบด่างและใบหงิก เสียรูปทรง อาการต่าง

มีหลายแบบ เช่น ต่างเขียวขีดสลับเขียวเข้ม ต่างเหลืองสลับเขียว

ใบหงิก หรือ หงิกเหลือง ใบย่อยบิดเบี้ยวหงิกงอ โค้งเสียรูปทรง

ใบอ่อนและใบที่เจริญใหม่มีขนาดเล็กลง ยอดหงิก ต้นแคระแกร็น



ใบย่อยบิดเบี้ยวหงิกงอ โค้งเสียรูปทรง



ใบด่างเหลืองทั้งใบยอดและใบล่างเนื่องจากใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาลูก



อาการใบด่างบนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

เฝ้าระวังและป้องกันท่อนพันธุ์ติดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

การใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เก็บจากต้นที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง มาปลูกใหม่จะทำให้เกิดโรคใบด่างระบาดอย่างรุนแรงในแปลงตั้งแต่ระยะ 2 เดือนแรก ต้นมันสำปะหลังแคระแกร็น ใบด่างหงิกงอ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตเสียหาย 80-100 %

หมั่นเดินตรวจแปลงตั้งแต่เริ่มปลูกทุกๆ 2 สัปดาห์ หากพบอาการต้องสงสัยเช่น ใบหงิก ใบด่าง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่มาวินิจฉัยโรค เจ้าหน้าที่จะชุดถอนทำลายต้นต้องสงสัยออกจากแปลง นำไปฝังกลบ พ่นต้นที่เหลือในแปลงและแปลงข้างเคียงด้วยสารฆ่าแมลงเพื่อทำลายแมลงหิวขาอายุสุบ ติดตามการเกิดโรคใบด่างในแปลงอย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์




ใบมันสำปะหลังปกติ



อาการต่างเหลือง



อาการต่างเขียวขีดสลับเขียวเข้ม



หัวมันสำปะหลังจากต้นปกติเปรียบเทียบกับต้นที่เป็นโรค



ใบด่างเหลืองชัดเจนที่ส่วนยอด แต่ใบล่างยังปกติ เนื่องจากรับการถ่ายทอดโรคจากแมลงหิวขาอายุสุบที่มีเชื้อไวรัสจึงแสดงอาการรุนแรงจากส่วนยอดลงมาสู่ใบล่างของต้น



แมลงพาหะ : แมลงหวีขาวยาสูบ (tobacco whitefly)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Bemisia tabaci* (Gennadius)



พืชอาศัยของเชื้อไวรัสสาเหตุโรค

• มันสำปะหลัง ละหุ่ง สบู่ดำ

• พืชวงศ์เปล้า Euphorbiaceae

พืชอาศัยของแมลงหวีขาวยาสูบ

• พืชวงศ์ถั่ว • พืชวงศ์แตง

• พืชวงศ์ Solanaceae เช่น มะเขือ พริก ยาสูบ

• กระเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง สะระแหน่ แมงลัก ยี่หระ

ลักษณะอาการอื่นๆ ที่พบในมันสำปะหลัง

อาการจากสารเคมีเป็นพิษ



อาการขาดธาตุ



สายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

กลุ่มงานเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกัน

กลุ่มวิจัยการกักกันพืช

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

โทร. 0-2579-8516 หรือ 061-415-2517

อีเมล ppspq@doa.in.th

LINE: สายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง



เฝ้าระวัง  
 โรคใบด่างมันสำปะหลัง

