

ISSN 0857-2380 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2543



วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

วารสารการวิจัยและพัฒนา



พบกับ.....

ทิศทางการวิจัยสู่เป้าหมายการมี
บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข

สัมภาษณ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2542

การใช้นิเวศศาสตร์เทคนิคเพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ครบรอบวันสถาปนา วท.
ปีที่ 37

SMOOTH AS SILK



บินเหนือระดับ กับ 3 รางวัลยอดเยี่ยม
รางวัลยอดเยี่ยมตอบแทนสมาชิกชั้นนำ
รางวัลยอดเยี่ยมสมนาคุณสมาชิก
รางวัลยอดเยี่ยมการบริการสมาชิก

ความภาคภูมิใจของ รอยัล ออร์คิด พลัส
เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อเราได้รับ
3 รางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก "Freddie Awards"
และเป็นหนึ่งในรายการสะสมไมล์ที่ดีที่สุดในโลก
จากการลงคะแนนผ่านนิตยสาร InsideFlyer
อันเลื่องชื่อ ด้วยบริการที่ให้อิทธิพลเหนือกว่า
ในการดูแล บริการคุณก่อนใคร
รวมถึงสิทธิพิเศษในการใช้ห้องรับรองระดับหรู
ของสนามบินทั่วโลก ...รอยัล ออร์คิด พลัส
พาคุณบินสู่ระดับการบริการที่เหนือกว่า

สัมผัส "การบินไทย" ด้วยตัวคุณเอง
www.thaiairways.com

A STAR ALLIANCE MEMBER





ปตท. จำกัด (มหาชน)

ถนนเมืองไทย คือห้องวิจัยของเรา



พีทีที เพอร์ฟอร์มา ซินเธติก น้ำมันหล่อลื่นมาตรฐานสากล
เทคโนโลยีล่าสุดจากปตท. เพื่อสภาพถนนเมืองไทยโดยเฉพาะ

ขับรถในประเทศไทย ก็ไม่ทำให้เครื่องยนต์ของคุณทำงานหนักได้เหมือนถนนในเมืองไทย

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% **พีทีที เพอร์ฟอร์มา ซินเธติก**

ผลงานจากการวิจัยสภาพถนนทั่วประเทศ มีสาร "ลิควิด โมลิบดีนัม"

ลดความฝืด เพิ่มการปกป้องเครื่องยนต์รถในเมืองไทยโดยเฉพาะ



พีทีที เพอร์ฟอร์มา ซินเธติก...ทุกหยด แรง เต็มพลัง



From kilowatts to megawatts, the worlds electricity markets may never be the same

Announcing a *breakthrough* in the development of a cost-efficient technology to store and use electrical energy



Applications:

- *Load leveling*
- *Power quality*
- *Renewable energy*
- *Telecommunications*
- *UPS*
- *Motive power*


Benefits:

- **Power and energy capacity are independent**
- **Indefinite number of charge-discharge cycles**
- **Total efficiency greater than 85 percent**
- **Can be completely discharged with no adverse effects**
- **Shelf life theoretically unlimited**
- **Cost per kilowatt-hour decreases as energy storage capacity increases**

Cellennium
COMPANY LIMITED

ypsum Metropolitan Tower, 11th Floor
539/2 Sri Ayudhaya Road
Bangkok 10400 Thailand
Telephone: (662) 642 5130 Facsimile: (662) 642 5131

For more information please visit
<http://www.vanadiumbattery.com>



กลุ่มวังขนาย
WANG KANAI GROUP

อภินันทนาการ
บริการเอกสารวิชาการ
ห้องสมุด
ว. /



คุณภาพ ปลอดภัย บริการ

น้ำตาลทราย

รับรองจากมาตรฐานชั้นนำของโลก



052411

สำนักงานกรุงเทพ

889 อาคารไทย ซีที ทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร: 2100853-72




“โครงการใหม่ของ บริษัท นิวเจริญ จำกัด ”

รีไซเคิลทุกตัว สร้างระบบทันสมัยที่สุดในเอเชีย

“NEW PROJECT OF NIEW CHAROEN CO., LTD.”

RECYCLING EVERY PART IS THE MOST ADVANCE SYSTEM IN ASIA



DISPOSAL SERVICE : CARRY AND TRANSPORT FOR DISPOSAL OF ANY TOXIC AND CHEMICAL WASTES

DISTRIBUTE & PURCHASE : RESIDUAL OIL/200-LITRE OIL DRUM. JUEL OIL AND CHEMICALS

DISTRIBUTE : “TIGER DRAGON” PAINT AND “NIEW DRITE” TERMITE KILLER



NIEW CHAROEN CO.,LTD.

71/5 Moo 4, Soi Wichien, Prachautid 33, Bangmod, Radburana, Bangkok 10140

Tel/Fax : 02-4631791, 4631809

JBP

เปิดโลกธรรมชาติสดใส

สร้างสรรค์สีสดใส

ครบทุกเจดสี



อุตสาหกรรมสีของคนไทยแห่งแรกที่สามารถ
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม



ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002
จากสถาบัน SGS ประเทศอังกฤษ



มอก. 272-2541

มอก. 327-2538



บริษัท เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนลเพินท์ จำกัด


34/3 หมู่ 11 ซอยพาศิษย์ชนฯ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10460

โทร : 410-4268-72, 865-7800-7 FAX : 865-7808-9

3M Privacy Computer Filters

แผ่นกรองแสง 3 เอ็ม รุ่น Privacy

Keep it for your eyes only !



Privacy Protection

ด้วยเทคโนโลยี “ไมโครลูเวอร์ (Microlouver)”

ลิขสิทธิ์เฉพาะของ 3 เอ็ม

ที่ทำงานคล้ายกับ “ม่านบังตา”

ซึ่งผู้ใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์

สามารถมองเห็นข้อมูล

บนจอคอมพิวเตอร์ ได้แต่เพียงผู้เดียว

Easy Clean Surface

แผ่นจอเคลือบด้วยน้ำยา

Scotchgard™ Protection

ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ 3 เอ็ม

ทำให้เช็ดสะอาดได้ง่าย

เพียงใช้ผ้าชุบน้ำ และมั่นใจได้ว่า

ไม่ทำลายสารที่เคลือบแผ่นจอ

ฝ่ายตลาดผู้บริโภค และสำนักงาน
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
ชั้น 12 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
159 ถนนอโศก (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 260-8577 โทรสาร 261-7535
[http : // www.3M.com/cws](http://www.3M.com/cws)
e-mail : opticalsystems@mmm.com

3M ดิดันพัฒนาเพื่อท่าน



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900

โทร. 579-1121-30, 579-5515, 579-0160

E-mail : TNDP@mozart.inet.co.th

ที่ปรึกษา

นายเกษรา ลาวัลย์วัฒน์
นางลดาวัลย์ โชติมงคล
นายไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์
นายประพันธ์ บุญกลิ่นขจร
นางนงพงา จิตรกร

ผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

นายดิเรก รอดสวัสดิ์
นางสาวนฤมล รื่นไวย
นางวัลย์ลดา หงส์ทอง
นางเพ็ญวดี รอดโพธิ์ทอง
นางพรทิพย์ อังคปริษาเศรษฐ์
นายพนัส บุรณศิริ
นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์
นางสรวิศา สึงพะเนติ
นางฉันทรา พูนศิริ
นางอารัตน์ มหาชนธ์
นายธีรภัทร ศรีนคร
นายลิขิต หาญจางสิทธิ์
นายวรุตม์ ทวีศรี
นางสาวบุญเรือน ชมเมฆ
นางสายสวาท กุลวัฒนาพร
นางนุสรา วุฒิกรรมรักษา
นายสุรพล ตานานนท์ชัย
นายไชยวุฒิ เกตุหลิม
นายเรวัต วิบูลย์ศิริชัย
นายดุรงค์ฤทธิ์ สุดสงวน
นายวสันต์ ตุ่นคำ
นางปัญจพร ศรีคุณ
นายก่อโชค บัณฑิตมงคล
นายสมเกียรติ ธรรมสุน
นายณพพร อินทร์ทอง
นายสมศักดิ์ ศรีสุทธิยากร
นายจิระพงษ์ ศารทะประภา
นางนิรมล เรียบร้อยเจริญ
นางพัชชา นนทะสุด
นายศักดิ์ดา นำชัยวัฒนา
นางรัชณี วุฒิพิทักษ์
นางสาวมยุรี ศรีประโชติ
นางสาวดิศลิน กอบวิทย์ภรณ์
ม.ล.กรณิการ์ ทวีวงศ์
นายประพันธ์ รัตนพิมพ์ภรณ์
(01-497-5060), 742-2445
พื้นที่พบปะสังสรรค์
โทร. 579-1933, 579-3352

ฝ่ายศิลป์

ฝ่ายภาพ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายจัดพิมพ์ต้นฉบับ

ฝ่ายโฆษณาและจัดทำ

พิมพ์ที่

จากกองบรรณาธิการ

และแล้วเมื่อต้นปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยก็ได้ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ระดับนานาชาติได้แก่ งานการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า และการพัฒนา (อังค์ถัด) ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสมานรอยร้าวระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการประชุมอังค์ถัดครั้งที่ 9 ที่เมืองออกตาวา ประเทศแคนาดา

การประชุมสิ้นสุดลงด้วยบรรยากาศชื่นมื่น นำมาสู่ปฏิญญากรุงเทพฯ และแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีผลทำให้ทุกปัญหาที่ประเทศกำลังพัฒนาได้หยิบยกขึ้นมา ได้รับการพิจารณา ตระหนัก และรับรู้จากประเทศที่พัฒนาแล้วทุกเรื่อง ส่วนจะบรรลุเกิดผลเป็นจริงอย่างไร เราคงต้องคอยสับตบรับฟังกันต่อไป...

ส่วนงาน BOI Fair ซึ่งเป็นงานระดับชาติที่ยิ่งใหญ่จัดขึ้นในปีนี้อย่างดีเยี่ยม ทกท. นั้น ก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งเช่นกัน โดยพิจารณาจากจำนวนประชาชนที่หลั่งไหลไปชมงาน หนึ่งในหลายๆ เป้าหมายของการจัดงานนี้ก็เพื่อกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ได้มีส่วนร่วมกับการทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วว.) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ วท. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างมาก


ในเดือนพฤษภาคมนี้ วท.จะมีอายุขึ้นรอบที่ 4 (ครบรอบ 37 ปี) ถ้าจะเปรียบเป็นการเดินทาง ก็นับว่าค่อนข้างยาวไกลที่เราได้ฝ่าฟันบุกเบิก และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศมาโดยต่อเนื่อง จึงนับเป็นสิ่งที่พนักงาน วท. ทุกคนภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นที่จะนำความเจริญมาสู่ วท. ซึ่งจะนำมาสู่ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติโดยรวมต่อไป

เพ็ญวดี รอดโพธิ์ทอง

บทความทุกเรื่องที่ยังพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้เขียนบทความโดยเฉพาะ วท. จะไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด



มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น



รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2543

ปริญญาตรี (ภาคกลางวัน)

คณะบริหารธุรกิจ (4 ปีและ 2 ปีต่อเนื่อง)

- การบัญชี • การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- การตลาด • การเงินและการธนาคาร • การจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี ภาษาอังกฤษ)

- การบัญชี • การตลาด

คณะนิเทศศาสตร์ (4 ปี)

- การโฆษณา • การประชาสัมพันธ์
- วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คณะศิลปศาสตร์ (4 ปี)

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล • การท่องเที่ยว

ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (ภาคค่ำ)

คณะบริหารธุรกิจ

- การบัญชี • การตลาด • การจัดการ
- การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
- วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะนิติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ)

ปริญญาโท (ภาคค่ำ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.)

(Master of Business Administration)

- การจัดการ • การจัดการการตลาด
- การจัดการการเงินการธนาคาร
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- บริหารธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)

(Master of Arts Program in Communication Arts)


สาขาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
แห่งแรกในประเทศไทย เน้นศึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย
และการตลาดทางตรง

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร



- หน่วยรับสมัคร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โทร. 938-7058-65
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 613-3890
- ชื่อใบสมัครทางไปรษณีย์ ปริญญาโท 220 บาท ปริญญาตรี 320 บาท หนาติดส่งจ่ายมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปทจ. สามแยกลาดพร้าว 10900

รับสมัคร ทุกวันตั้งแต่บัดนี้ที่ หน่วยรับสมัครมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900
สอบถาม โทร. 938-7058-65 ต่อ 301-303 <http://www.stjohn.ac.th>

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002



ปกโดย
สมเกียรติ ธรรมสุน



สารบัญ

จากกองบรรณาธิการ	1
ทิศทางการวิจัยที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการมี "บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข"	3
ความมหัสจรรย์ของพืช (6)	13
สถานการณ์การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าในประเทศไทย	23
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางเกษตรโดยการเฝ้าระวังในทศวรรษหน้า	29
สิ่งละอันพันละน้อยจากจุลินทรีย์	37
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า	41
งานอันมีลิขสิทธิ์	47
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางรังสีของ TLD แบบพลิกได้ยว	51
มูมอินเตอร์เน็ต	57
WAP (Wireless Application Protocol)	61
โรคพยาธิที่พบในประเทศไทย	65
คว้นหลวงจาก Y2K	71
สารรัยอินแหล่งน้ำจืดเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล	73
ย้าเทคโนโลยี	87
สัมภาษณ์นักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2542	91
ท้าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท	99
วท. บันเทิง	105
เปิดประตู วท.	107
ผู้ว่าดหมาย	109





ELECTRONIC ©OMMERCE

& TELECOMMUNICATIONS

ภายใต้แผ่นฟ้าผืนนี้
เราทำให้ธุรกิจของคุณ...
ไม่มีขีดจำกัด

ก้าวสู่ศตวรรษใหม่...ไปกับชุมพลพลังเครือข่าย
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ จากสามารถเทเลคอม
ผู้นำบริการที่หลากหลายในรูปแบบของการสื่อสาร
ข้อมูล ภาพ และเสียง ผ่านดาวเทียม
เพื่อให้พร้อม... โลกธุรกิจศตวรรษใหม่อยู่ในมือคุณ



บริษัท สามารถเทเลคอม จำกัด (มหาชน) SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED.
36/28-35 หมู่ 3 ถนนบางนา-สวนหลวง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.: 589-1047, 953-0100-4 โทรสาร: 589-3066
36/28-35 Moo 3 Ngam Wong Wan Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel.: 589-1047, 953-0100-4 Fax: 589-3066
<http://www.samtel.com>



ทิศทางการวิจัย ที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการมี “บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข”

สมศักดิ์ ศุภรัตน์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1. อารัมภบท

บทความนี้เขียนขึ้นด้วยเจตจำนงและความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อกำหนดรูปแบบและแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการมี “บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันพุธที่ 27 - วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2542 ณ โรงแรมรอยัลคิลิพีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

ประเด็นที่นำเสนอในบทความนี้เป็นเพียงมุมมองหรือทัศนะของผู้เขียน มิได้มีเจตนาที่จะยืนยันว่ามองถูกต้องเป็นจริงสมบูรณ์ แต่มีเจตนาเพื่อประกอบหนุนเสริมหรือแลกเปลี่ยนมุมมองกับท่านผู้อ่านโดยมิใช่เพื่อขัดแย้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการจากหลากหลายมุมมองให้เห็นเป็นองค์รวมสอดคล้องสัมพันธ์กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว ความเชื่อของ

ผู้เขียนมีอยู่ว่า สรรพสิ่งใดๆ รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คน ชุมชน และประเทศสามารถมองได้จากหลายแง่มุมมอง แต่ละมุมมองล้วนมีข้อจำกัด แม้ไม่สมบูรณ์แต่ล้วนมีประโยชน์ ความต่างในมุมมองเป็นเพียงความต่างมิใช่ข้อขัดแย้ง หากได้แลกเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้ระหว่างกันและบูรณาการออกมาเป็นบทเรียน เป็นองค์ความรู้

เป็นภูมิปัญญาเชิงองค์รวม วิถีชีวิตการดำรงอยู่ต่อไปในอนาคตของผู้คน ชุมชน และประเทศ แม้ไม่สมบูรณ์ แต่ก็คงดำรงอยู่ได้ด้วยภูมิปัญญาและอย่างสมดุลในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

ลำดับการนำเสนอ เริ่มจากการทบทวนบทเรียนการพัฒนาที่ผ่านมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต่อด้วย



การมองภาพอนาคตที่ปรารถนาหรือทิศทางการพัฒนาประเทศ จากนั้นจึงมองภาพการวิจัยที่ควรจะต้องดำเนินการหรือทิศทางการวิจัยของชาติ และในที่สุดจะจบลงด้วยบทส่งท้ายซึ่งเป็นบทที่สำคัญที่สุด

2. บทเรียนการพัฒนา

ในอดีต ประเทศไทยของเราอยู่ในสภาพ “บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข” ถึงแม้จะมีวิกฤตการณ์หรือสงครามบ้างในบางครั้ง แต่ธรรมชาติแวดล้อมไม่ถูกทำลาย ยังคงความอุดมสมบูรณ์เกื้อกูลต่อการดำรงอยู่อย่างสมดุลของผู้คน ชุมชน และประเทศ ป่าไม้ยังหนาแน่นหลาก



เมื่อทำมาหาได้ก็รู้จักแบ่งปันกันกินกันใช้ เหลือจึงขายเป็นเงินออมเพื่อใช้ในยามยากหรือยามเจ็บไข้ได้ป่วย อยู่กันอย่างพอดีมีเศรษฐกิจแบบพอเพียง

และศักดิ์ศรีของท้องถิ่น



หลายทางชีวภาพและประเภทครอบคลุมเนื้อที่กว้างขวางเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ น้ำในแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่ยังใสสะอาดปราศจากมลพิษสามารถใช้ได้ทั้งอาบกิน อีกทั้งเป็นที่อยู่ของหอย ปู ปลา สัตว์น้ำหลากพันธุ์ ดินยังอุดมด้วยปุ๋ยธรรมชาติและชีวิตในดินที่เกื้อกูลต่อการเพาะปลูก วิธีชีวิตการดำรงอยู่ของผู้คนและชุมชนโดยเฉพาะในชนบทเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ ผู้คนมีจิตใจใฝ่คุณธรรมเมตตาอารีต่อกัน เคารพนับถือกันโดยยึดความมีคุณธรรมเป็นหลัก

พึงพาวงมปัญญาตนเองที่ได้คิดค้นสั่งสมกันมานับแต่บรรพบุรุษทั้งในการประกอบอาชีพและการรักษาพยาบาลครอบครัวอบอุ่นชุมชนรวมตัวเข้มแข็งมั่นคงด้วยประเพณีดีงามบนฐานวัฒนธรรมที่สืบทอดเป็นเอกลักษณ์



จุลจน พ.ศ. 2504 ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี เพื่อเร่งรัดการพัฒนาประเทศอย่างเร่งรีบและเร่งร้อน เพื่อให้เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและทันสมัยทางสังคมเฉกเช่นอารยะประเทศเยี่ยงประเทศฝรั่งทั้งหลาย ทั้งนี้โดยกำหนดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จเป็นสำคัญ มีกลยุทธ์หลักเน้นหนักที่การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการสร้างงาน รวมทั้งเพื่อลดการนำเข้าในระยะแรก และเพิ่มการส่งออกในระยะหลัง เมื่อแผนพัฒนาเปลี่ยนไปหลายฉบับ การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7% ต่อปี การอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นหลากหลาย โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนไป แรงงานไหลสู่อุตสาหกรรมการส่งออกมากขึ้นทั้งสินค้าและมูลค่าการส่งออก

จนประมาณ พ.ศ. 2530 เกิดกระแสความชื่นชมยินดีทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหนุนเสริมด้วยองค์กรการเงินระหว่างประเทศว่า เศรษฐกิจไทยเป็นไปด้วยดีมีอนาคตอันสดใสความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจะเกิดขึ้น จนถึงคาดฝันกันว่า



ประเทศไทยจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs: Newly Industrialized Countries) ในไม่ช้า เป็น “เสือตัวที่ 5 แห่งเอเชีย” ราวต้นศตวรรษที่ 21 หรือประมาณปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป

แต่แล้วสิบปีต่อมา เริ่มจาก พ.ศ.2540จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์กลับไม่เป็นเช่นที่คาด เศรษฐกิจไทยล้มคะมำตกสู่ภาวะวิกฤต ค่าเงินบาทแปรปรวนตกต่ำอย่างไม่เคยคิดหรือเคยเป็นมาก่อน สถาบันการเงินหลายแห่งทยอยกันเสื่อมทรุด ธุรกิจการค้าการบริการแทบทุกขนาดประสบภาวะชะงักงันหมดทุนหรือขาดทุน หากสายป่านไม่ยาวพอก็ต้องล้มละลายปิดกิจการหรือลดขนาดธุรกิจ พนักงานลูกจ้างถูกลดเงินเดือนหรือให้ออก เกิดภาวะการว่างงานเข้มข้น ขณะที่คนเก่าตกงาน คนใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วัยแรงงานหรือเพิ่งจบการศึกษาที่หางานทำได้ยากหรือไม่ได้เลย ภาษีก็คาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลงเกิดข้อจำกัดด้านงบประมาณเพื่อการลงทุนและการบริหารประเทศ รัฐบาลจำต้องกู้เงินกองทุนระหว่างประเทศ (IMF: International Monetary Fund) จำนวนมาก คนไทยทั้งชาติจึงตกเป็นหนี้กันถ้วนหน้า การดำเนินนโยบายด้านการเงินการคลัง รวมทั้งการบริหารองค์กรของรัฐ ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกองทุนไม่เป็นอิสระเช่นที่

เคย อุปมาดังเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจ

การเร่งรัดพัฒนาอย่างเร่งรีบและเร่งร้อนที่ผ่านมา ก่อให้เกิดภาวะการเสียสมดุลของประเทศในแทบทุกด้านสะสมทับทวีมาเป็นลำดับ จนกระทั่งตกอยู่ในภาวะวิกฤตทาง



เศรษฐกิจ ประเทศไทยของเราจึงแปรเปลี่ยนจากสภาพ **“บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข”** ในอดีต มาเป็นสภาพ **“บ้านเมืองร้อนรนเป็นทุกข์”** ในปัจจุบัน ร้อนรนเป็นทุกข์กับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญอยู่ ร้อนรนเป็นทุกข์กับภาวะเสียสมดุลที่หลากหลายทัพบทวิ ร้อนรนเป็นทุกข์กับปัญหาน้ำท่วมฝนแล้งขาดแคลนน้ำแห้งแล้งกันดารซ้ำซากอันเกิดจากภาวะเสียสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติ ป่าไม้เสื่อมโทรมต้นน้ำลำธารเหือดแห้ง ร้อนรนเป็นทุกข์กับปัญหาคุณภาพชีวิตที่เลวลงเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเสียสมดุลเป็นพิษ อากาศ

เสีย น้ำเน่าสารพิษตกค้าง ชยะกองโต ยากต่อการจัดการ ร้อนรนเป็นทุกข์กับผู้คนที่มีสภาพจิตใจแปรเปลี่ยนแปรปรวนเสียสมดุล ร้อนรนซึ่งดีซึ่งเด่นเอาเปรียบแสวงหาอำนาจผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงวิธีการ ร้อนรนสับสนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเพี้ยนกันไปหมดไม่ว่าโยมหรือพระอันเกิดจากกระแสทุนนิยม วัตถุนิยม บริโภคนิยม คุณภาพแห่งคุณธรรมเจือจางลง คุณภาพแห่งวัตถุเข้มข้นขึ้น ร้อนรน เป็นทุกข์กับการหาเงินกู้เงินให้พอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกับการหนี้หนี้หลบหนี้เลี้ยงหนี้ และใช้หนี้ที่พอกพูนรุงรังอันเป็นผลจากการเสียสมดุลทางเศรษฐกิจในทุกระดับนับแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว หน่วยธุรกิจไปจนถึงระดับชาติ ร้อนรนเป็นทุกข์กับค่าใช้จ่าย

เพื่อซื้อสินค้าบริโภค เครื่องจักรกล วัตถุดิบพลังงานซึ่งแฝงเทคโนโลยีมูลค่าสูงราคาแพงที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อการบริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม การบริการ จนเสียดุลการค้าระหว่างประเทศอันเกิดจากละเลยไม่จริงจังต่อการเสริมต่อสร้าง-สรรค์ภูมิปัญญาตนเอง หลงไหลเพียงพึ่งพาภูมิปัญญาผู้อื่นมองเห็นว่าต่างประเทศดีกว่าตน ตกอยู่ในภาวะเสียดุลทางภูมิปัญญา ร้อนรนเป็นทุกข์กับปัญหา ผู้ร้ายโจรขโมยข่มขืน ฆาตกรรม ครอบครัวยแตกแยกลูกติดยาเสพติด โสเภณีเด็ก การฉ้อฉลโกงกินของนักการเมืองและผู้คนใน

แทบทุกสาขาอาชีพ วัฒนธรรมดั้งเดิมเสื่อมทรุดทั้งหลายทั้งปวงอันเนื่องจากภาวะเสียสมดุลทางสังคม

การทบทวนการพัฒนาที่ผ่านมา จะต้องมิใช่เพื่อการตำหนิหรือกล่าวโทษผู้ใดองค์กรใด อีกทั้งจะต้องมิใช่เพื่อการพร่ำบ่นปัญหาตอกย้ำติดอยู่กับอดีต แต่จะต้องเพื่อเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับวิธีการดำรงอยู่ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต อดีตที่ผ่านมาไม่ว่าเลวหรือดี ล้มเหลวหรือสำเร็จ ทุกข์หรือสุข ล้วนแต่เป็นบทเรียน บทเรียนที่จะก่อให้เกิดภูมิปัญญาสะสมก้าวหน้าต่อเนื่องต่อไป มีวาทะแห่งบทเรียนการดำรงอยู่กล่าวไว้หลากหลายว่า “ความล้มเหลวคือแม่แห่งความสำเร็จ” “พลาดไปครึ่งจลัดขึ้นหน่อย” “ยอมแพ้เพื่อจะชนะ” “เมื่อมีสีย่อมมีสว่าง” “ล้มแล้วต้องรู้จักลุก”

ต่อไปในอนาคตหากต้องการไปสู่เป้าหมายของการมีสภาพ “บ้าน

กระแสการพัฒนาจากภายนอกในรูปทุนนิยมเสรีอย่างเต็มที่ ต่อไปในอนาคตสภาพ บ้านเมืองจะเปิดกว้างยิ่งขึ้นไปอีกอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่นับวันจะโหมรุนแรง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือสภาพ “บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข” ในอนาคตจะต้องเป็นสภาพใหม่ตามกาลเทศะใหม่ ในขณะเดียวกันภาวะสมดุลในอนาคตก็ต้องเป็นภาวะสมดุลใหม่ เป็นภาวะสมดุลแบบพลวัต (Dynamic Balance) ที่เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะมิใช่ภาวะสมดุลแบบสถิตย์ (Static Balance) ที่หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวแบบเดิม เราไม่อาจย้อนกลับไปหาอดีตหรือยึดติดอยู่กับปัจจุบันได้แต่ก้าวเดินต่อไปในอนาคต อดีตและปัจจุบันมิใช่บทวน เป็นรากเหง้า เป็นบทเรียนเป็นฐานที่มั่นคงต่อการก้าวเดินสู่อนาคตอย่างอาจหาญต่อไป



เมืองอยู่เย็นเป็นสุข” ตามประเด็นที่กำหนดไว้ในหัวข้อการประชุมสัมมนา ก็หมายถึงว่าจะต้องมีการฟื้นฟูภาวะสมดุลกันใหม่ให้หลุดพ้นจากสภาพ “บ้านเมืองร้อนรนเป็นทุกข์” สิ่งที่ยังต้องตระหนักอย่างสำคัญก็คือ กาลเทศะได้เปลี่ยนไปคือ สภาพบ้านเมืองแต่เดิมก่อนการพัฒนาอยู่ในระบบค่อนข้างปิด ผลกระทบจากภายนอกมีน้อย แต่ปัจจุบันหลังการพัฒนาสภาพบ้านเมืองได้เปิดกว้างรับ

3. กิ่ศทาบทการพัฒนาประเทศ

จากบทเรียนการพัฒนาที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตควรมุ่งเป้าหมายสูงสุด (Super Goal) ของการมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง (Self-reliance Capabilities) มีความสมดุลแบบพลวัต (Dynamic Balance) มีพัฒนาการแบบยั่งยืน (Sustainable Development) หรือของการมีสภาพ “บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข” แบบใหม่

ที่เหมาะสมตามกาลเทศะใหม่

แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะก้าวเดินไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องตระหนักถึงปัจจัยเงื่อนไขสำคัญสองประการคือ

ประการแรก เป็นปัจจัยเงื่อนไขภายนอกประเทศอันได้แก่ ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) กล่าวคือในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การติดต่อสื่อสารข่าวสารข้อมูลสารสนเทศโทรคมนาคมยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพขยายเครือข่ายกว้างไกลครอบคลุมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแทบทุกมุมโลกทั้งเมืองและชนบท ทั้งป่าเขา ทะเลและมหาสมุทร การต่อสู้แข่งขันต่อรองเพื่อครองความได้เปรียบและเอาเปรียบในเวทีทางเศรษฐกิจการค้าการเงินระหว่างประเทศจะเข้มข้นรุนแรงยิ่งขึ้น ใครเข้มแข็งกว่าได้เปรียบใครอ่อนแอกว่าเสียเปรียบ การเมืองและการทหารระหว่างประเทศจะเข้มข้นยิ่งขึ้นในบทบาทที่จะหนุนเสริมรักษาผลประโยชน์และความได้เปรียบทางเศรษฐกิจการค้าการเงินของประเทศตน หรือกลุ่มแนวร่วมของตน ประเทศมหาอำนาจจะคงความได้เปรียบและดำเนินการในแทบทุกวิถีทางแม้การทำสงครามเพื่อรักษาความได้เปรียบและเอาเปรียบให้ยาวนานตลอดไปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและก้าวไกลจะเป็นกลไกหรือเครื่องมือของประเทศมหาอำนาจหรือประเทศผู้นำในอันที่จะใช้ครองอำนาจทางการเมือง การทหาร และทางเศรษฐกิจการค้าการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาสิ่ง



แวดล้อมจะแผ่กระจายไร้พรมแดน (No Frontier) เกิดผลกระทบเสียหายไม่เพียงแต่ ประเทศที่เป็นผู้ก่อปัญหา แต่ต่อประเทศอื่นและประชาชนคนอื่น คุณค่าต่อวิถีทางดำรงรอดอยู่ของมนุษยชาติ และสรรพชีวิตอื่นโดยรวม พลังงานจากฟอสซิลและจากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้อยู่และมืออยู่ร่อยหรอจำกัดเป็นลำดับหลายแบบการใช้มีผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานนิวเคลียร์พบว่ายังยากต่อการจัดการ และเสี่ยงอันตราย คำตอบจากการวิจัยเพื่อแสวงหาพลังงานรูปแบบใหม่ที่มาทดแทนเหมาะสมต่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพออย่างยั่งยืน

ประเทศไทยของเรา จำต้องดำรงอยู่ร่วมกันกับประชาคมโลก จำเป็นต้องดำรงอยู่ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนและการแข่งขันเอาชนะเอาเปรียบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นจะมีทั้งบวกและลบ มีทั้งดีและเลว มีทั้งเป็นคุณและเป็นโทษ ทางออกของประเทศจึงอยู่ที่การเสริมสร้างขีดความสามารถและภูมิปัญญาที่จะเข้าใจเรียนรู้อย่างจริงจังซึ่งถึงกระแสและผลกระทบจากกระแสดังกล่าวจนสามารถถ่วงดุลรับเอาและซึมซับเป็นของตนเองเฉพาะส่วนบวกที่ดีและเป็นคุณ สามารถหลีกเลี่ยงได้ตอบปฏิเสธหรือเท่าทันผลกระทบในส่วนลบที่เลวและเป็นโทษ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์อย่างพึ่งตนเอง สมดุลแบบพลวัตและมีพัฒนาการแบบยั่งยืน

ประการที่สอง เป็นปัจจัยเงื่อนไขภายในประเทศ ได้แก่ ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศ ซึ่งหากมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองสูง บ้านเมืองจะอยู่



เย็นเป็นสุข มีความสมดุลแบบพลวัตที่เคลื่อนไหวอย่างสงบหนักแน่นเยือกเย็นเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนชาญฉลาดตามกาลเทศะที่แปรเปลี่ยนแต่หากมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองต่ำ บ้านเมืองจะร้อนรนเป็นทุกข์เสียสมดุลสับสนวุ่นวายเร่งรีบกระหืดกระหอบไร้รากเหง้าไร้ปรัชญาไร้สาระตามยถากรรม

การพึ่งตนเองในที่นี้ หมายถึงการรู้จักตนเอง รู้จักเข้าใจเห็นคุณค่า ชื่นชมและเชื่อมั่นในความเป็นประเทศไทยในความเป็นท้องถิ่นของตน (Localization) รู้จักสร้างสรรค์สิ่งสมพึ่งพาภูมิปัญญาตนเองอย่างสืบเนื่องก้าวหน้าอย่างสมดุลทางภูมิปัญญา รู้จักใช้ภูมิปัญญาในการบริโภคแบบพอดี การผลิตแบบพอเพียง ค่าขายแบบพอเหมาะสอดคล้องกับตนอย่างสมดุลทางเศรษฐกิจ รู้จักใช้ภูมิปัญญาในการจัดการและดำรงอยู่ร่วมกับธรรมชาติแวดล้อมอย่างสอดคล้องกลมกลืนชาญฉลาดต่อประโยชน์แก่ตนแต่คงความสมดุลทางนิเวศธรรมชาติ รู้จักใช้ภูมิปัญญาในการฝึกฝนขัดเกลาตนร่วมกับผู้คนและชุมชนให้มีสมดุลทางจิตมีคุณธรรมไว้คอยกำกับควบคุมการเจริญเติบโตและคุณภาพทางวัตถุ รู้จักใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมของตนให้ก้าวหน้าทันสมัยแต่มั่นคงตั้งอยู่บนรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมที่สืบต่อและสานเสริม

ด้วยวัฒนธรรมสากลใหม่ที่ดั่งามสอดคล้องกลมกลืนอย่างมีสมดุลทางสังคม นอกจากนี้ยังรู้จักกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขแวดล้อมภายนอกของตนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รู้จักใช้ภูมิปัญญาล้นกรองเลือกรับผลกระทบในส่วนดี คัดออกในส่วนเสีย

การเร่งรัดพัฒนาประเทศที่ผ่านมา นอกจากไม่หนุนเสริมสืบต่อขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของผู้คน ชุมชน และประเทศให้สูงขึ้นแล้วยังบั่นทอนขีดความสามารถในการพึ่งตนเองดังกล่าวให้ต่ำลงอีกด้วยการพัฒนาที่ผ่านมาจึงอยู่ในทิศทางพึ่งพาภายนอกประเทศมากขึ้นเป็นลำดับ ในรูปแบบการเจริญเติบโตแบบกลวง แบบฟองสบู่ แบบมายาลวงตนเองว่าทันสมัยนิยมแบบฟุ้งเฟ้อเพื่อฝัน ลอยห่างฐานไม่รู้จักตนเองหรือวงในที่มั่นคง ละเลยทิ้งรากเหง้าปัญญาวัฒนธรรมที่สืบทอดแต่บรรพบุรุษ ผลคือเป็นสมดุลทางด้านบ้านเมืองร้อนรนเป็นทุกข์ขัดคู่ภาวะวิกฤตดังปรากฏ

กลยุทธ์การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ควรต้องเน้นหนักที่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการพึ่งตนเองให้สูงขึ้นเป็นลำดับ โดยเริ่มต้นจากการถอยกลับหาฐานที่มั่นคง ทบทวนรากเหง้าภูมิปัญญาวัฒนธรรมเพื่อรู้จักตนเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ค้นหาตรวจสอบ

แผนวิจัยและเป้าหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ.									
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
> แผนวิจัยเร่งด่วน	→	→	→	↓						
> แผนวิจัยปกติ	→	→	→	→	→	↓				
> แผนวิจัยก้าวไกล	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
เป้าหมายภูมิปัญญา	รอดวิกฤต			ฐานมั่นคง				ก้าวไกล		

ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองที่ยังมียังเป็นในปัจจุบันของผู้คน ชุมชน และประเทศ หากทางพื้นฟูคลี่คลายภาวะเสียสมดุลทุกด้านทั้งธรรมชาติ แวดล้อม เศรษฐกิจ จิตใจคน เทคโนโลยีและสังคมโดยให้พื้นกลับอย่างสัมพันธ์กันแบบองค์รวมและการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อให้มีวงในที่เข้มแข็งหรือรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง จากนั้นก็ทบทวนและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งส่วนดีส่วนเสียจากการพัฒนาที่ผ่านมาและจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะเกิดขึ้น สืบสานเสริมต่อภูมิปัญญาเดิม ริเริ่มสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใหม่ให้กลมกลืนก้าวหน้าทั้งภูมิปัญญาทางจิตใจและวัตถุเช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดแนวทางมาตรการกลั่นกรองต่อสู้แข่งขันทั้งรุกทั้งรับในเวทีเศรษฐกิจการค้า การเงิน การเมือง การทหารระหว่างประเทศ แล้วก้าวเดินหน้าอย่างอาจหาญสู่วงนอกอย่างเท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ ต่อไปอีก

สุนทรพจน์ปรัชญาและนักยุทธศาสตร์ชาวจีนโบราณเขียนไว้ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ไม่รู้เขาแต่รู้เรา ชนะครั้งแพ่ครั้ง ไม่รู้เขาและไม่รู้เรา รบร้อยครั้งพ่ายร้อยครั้ง” เปรียบได้ว่าการพัฒนาที่ผ่านมา “ไม่รู้เขาและไม่รู้เรา รบร้อยครั้งพ่ายร้อยครั้ง” บ้านเมืองจึงมีปัญหาล้ำสมดุลง่อนหน้าเป็นทุกซัดกสู่สภาวะวิกฤต การแก้ไขปัญหาก็ควรเริ่มจาก

“ไม่รู้เขาแต่รู้เราชนะครั้งแพ่ครั้ง” คือ กลับมารู้เรา รู้จักตนเอง คลี่คลายภาวะเสียสมดุลเสริมวงในหรือฐานจนมั่นคงและหลุดพ้นวิกฤต แม้ไม่เก่งกาจต่อสู้เอาชนะได้โดดเด่นเช่นประเทศอื่น แต่บ้านเมืองก็ฟื้นฟูสู่สภาพอยู่เย็นเป็นสุขตามอัตภาพตามกาลเทศะใหม่ จากนั้นจึงพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถขึ้นไปอีกให้ “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ยินห์หยดอย่างองอาจมั่นคงเชื่อมั่นไม่เสียเปรียบในเวทีสากลของการต่อสู้แข่งขันระหว่างประเทศต่อไป

4. กิตติภาพการวิจัยแห่งชาติ

ทิศทางการวิจัยแห่งชาติในระยะยาวควรมุ่งสู่การเสริมสร้างภูมิปัญญาของผู้คนชุมชนและประเทศให้มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองเพิ่มสูงขึ้น ที่จะนำไปสู่เป้าหมายของสภาพบ้านเมืองอยู่

เย็นเป็นสุขดำรงอยู่อย่างสมดุลยั่งยืน ในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ (Globalization) แต่โดยความเป็นท้องถิ่นไทย ดิงาม (Localization)

กลยุทธ์การวิจัยควรมีรูปแบบเชิงกระบวนการที่มุ่งเป้าหมายไปที่การแสวงหาภูมิปัญญาเพื่อสามารถรอดอยู่อย่างสมดุลในภาวะวิกฤต ภูมิปัญญาเพื่อสามารถสร้างฐานให้สมดุลมั่นคง ภูมิปัญญาเพื่อสามารถก้าวไกลอย่างสมดุลในเวทีโลก ทั้งนี้โดยมีแผนอยู่ 3 แผน ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน คือ แผนวิจัยเร่งด่วนระยะสั้น แผนวิจัยปกติระยะปานกลาง แผนวิจัยก้าวไกลระยะยาว ดังนี้

แผนวิจัยเร่งด่วนระยะสั้น มีระยะเวลาประมาณ 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2543-2545 มีเป้าหมายการ



วิจัยอยู่เพื่อการแสวงหาภูมิปัญญาเพื่อสามารถรอดอยู่อย่างสมดุลในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการวิจัยจำแนกตามระดับ คือ ระดับปัจเจกชนหรือครอบครัว ระดับชุมชนทั้งในชนบทและเมือง ระดับหน่วยประกอบการหรือองค์กรภาครัฐ และธุรกิจเอกชน ระดับประเทศซึ่งหมายถึงรวมถึงการดำเนินนโยบายและแผนของรัฐบาล และการดำเนินการของรัฐสภา และพรรคการเมือง

คำถามหลักการวิจัยคือ “ในท่ามกลางวิกฤต แต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับผลกระทบอย่างไรขนาดใด มีปรัชญาแนวคิด แนวทางหรือวิธีการอยู่รอดอะไรและอย่างไร ผลเป็นอย่างไร สมดุลหรือเสียสมดุลรอดอยู่สู่ปกติหรือว่าทรุดหนัก”

โครงการวิจัย (Projects) อาจมีจำนวนมากหลากหลายแต่จัดระบบให้อยู่ในชุด (Packages หรือ Programs) เดียวกันตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ แต่ละโครงการอาจมีงบประมาณไม่มาก ระยะเวลาสั้นไม่ควรเกินหนึ่งปี เมื่อสิ้นสุดก็เริ่มใหม่อีกได้หรือหากจำเป็นต้องไม่เกินสามปี แบ่งเป็นขั้นตอนมีผลงานทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้ได้คำตอบกรณีตัวอย่างที่ดีเป็นระยะๆ ตลอดสามปีเพื่อเผยแพร่เป็นแนวคิดแนวทางหรือทางออกเป็นภูมิปัญญาสำหรับผู้คน ชุมชน องค์กรอื่นที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกันจะได้ใช้ประโยชน์ให้สามารถดำรงรอดอยู่ได้ในช่วงภาวะวิกฤต วิธีวิจัยอาจหลากหลายทั้งการสัมภาษณ์ การเสวนากลุ่มย่อย การประชุม ระดมความคิด การศึกษากรณีตัวอย่างแต่ภายในกรอบคำถามหลักเดียวกัน

การวิจัยดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางปฏิบัติ เปลี่ยนจากการมอง



ภาพว่า “ภาวะวิกฤตคือปัญหา” เป็น “ภาวะวิกฤตคือโอกาส” โอกาสที่จะได้บทเรียน ได้เรียนรู้ ได้ทางออก โอกาสที่จะทบทวนภูมิปัญญา และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพื่อสามารถดำรงรอดอยู่ในท่ามกลางวิกฤตของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเมื่อบูรณาการเป็นองค์รวมก็จะได้ภูมิปัญญาแห่งชาติว่าด้วยความสามารถในการดำรงอยู่อย่างสมดุลในท่ามกลางวิกฤต สามารถจัดทำเป็น “แผนชาติว่าด้วยการดำรงรอดอยู่ในภาวะวิกฤต” ได้

ในอนาคต ในท่ามกลางการแปรเปลี่ยนไม่แน่นอนหรือยากต่อการคาดการณ์ ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้แข่งขันเอาเปรียบระหว่างประเทศ มีโอกาสที่ประเทศไทยของเราจะเผชิญภาวะวิกฤตอีกครั้งหรือหลายครั้ง การเตรียมภูมิปัญญาหรือแผนไว้จึงเป็นความชาญฉลาดซึ่งแน่นอนต้องมีการเสริมภูมิปัญญาและปรับแผนเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตใหม่ในกาลเทศะใหม่

แผนวิจัยปกติระยะปานกลาง มีระยะเวลาประมาณ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2543-2547 ที่จำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันไป มีเป้าหมายการวิจัยอยู่เพื่อการแสวงหาภูมิปัญญาเพื่อสามารถสร้างฐานให้สมดุลมั่นคง สอดรับกับเป้าหมาย

แผนวิจัยเร่งรัด คือไม่เพียงแต่มีภูมิปัญญาให้สามารถดำรงรอดอยู่ในท่ามกลางวิกฤต แต่ยังมีภูมิปัญญาให้สามารถฟื้นฟูภาวะเสียสมดุลที่สะสมทับทวีมานานปี รวมทั้งสามารถเสริมสร้างภาวะสมดุลใหม่ให้เคลื่อนไหวมั่นคงแบบพลวัตทั้งโดยรวมและแต่ละด้าน ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ธรรมชาติแวดล้อมจิตใจคนและสังคม และในทุกระดับนับแต่ปัจเจกชนและครอบครัวชุมชนทั้งในชนบทและเมือง องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงระดับประเทศ

การวิจัยอาจแยกออกเป็น 3 ชุดหรือแผนงาน คือ

(1) การวิจัยเพื่อประมวลและบูรณาการบรรดาองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน องค์ความรู้ของชุมชนที่ได้พยายามพึ่งตนเองและบรรลุผล ผลงานวิจัยที่กระจัดกระจายในสาขาวิชาหรือเรื่องต่างๆ ให้เป็นองค์รวมเป็นภูมิปัญญา คำถามหลักของการวิจัยก็คือ **“มีภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมจนถึงปัจจุบันเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองทั้งโดยรวมแต่ละด้าน แต่ละระดับอะไรบ้างมากน้อยเพียงใด”** เป็นการวิจัยแบบบูรณาการ (Integrated Research)

(2) การวิจัยเพื่อแสวงหา ภูมิปัญญาใหม่ให้เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ การวิจัยควรเริ่มจากการมองประเทศ และความต้องการภูมิปัญญาของ ประเทศบนฐานทัศนะแม่บทแบบ องค์รวม (Holistic Paradigm) ซึ่ง เป็นการมองเชิงความสัมพันธ์เป็น หนึ่งเดียว อุปมาเช่นสถาปนิกออกแบบอาคารจะมองภาพบทบาท อาคารและภูมิทัศน์โดยรวมก่อน แล้ว จึงคิดคำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วน ประกอบและวัสดุที่จะใช้ คำถามหลัก ของการวิจัยชุดนี้ก็คือ “มีภูมิปัญญา ใหม่อะไรบ้างที่ต้องแสวงหาเพื่อให้ สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต ใน กาลเทศะใหม่ ในกระแสโลกาภิวัตน์” อาจเรียกรูปแบบการวิจัยนี้ว่า **การวิจัยแบบองค์รวม (Holistic Research)** มีใช้การวิจัยแบบแยกส่วน หรือเชิงเดียว

(3) การวิจัยเพื่อชุมชน ของ ชุมชน โดยชุมชน กลุ่มเป้าหมายหลัก ควรเป็น **ชุมชนชนบทระดับตำบล** ด้วยเหตุผลสองประการคือ ประการ แรกหากชุมชนชนบทซึ่งมีอยู่จำนวนมากมากระจายอยู่ทั่วไปสามารถพึ่ง ตนเองได้ จะหนุนเสริมการพึ่งตนเอง ของชุมชนเมืองรวมทั้งเป็นฐานที่มั่นคงของการพึ่งตนเองระดับประเทศ ประการที่สองมีองค์การบริหารส่วน ตำบล (อบต.) ซึ่งเป็นองค์กรใหม่ หากช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ ให้เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นการดี โดยเฉพาะ ขีดความสามารถในการจัดการ เพื่อ การพึ่งตนเองของชุมชน ซึ่งหมายถึง ขีดความสามารถในการนำชุมชน ใน การวิเคราะห์สภาพและปัญหาชุมชน ในการกำหนดวิสัยทัศน์และวางแผน ชุมชน ในการจัดระบบการประสาน งานและการปฏิบัติ ในการติดตาม ประเมินผลงาน และผลการพึ่งตนเอง ของชุมชนโดยรวมหากขีดความ สามารถของ อบต. สูงขึ้นจะรองรับและ

สนองแนวนโยบายของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ฉบับ ปัจจุบันที่ว่าด้วยการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมการพึ่งตนเอง

การวิจัยในชุดนี้ไม่ควรยึดติดกับรูปแบบวิธีวิจัยเพื่อทางวิชาการ ของทางวิชาการ โดยนักวิชาการกัน มากนักควรปรับให้สอดคล้องกับวิถี การดำรงอยู่และภูมิปัญญาชาวบ้าน ควรเป็นรูปแบบ “การทบทวนค้นหา ตนเองโดยมุ่งมั่นและความมานะ พยายามของตนเองเพื่อการดำรงรอด อยู่อย่างพึ่งตนเอง” ชุมชนแสวงหา องค์ความรู้ด้วยตนเอง องค์ความรู้ที่ ได้ควรฝังอยู่ในวิถีชีวิตจิตวิญญาณ จิต ใจจิตสำนึกของชุมชน เป็นภูมิปัญญา ของชุมชน การวิจัยหรือโครงการวิจัย จึงควรดำเนินการโดยชุมชนมีกลุ่มผู้



นำชุมชนและผู้คนของชุมชนเป็นหลัก ในรูปแบบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม (PAR : Participatory Action Research) ซึ่งมีผู้นำหรือ กลุ่มผู้นำเป็นหัวหน้าโครงการ นำพา ผู้คนของชุมชนวิจัยค้นหาตนเองและ พึ่งตนเอง โดยมีนักวิชาการและนัก พัฒนาของท้องถิ่นหรือส่วนกลางเป็น ที่ปรึกษาช่วยเหลือแนะนำ

การจัดทำเอกสารแนะนำ หรือคู่มือวิจัย หรือการจัดการเพื่อ การพึ่งตนเองของชุมชน การให้การ อบรมแก่เจ้าหน้าที่ อบต. กลุ่มผู้นำ ชุมชน จะเป็นส่วนช่วยการนี้อย่างมาก

สำหรับการวิจัยการพึ่งตน เองของชุมชนเมืองก็เป็นสิ่งจำเป็น แต่ต้องพิจารณาในอีกรูปแบบหรือ หลากหลายรูปแบบ เพราะเมืองมี

ความต่างกันในบทบาทในขนาดใน สภาพปัญหา กรณีเมืองกรุงเทพมหานครหากมองในมุมของวัตถุประสงค์เจริญ ทันสมัยที่สุดด้วยยี่ห้อรถใหม่และตึกสูง แต่เมื่อมองในมุมการพึ่งตนเองจะมี ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองต่ำ สุด เสียสมดุลสูงสุด หมดภูมิปัญญา ในการจัดการจราจรที่ติดขัด อากาศ เสีย น้ำเน่า ชะงักโต ภูมิทัศน์เลว- ไหล ผู้คนรื้อร่นกระหืดกระหอบสุด ขีดแย้งซึ่งที่ว่างผิวจราจรที่จอดรถ รื้อร่นหารายได้ หางาน หอาหาร กินนับแต่รุ่งเช้าจนเลยเที่ยงคืน ครอบครัวยุคใหม่เป็นครอบครัว เพราะไม่มีเวลาให้แก่กันเพราะรถติด บ้าง ต้องหาเงินหางานบ้าง เข้าสังคม บ้าง พ่อไปทางแม่ไปทาง ลูกไปทาง ครอบครัวขาดความใกล้ชิดขาดความ อบอุ่น ชุมชนแทบไม่เป็นชุมชน เพื่อนบ้านติดกันแทบไม่รู้จักกันมีรั้ว กำแพงบ้านสูงล้อมรอบ ต่างคนต่าง อยู่แทบไม่มีเวลาพูดคุยช่วยเหลือหรือ ร่วมกันดูแลชุมชน ยาเสพติด ยาม้า ซ่องโสเภณี บ่อนการพนัน โจรขโมย มีอยู่แทบทุกมุมเมือง วุ่นวายสับสน อลหม่านไปตามกระแสวัตถุนิยม ทั้งหมดคือภาพของเมืองทันสมัยแต่ไร้ ภูมิปัญญา

แผนก้าวไกลระยะยาว มี ระยะเวลาประมาณ 10 ปี ระหว่าง- พ.ศ. 2543-2552 มีเป้าหมายการ วิจัยอยู่ที่การแสวงหาภูมิปัญญาเพื่อ สามารถก้าวไกลอย่างสมดุลในเวทีโลก โดยอาจแบ่งชุดหรือแผนงานวิจัยเป็น 3 ชุด คือ

(1) การวิจัยเพื่อประมวล องค์ความรู้ที่สะสมและมีอยู่ใน ปัจจุบันที่เกี่ยวกับต่างประเทศและ กระแสโลก และบูรณาการให้เป็นองค์ รวมเป็นภูมิปัญญา เป็นการตรวจสอบ ต้นทุนทางภูมิปัญญาที่มีอยู่ เพื่อ ให้ “รู้เขา” สอดรับกับ “รู้เรา” ของ แผนวิจัยที่ได้กล่าวมา



(2) การวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นภูมิปัญญาใหม่เกี่ยวกับต่างประเทศและกระแสโลก รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

(3) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งควรแบ่งเป็น 2 ชุดย่อยให้ชัดเจนคือ

ชุดแรก การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ที่เน้นเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ อย่างเหมาะสม เพื่อการพึ่งตนเอง โดยวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเองภายในประเทศ หากต้องนำเข้าเทคโนโลยีต่างประเทศควรต้องจริงจังในการกลั่นกรอง เลือกรับและซึมซับให้เป็นของไทย ประการสำคัญต้องมีให้มีผลกระทบทางลบต่อการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีของไทย

ชุดที่สอง การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ที่เน้นการมองการณ์ไกลไปในอนาคตระยะยาว การสร้างนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ให้มีชื่อเสียงระดับโลก จนถึงระดับการมีนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ซึ่งเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยจะไม่ยิ่งใหญ่อีกเป็นประเทศมหาอำนาจ แต่จะได้รับความนับถือ เชื่อถือนิยมยกย่องทางภูมิปัญญาจากนานาชาติประเทศเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรี

ความเจริญทันสมัยที่แท้จริง

5. บทส่งท้าย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นอัจฉริยะ ทรงเข้าใจและหยั่งรู้สถานการณ์ทั้งใกล้และไกล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทรงมีเมตตาปราณีต่อพสกนิกรอาณาประชาราษฎร์ ทรงให้คำแนะนำและหาทางออกสำหรับวิธีการดำรงอยู่ของผู้คนชุมชนและประเทศเสมอมา

พระราชดำรัสของพระองค์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2540 ล้วนแฝงด้วยปรัชญาแนวคิด แนวทางเพื่อการหลุดพ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ จากภาวะเสียสมดุลจนบ้านเมืองร้อนรนเป็นทุกข์ ให้ฟื้นฟูกลับสู่ภาวะสมดุลแบบพลวัตมุ่งเป้าหมายของการมีสภาพบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขตามกาลเทศะที่เปลี่ยนไป

ข้อความบางตอนของพระราชดำรัสว่า “ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมด แม้จะไม่ถึงครึ่งอาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็จะสามารถที่จะอยู่ได้” และว่า “มีความจำเป็นที่จะต้องถอยหลังเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไป และถ้าไม่ทำอย่างที่ว่าก็จะแก้วิกฤต การณ์นี้ยาก” สะท้อน

ปรัชญาเชิงยุทธศาสตร์การดำรงอยู่ที่ว่า รู้จักสู้รู้จักถอย เมื่อเสียสมดุลก็ต้องถอยกลับมาหาจุดที่สมดุล ถอยจากวงนอกที่แปรปรวนกลับมาหาวงในที่มั่นคง มีใช้ถอยเพื่อถอย แต่ถอยเพื่อกลับไปสู่ใหม่หรือก้าวหน้าต่อไปเมื่อสมดุลมั่นคง เมื่อโอกาสอำนวยหรือเมื่อกาลเทศะเหมาะสม อีกข้อความว่า “สมัยนี้เป็นสมัยที่พูดกันได้ว่าโลกาภิวัตน์ ซึ่งเราจะต้องทำตามประเทศอื่นด้วย” และว่า “ของเขาเองก็มีวิกฤตการณ์เหมือนกัน” สะท้อนปรัชญาการรู้เข้าใจเรา รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น ซึ่งเป็นทั้งปรัชญาของการพึ่งตนเองและการทำสงครามให้ชนะ ข้อความท้าย พระราชดำรัสเกี่ยวกับต้องสามัคคีกันว่า “จะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานตามหน้าที่ และเมื่อทำหน้าที่แล้วก็หวังดีต่อผู้อื่น อันนี้จะเป็นหลักที่สำคัญ คือทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” สะท้อนปรัชญาแห่งการมีส่วนร่วมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เกื้อกูลเมตตาอารีด้วยความรักความเข้าใจ ความปรารถนาดีต่อกันในความเป็นเพื่อนร่วมชาติมนุษยและสรรพชีวิตด้วยกัน อันเป็นคุณธรรมคำจูนโลกให้สามารถดำรงอยู่อย่างสันติมั่นคงยั่งยืนเป็นนิรันดร์






บริษัท อิตาลีมาร์ จำกัด

ITALMAR CO., LTD.

766 ซอยเกษมสุวรรณ (สุขุมวิท 50) ถนนสุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพฯ โทร. 3319090-3

ผู้แทนจำหน่าย

FAX : 3319094



The "360 degree-turn" is already integrated

No matter how tight you secure the LABMAX - with or without the adapter - you can direct the discharge tube with 1 simple turn, wherever you wish to direct it.

For example: above the label of the bottle which should be visible when working with a Dispenser.

The use of adapters for different bottle threads does not limit this function!

"Air-purging" without problems or loss of reagents

Turn the operation mode selector to the right at a 90 degree angle. A marker and the discharge tube will indicate the right position. Remove (purge) the air by several pumping actions. No reagent is lost as you are pumping in a closed circuit.

If you do not wish air exchange between reagent and room air the LABMAX is equipped with a bushing which allows the simple attachment of different filters as well as calcium chloride tubes or a check valve.


Easy and fastest possible volume selection

Adjusting the volume of the LABMAX is done by a quick-adjust knob. The desired volume is set by a sprocket. Just push the knob - move to the desired volume - release - that's all!

Precise reproducibility of the volume in the clinical field, science and research - the word is LABMAX. After all - if the LABMAX has to be disassembled e.g. for cleaning it does not need to be re-adjusted after assembling. The zero-point is part of the construction and automatically calibrated.

The LABMAX may be **completely disassembled**, an advantage when cleaning the Dispenser. Please follow the instruction manual.

Due to easy disassembly all parts of the LABMAX may be replaced without any problem.



เชื่อไหม ? 24 บรรทัดของหน้านี้จะทำให้
ผู้หญิงทุกคนที่อยากมีรูปร่างเพรียวสวย
เพื่อความมั่นใจในสังคม ... เป็นจริง

🍷 เพราะปัญหาหนักใจของผู้หญิงทุกคนถูกไขคำตอบออกมาอย่าง
 สมบูรณ์ เมื่อศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา นักวิทยาศาสตร์ไทยได้พัฒนา
 การสกัดสารธรรมชาติเอชซีเอ (HCA) จากผลส้มแขกสำเร็จ

🍷 โดยใช้กระบวนการสกัดด้วยเทคโนโลยีทันสมัยให้อยู่ในรูปของผง
 สีขาวบริสุทธิ์ได้เป็นรายแรก ในชื่อ สูตรซูเปอร์ ไฮ-โซล มีคุณสมบัติยับยั้ง
 การเกิดไขมันส่วนเกินที่เกิดจากอาหารจำพวกแป้ง ข้าวและน้ำตาล
 สามารถผสมในเครื่องดื่มร้อน-เย็น ดื่มก่อนรับประทานอาหาร
 เพียง 1 ชอง ให้ความสะดวกสำหรับผู้หญิงยุคใหม่

เพียง 24 บรรทัดของหน้านี้ ทำให้คุณหุ่นดีขึ้น

🍷 นอกจากนี้สารสกัดเอชซีเอชนิดผง สูตรซูเปอร์ไฮ-โซล ได้รับการ
 ตรวจสอบวิเคราะห์โดยหน่วยงาน NIPPON SHINYAKU CO.,LTD.
 ที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่า สารสกัดจากผลส้มแขกชนิดผง
 สูตรซูเปอร์ไฮ-โซล มีเอชซีเอสูงถึง 70-73% และละลายน้ำได้ 100%
 จึงทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 พบว่ากว่า 80% ของผู้ใช้นี้มีไขมันส่วนเกินลดลง โดยเฉพาะบริเวณ
 หน้าท้อง สะโพก รอบเอว ต้นแขนและต้นขา

🍷 เป็นความภาคภูมิใจของคณะนักวิทยาศาสตร์ไทยที่สามารถ
 สกัดสารธรรมชาติจากผลส้มแขกชนิดผงสูตรซูเปอร์ ไฮ-โซล
 ได้เป็นผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพดีกว่าสารสกัดชนิดเดียวกัน
 ที่มีอยู่ขณะนี้ นับเป็นสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อหุ่นเพรียว
 สวยของผู้หญิงยุคใหม่รับศักราชที่จะถึงอย่างแท้จริงและนี่คือ
 บรรทัดที่ 24 ที่เราหวังว่าจะเป็นเลขเดียวกับเอวของคุณ

ไฮโดรไลท์



สารสกัดจากผลส้มแขกชนิดผง
สามารถละลายน้ำได้ 100%
ใช้ผสมกับอาหารหรือเครื่องดื่ม
ร้อน-เย็น วันละ 2-3 ชอง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฮโดรไลท์
 กรุณาติดต่อประจำร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
 หรือสายด่วนสุขภาพ โทร 938-7123



RICE PRODUCTS

MANUFACTURER & DISTRIBUTOR OF

Rice Flour, Glutinous Rice Flour, Rice Starch, Glutinous (Waxy) Rice Starch, Modified Starches, Rice Vermicelli, Rice Stick, Rice Noodle, etc.

Produced by Modern and Computerized Processes.
Advanced Laboratory, Standard Test and Control Assure
Customers of High and Consistent Quality Products.

CHO HENG RICE VERMICELLI FACTORY CO., LTD.

Office: 494/15-16 Vanich 1 Road, Sumpantawong
Bangkok 10100, Thailand
Tel: (66-2) 224-0144 (10 lines), 222-2184-5
Fax: (66-2) 224-0992, 224-5689, 433-6309, 457-1915
Cable: CHOHELO BANGKOK
E-Mail: choheng@ksc15.th.com

Factory 19, Moo 1, Petkasem Road, Yaicha, Sampran
Nakhon Pathom 73110, Thailand
Tel: (66-34) 321-661-3, 225-240 (10 lines)
Fax: (66-34) 321-660, 323-280



ANAKE MACHINERY CO., LTD.

บริษัท เอนก แมชชีนเนอร์ จำกัด



MADE IN THAILAND

30/22 หมู่ 4 ซ. โกสุมรวมใจ 33 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210


30/22 Moo 4, Soi Kosumruamjai 33, Viphavadee-Rangsit Rd., Sikan, Donmuang Bkk. 10210

โทร. 503-7726, 503-7691, (01) 490-8546 แฟกซ์ 503-7726


ผู้ผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ภายในประเทศและส่งออก

ระบบโรตารี อัตโนมัติ ถึงอัตโนมัติ

ROTARY PISTON FILLING MACHINE
เครื่องบรรจุโรตารีระบบตวงปริมาตร 18 หัว




ROTARY SCREW CAPPING MACHINE
เครื่องรีดฝาเกลียวระบบโรตารี 4 หัว



ROTARY RINSER MACHINE
เครื่องล้างขวดระบบโรตารี 24 หัว



ROTARY MONOBLOC FILLING MACHINE
เครื่องบรรจุระบบโรตารี 36 หัว



* เครื่องบรรจุผงแป้ง *

* เครื่องบรรจุของเหลว ผง และครีมข้น *

* เครื่องปิดฝา ขันฝา ฝาฟอยล์ ฝาจีบ ฝาจุก *

* เครื่องฉีกฝาเกลียว *

* เครื่องปิดฉลาก คอขวด ข้างขวด 1 หรือ 2 ตำแหน่ง *

เครื่องทากาวปิดกล่อง เครื่องอบฟิล์มห่ออัตโนมัติ

* รับออกแบบซ่อมสร้าง และให้คำปรึกษา *

บริษัท เบอรัมิด้าไทย จำกัด

BERMUDA THAI CO., LTD.

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องกรองน้ำแร่



มีรายการเงินทุน พร้อมกำไร แก่ผู้ซื้อน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เท่ากับท่านซื้อแล้วมีกำไร

BERMUDA THAI CO., LTD.
SOLAR WATER HEATER

FREE HOT WATER


1. ได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงิน 7,877 บาท จากคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
2. เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ทรงประสิทธิภาพ

สำหรับบ้านยุคใหม่

พลังงานแห่งชาติ



3. รับสมัครผู้จัดจำหน่าย โทร. 375-9055 , 377-9827

รับประกัน 10 ปี



โลโก้และรางวัลเกียรติยศของกระทรวงอุตสาหกรรมจากปี 2523-2539



เบอรัมิด้า....รู้คุณค่าพลังงาน
Know! How to Conserve Energy

ถ้าท่านต้องการซื้อ แล้วได้เงินคืนพร้อมกำไร
ต้อง BERMUDA 'A ONE WAY'
มีสินค้าหลายชนิด

81/1 ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

81/1 Sereethai, Klongkum, Beungkum, Bangkok 10240 Thailand.

Tel. 377-9827, 375-9055, 732-6267, 732-6289 FAX : 732-6266




ความมหัสจรรย์ของพืช 6

พนัส บูรณศิลป์


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900



มีพืชจำนวนไม่น้อยในโลก ที่มีคุณสมบัติพิเศษซ่อนเร้นอยู่ เป็นคุณสมบัติอันน่ามหัศจรรย์ เช่นสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ หรือทำให้เกิดอารมณ์เคลิบเคลิ้มมีความสุข หลายชนิดกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ บางชนิดช่วยลดความเจ็บปวด หรือทำให้หลับอย่างสงบใสยาวนาน คุณสมบัติอันน่ามหัศจรรย์เหล่านี้ คนโบราณล้วนได้เคยนำมาใช้ประโยชน์แล้วทั้งสิ้น อาทิ ใช้พืชที่ช่วยลดความเจ็บปวดและทำให้หลับยาวนานเป็นยาสลบเมื่อครั้งที่ยังไม่มีการค้นพบสารอีเธอร์ (ether) หรือใช้พืชที่ทำให้เกิดอารมณ์ดี สิมทุกขลิ้มโสภณนำมาเคี้ยวในพิธีทางศาสนา พิธีแต่งงาน และฝังศพ เป็นต้น พืชที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศมักจะได้รับความนิยมอย่างสูง และคุณสมบัติอันวิเศษของต้นไม้ดังกล่าวนี้ถึงกับเคยมีประวัติว่า กษัตริย์ของบางประเทศ ยอมแลกสินค้าทั้งลำเรือกับเมล็ดของต้นไม้เพียงเมล็ดเดียวก็ยังมิอย่างไรก็ตาม

การนำมาใช้ประโยชน์ บางครั้งก็ เป็นไปในทางไม่ถูกต้องทำนอง คลองธรรมเท่าใดนัก เช่นพวกพ่อมดหมอผีใช้พืชบางชนิดเปลี่ยนคน ให้เป็นผีดิบเพื่อนำไปใช้เป็นแรงงาน ทาสในไร่อ้อยหรือบางชนิดนำมาใช้ เสพเพื่อให้เห็นภาพสวยสดงดงาม วิจิตรตระการตาสร้างความ เพลิดเพลินจนกลายเป็นสิ่งเสพติด ขึ้นในภายหลังก็มี เป็นต้น



มาถึงยุคปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เจริญก้าวหน้า การใช้ประโยชน์จากพืชมหัศจรรย์ เหมือนเช่นในอดีตนับวันมีแต่จะ ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป พร้อมๆ กับป่าไม้ที่ถูกทำลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็หมายถึงพันธุกรรมของพืช เหล่านี้กำลังล่อแหลมต่อการสูญหายไปด้วย จึงได้แต่เพียงหวังว่า นับแต่นี้เป็นต้นไปมนุษยชาติน่าจะได้ตระหนักถึงความสูญเสียแล้วช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ และที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือให้รู้ถึงคุณค่าของ คุณสมบัติพิเศษที่พืชแต่ละชนิดมีอยู่นั้น แล้วหาทางนำมาพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับสังคม ปัจจุบันของเราต่อไป

บทความเรื่องนี้มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอเรื่องราวของพืชที่มีคุณสมบัติแปลกๆ ซึ่งคนโบราณเคยใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมาแล้ว มาเล่าสู่กันฟัง โดยหวังที่จะให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ดังกล่าว



มะพร้าวทะเล (coco-de-mer หรือ sea palm) : โตไม่รู้ลั้ม แห่งมหาสมุทรอินเดีย

มีต้นไม้อยู่นิดหนึ่งให้ผลขนาดใหญ่รูปร่างประหลาดคล้ายลูกมะพร้าวแปด ความยาววัดได้ถึง 40 ซม. เส้นรอบวง 105 ซม.หนัก 20 กก. หรือบางทีอาจพบที่หนักกว่านี้เป็น 2 เท่าก็ยังมี ส่วนเมล็ดนั้นก็ถือกันว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพืชทั้งหลายในโลกนี้ที่เดียว ผลไม้ยักษ์ที่ว่านี้เมื่อผ่าออกดูแล้วจะพบว่ามันลักษณะเหมือนมะพร้าว 2 ลูกเชื่อมติดกันที่ตรงกลาง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “the double coconut” ชื่อนี้ไม่น่าจะถูกต้องเหมาะสมเท่าใดนัก เพราะแท้ที่จริงมะพร้าวทะเลไม่ใช่มะพร้าว แต่เป็นปาล์มชนิดหนึ่งที่มีใบรูปพัด (fan-leaf palm) มีเพศแยกกันอยู่คนละต้น (dioecious) ซึ่งต่างกับมะพร้าวที่เป็นปาล์มชนิดใบรูปขนนก (feather-leaf palm) มีทั้ง 2 เพศอยู่บนต้นเดียวกัน (monoecious)

และไม่เพียงขนาดของผลอันใหญ่โตมหึมาเท่านั้น แต่รูปร่างก็ออกจะค่อนข้างแปลกประหลาดด้วยเช่นกัน คือจะมองดูคล้ายศีรษะท่อนล่างของผู้หญิง (อ้วน) ยิ่งง้างงั้นเลยที่เดียว จนกระทั่ง Carl Linnaeus นักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดนผู้มีชื่อเสียงเกิดจินตนาการอันสุนทรีย์ตั้งชื่อสกุล (genus) ต้นไม้ที่มีผลรูปทรงชวนให้ว้าวุ่นใจนี้ว่า *Lodoicea* ตามชื่อของอิตาการิชตริยไพรแอม (Priam) กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงทรอย (Troy) ซึ่งมีกิตติศัพท์ว่ามีความงามเป็นนักหนา

อย่างไรก็ตาม ขนาดและรูปร่างหาใช่คุณสมบัติที่มีคุณค่าสัก




ผลของมะพร้าวทะเล ที่ว่ากันว่ามียูปร่างคล้ายศีรษะท่อนล่างของผู้หญิง (ภาพจากหนังสือ *The Strangest Plants in the World* เขียนโดย S.Talalaj และคณะ)

เท่าใดไม่ สรรพคุณที่มีอยู่ในผลนั้นต่างหากที่ทำให้มะพร้าวทะเลเป็นสุด

ยอดของความปรารถนาจนทำให้ไม้ต้นนี้ชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดมาแล้วในอดีต

ลูกมะพร้าวทะเลที่เจริญเต็มที่แต่ยังไม่แก่จนเกินไป เนื้อในจะมีลักษณะเป็นมันคล้ายเยลลี่ มีรสมัน (nutty flavor) เป็นที่นิยมรับประทานกันทั่วไปในหมู่ชาวเกาะ



ภาพแสดงเนื้อ (endosperm) ที่อยู่ภายในกะลาของลูกมะพร้าวทะเล ซึ่งเมื่อยังอ่อนอยู่จะอ่อนนุ่ม มีรสมัน รับประทานได้ และมีสรรพคุณดังกล่าไว้ในเรื่อง (ภาพจากหนังสือ *Palm of the World* เขียนโดย J.C. McCurrach)



ความกึ่งสารของพืช

บริเวณมหาสมุทรอินเดียที่มีปาล์มต้นนี้ขึ้นอยู่ ทั้งเป็นที่รู้จักกันว่าเหื่อมะพร้าวทะเลที่ว่ามีคุณสมบัติเป็นยาแก้พิษ สามารถทำลายล้างสารที่มีพิษร้ายแรงที่สุดได้อย่างชดเชยกันว่า หากเอาเครื่องดื่มหรืออาหารที่มียาพิษเจือปนอยู่ใส่ลงในกะลามะพร้าวทะเลนี้ พืชนั้นก็จะมีกลิ่นหอมจากนั้น นอกจากนั้น เหื่อมะพร้าวที่ว่ากันว่าทั้งนุ่มทั้งมันอร่อยมากนั้น ยังเป็นที่ยอมรับกันในเวลาต่อมาด้วยว่ามีฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศหรือพูดให้ฟังง่าย ๆ ก็คือมีสรรพคุณเป็นยาป๊อที่ดียเยี่ยม นั่นเอง สรรพคุณอื่น ๆ คือทั้งน้ำทั้งเหื่อใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับน้ำดีและท้องเฟ้อ ส่วนกะลามะพร้าวนำมาทำเป็นยาต้มช่วยลดน้ำตาลในคนป่วยโรคเบาหวานได้

มหาราชชาของอินเดีย หรือ กษัตริย์ในยุโรปที่โดยปกติก็มักจะมียศครูและกลัวการถูกลอบปลงพระชนม์อยู่แล้ว จึงต่างยินดีจ่ายแบบสุราคาราไม่อันเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของลูกมะพร้าวทะเลอันน่าอัศจรรย์ที่ว่านี้ พระเจ้ารูดอล์ฟที่ 1 แห่งออสเตรียเคยเสนอซื้อลูกมะพร้าวทะเลถึงผลละ 4,000 ฟลอรีน (1 Florin = 6 Shilling) ซึ่งนับเป็นเงินจำนวนมหาศาลไม่น้อย ขณะเดียวกัน กษัตริย์ของประเทศแถบยุโรปอีกบางองค์ก็เคยยื่นข้อเสนอแลกสินค้าอันมีค่าทั้งลำเรือกับมะพร้าวทะเลเพียงผลเดียวมาแล้วเช่นกัน จึงอาจพูดได้ว่าผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของลูกมะพร้าวทะเลในเวลานั้นคงมีแต่เฉพาะกษัตริย์และคนชั้นสูงเท่านั้น แลดูเหมือนอินเดียตะวันออกถึงกับมีการออกกฎเหล็กขึ้นใช้โดยเฉพาะเลย

ว่า สามัญชนคนใดมีมะพร้าวทะเลไว้ในครอบครองจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงด้วยการตัดมือทั้งเลยทีเดียว

หากสงสัยว่าอะไรกันนักกันหนาจึงได้ทำให้ลูกมะพร้าวทะเลมีราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนสูงมากมายถึงปานนั้น ก็คงตอบได้ว่าเพราะลูกมะพร้าวทะเลมีสรรพคุณสนองความต้องการช่วยล้างความกลัวอย่างที่สุดของมนุษย์ 2 ประการได้ คือกลัวตาย (เพราะช่วยล้างพิษ) กับกลัวเป็นโรคมะเร็ง (เพราะช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ) บวกกับอีกสาเหตุหนึ่งคือความเป็นพืชที่หายากมากนั่นเอง

0000000000

ราว ๆ ต้นศตวรรษที่ 16 นักเดินเรือสำรวจ (เพื่อล่าอาณานิคม) ทั้งหลายต่างได้บันทึกตีพิมพ์ของผล



ไม้จำพวกนัท (nuts = ผลไม้ประเภทที่เมล็ดมีเปลือกแข็ง และ 1 ผลมีเพียงเมล็ดเดียว) ชนิดหนึ่งที่พบลอยอยู่ในทะเล แล้วไปเกยตื้นอยู่ตามชายฝั่งแถบมหาสมุทรอินเดีย สมัยนั้นยังไม่มีผู้ใดรู้ว่าผลไม้รูปร่างประหลาดนี้คืออะไร และมาจากไหน

กันแน่ มีแต่เรื่องที่เล่าขานกันมา ดังที่ James C. McCurrach บันทึกไว้ในหนังสือ Palms of the World และศาสตราจารย์ S. Talalaj กับคณะในหนังสือ The Strangest Plants in the World มีเนื้อความเป็นทำนองเดียวกันว่า ลูกมะพร้าวทะเลเกิดจากต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่ในสวนใต้ทะเลใกล้เกาะเซวา วันดีคืนดีที่ท้องทะเลสงบ ต้นไม้นี้จะผุดขึ้นมาอยู่ที่ผิวน้ำแต่ครั้นเมื่อชาวเรือนำเรือเข้าไปใกล้มันก็จะอันตรธานหายไปใต้พื้นน้ำอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง หนังสือเรื่อง The Natural History of Palms เขียนโดยศาสตราจารย์ E. J. H. Corner ก็กล่าวถึงแหล่งกำเนิดตามความเชื่อแบบเทพนิยายว่า ผลไม้รูปร่างประหลาดนี้เกิดจากต้นสาหร่ายทะเลยักษ์ หรือไม่ก็ต้นปาล์มที่ขึ้นอยู่ในทะเล

ตำนานเรื่อง “the double coconut” เพิ่งมีการบันทึกไว้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวในเวลาถัดมา โดยเริ่มจากชาวเมืองเวนิสชื่อว่า Pigafetta เล่นเรืออ้อมแหลม Cape Horn (แหลมนี้อยู่ที่ประเทศชิลี ทวีปอเมริกาใต้) เมื่อปี ค.ศ. 1519 มาถึงประเทศมาเลเซียทางด้านทิศตะวันออก โดย I. H. Burkill ได้กล่าวถึงความตอนนีไว้ในหนังสือ A dictionary of the economic products of the Malay Peninsula Vol. II และ T.C. Whitmore ในหนังสือ Palm of Malaya ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1966 และ 1998 ตามลำดับ ว่า คนนำร่องชาวพื้นเมืองได้เล่าให้ Pigafetta ฟังว่าลูกมะพร้าวแผ่นนี้เกิดจากต้นไม้ใหญ่ชนิดหนึ่ง เรียกกันว่า kayu pauh janggi ซึ่งขึ้นอยู่ที่สระตือทะเล มีนก




ความมหัศจรรย์ของพืช

ยักษ์การูดา (Garuda) หรือพญาครุฑอาศัยอยู่และคอยเฝ้าล่าเหยื่อจำพวกวัวควาย และช้างเป็นอาหาร ชาวเรือหลายต่อหลายคนเคยตกเป็นเหยื่อของสัตว์ประหลาดตัวนี้มานานักต่อนักแล้ว นอกจากนั้นบริเวณสะดือทะเลยังมีพายุรุนแรงอยู่ตลอดเวลาหากที่ จะนำเรือเข้าไปใกล้ได้ง่าย ๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความรู้เรื่องที่มาของมะพร้าวทะเลในยุคของ Pigafetta นั้นยังคลุมเคลืออยู่เป็นอันมาก แต่จากภาษามาเลย์ “janggi” ซึ่งแปลว่า ชาวเอธิโอเปีย นั้น แสดงให้เห็นว่า คนมาเลย์ในครั้งกระนั้นจับทิศทางที่ มาของลูกมะพร้าวทะเลได้ใกล้เคียงความจริงแล้ว เพียงแต่ยังไม่ทราบ

ตำแหน่งแหล่งกำเนิดอย่างแน่ชัด เท่านั้นเอง

ไม่นานจากนั้น นักสำรวจชาวโปรตุเกสกลับเชื่อว่าต้นมะพร้าวทะเลขึ้นอยู่ที่หมู่เกาะมาลดีฟ (Maldives) ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะซีลอนหรือศรีลังกาออกไป 300 ไมล์ เพราะได้พบผลลอยน้ำมาจากทางทิศ นั้นจำนวนมากว่าที่พบตามชายฝั่งประเทศอินเดียและมาเลเซีย แม้แต่ Georg Eberhard Rumphius นักธรรมชาติวิทยาชาวเยอรมันผู้มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งก็เชื่อเช่นเดียวกัน จนได้ตั้งชื่อชนิด (species) ให้กับต้นมะพร้าวทะเลว่า *maldivica* เป็นการให้เกียรติแก่เกาะมาลดีฟโดยความ

เข้าใจผิดตั้งแต่บัดนั้นมา Rumphius ผู้นี้ พำนักอยู่ที่เกาะ Amboina ระหว่างปี ค.ศ. 1653 ถึง ค.ศ. 1702 เขาได้วาดภาพลูกมะพร้าวทะเลผ่าซีกแสดง ให้เห็นส่วนที่เป็นเนื้อภายใน พร้อมทั้งบันทึกเอาไว้ว่า “ลูกมะพร้าวทะเลนี้ เห็นถูกทิ้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่เกาะสุมาตราและเกาะเล็กเกาะน้อยแถว ๆ นั้น เนื้อของมะพร้าวทะเล (endosperm) นี้มีราคาสูงมากเพราะใช้ แก้วพิษได้ ทั้งยังเป็นยารักษาโรคอื่น ๆ ได้อีกหลายโรค” ซึ่งตรงกับที่ Garcia da Orta นักสำรวจอีกท่านหนึ่งซึ่งได้ บันทึกไว้เมื่อครั้งอาศัยอยู่ที่เกาะ Goa ในปีค.ศ. 1563 ว่า “บุคคลที่นำเชื้อ ถือหลายคนบอกผมว่า ได้พิสูจน์กัน



ภาพวาดแสดงรูปร่างของผล ภาพตัดขวางส่วนของเมล็ด และการงอกของต้นอ่อน ของมะพร้าวทะเล
(ภาพจากหนังสือ *The Natural History of Palms* เขียนโดย E.J.H. Corner)



ความก้ำกัรรณย์องพีช

แล้วพบว่ามิประโยชน์ในการแก้อาการจุลเสียด อัมพาต โรคลมบ้าหมู และโรคประสาท กับสามารถป้องกันมิให้คนป่วยติดโรคอื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนั้น ถ้าได้ดื่มน้ำที่ได้แช่เอาไว้ในกะลาที่มีเนื้อมะพร้าวติดอยู่ด้วยชั่วระยะเวลาหนึ่งจะช่วยแก้พิษต่าง ๆ ได้”

จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1742 กัปตันเรือของบริษัท French East India ชื่อ Picault ได้พบเกาะที่ชื่อว่า Mahe ในหมู่เกาะ Seychelles¹ และปี ค.ศ. 1744 พบอีก 2 เกาะในหมู่เกาะเดียวกัน ที่เขานามให้ว่า “เกาะต้นปาล์ม” ซึ่งก็คือเกาะ Praslin และเกาะ Curieuse นั้นเอง ทั้ง 2 เกาะมีปาล์ม Lodoicea ขึ้นอยู่เต็มไปหมดตั้งแต่ปลายแหลมถึงหุบเขาเลยขึ้นไปจนถึงยอดเขาสูงหลายร้อยฟุต ดังนั้นชื่อชนิดของมะพร้าวทะเล



ภาพดงต้นปาล์มมะพร้าวทะเลที่ขึ้นอยู่ในสภาพธรรมชาติบนเกาะ Praslin หนึ่งในหมู่เกาะ Seychelles (ภาพจากหนังสือ Palm of the World เขียนโดย J.C. McCurrach)

จึงถูกตั้งขึ้นเป็นชื่อพ้อง (synonym) อีกชื่อหนึ่งว่า *seychellarum* เพื่อเป็นเกียรติแก่หมู่เกาะ Seychelles ถิ่นกำเนิดอันแท้จริงของมะพร้าวทะเลด้วยประการฉะนี้

อย่างไรก็ตาม หลังจากได้มีการค้นพบแหล่งกำเนิดอันแท้จริงของมะพร้าวทะเลดังกล่าวแล้ว เรื่องราวดุจเทพนิยายก็เป็นอันจบสิ้นลง แม้กระนั้น เมล็ดพืชยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอันมีประวัติสืบย้อนไปถึงคงเป็นที่สนใจของบรรดานักพฤกษศาสตร์ทั้งหลายอยู่เป็นอันมาก พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติทั่วโลกต่างภาคภูมิใจที่จะได้มีต้นมะพร้าวทะเลเอาไว้ดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชมจนถึงทุกวันนี้ ตัวอย่างเช่นที่สวนพฤกษศาสตร์โบกอร์ (Bogor Botanical Garden) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น แต่เนื่องจากมะพร้าวทะเลที่ถูกนำมาปลูกนอกถิ่นกำเนิดจะเป็นพืชที่อ่อนแอมาก ปัจจุบันต้นอายุหลายสิบปีในสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้จึงแสดงอาการป่วยกระเสาะกระแสะจนต้องทำการประคบประหงมกันอย่างไม่ไถลชิดเป็นพิเศษกว่าต้นไม้ชนิดอื่น ๆ (ดูภาพประกอบ)

นับแต่อดีตกาล ผลของมะพร้าวทะเลจำนวนมากจะล่องลอยไปตามกระแสน้ำในมหาสมุทรอินเดีย แต่เมื่อไปเกยตื้นตามชายฝั่งทะเลอื่นๆ จะไม่มีผลใดเลยที่งอกได้ เพราะผลที่ลอยน้ำคือผลที่ฝ่อแล้ว ส่วนผลที่สมบูรณ์พร้อมงอกจะจมน้ำ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีผู้ใดพบต้นมะพร้าวทะเลขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติในสถานที่อื่น

นอกจากที่หมู่เกาะ Seychelles เท่านั้น ปาล์ม Lodoicea หรือมะพร้าวทะเลจึงเป็นไม้หายาก และพบเห็นมีปลูกกันน้อยมากแม้ในเขตร้อน เพราะนอกจากจะเพาะให้งอกได้ยากแล้วยังเป็นพืชที่ปลูกให้เจริญเติบโตได้ยากเช่นเดียวกันด้วย

0000000000



ต้นมะพร้าวทะเล (*Lodoicea maldivica* Pers.) อายุหลายสิบปี ปลูกอยู่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ โบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ภาพโดย ทักษิณ อาชาวาคม

มะพร้าวทะเลมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Lodoicea maldivica* Pers. หรือชื่อพ้อง *L. seychellarum* Labill เป็นพืชอยู่ในวงศ์ (Family) ปาล์ม คือ PALMACEAE มะพร้าวทะเลเป็นปาล์มที่มีเพศแยกกันอยู่คนละต้น (dioecious) ใบ รูปพัด (palmately leaves) ยาว 12-18 ฟุต กว้าง 6-12 ฟุต เป็นใบชนิดที่เรียกว่า costapalmate leaf หมายถึงใบรูปมือ (palmate) ที่มีก้านใบเจริญเลยเข้าไปในใบเป็นเส้นแกนใบด้วยจนถึงปลายใบ ลำต้นเรียบ ตั้งตรง โดย

¹ หมู่เกาะ Seychelles ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยจำนวน 27 เกาะ อยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเกาะมาดากัสการ์ไปทางทิศตะวันออก 600 ไมล์



ความก้าวหน้าของพืช



ทั่วไปสูงถึง 90 ฟุต (27 เมตร) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ฟุต ช่อดอก เกิดตรงชอกก้านใบล่าง ๆ ก้านช่อดอกยาว 3-6 ฟุต ขนาดเท่าแขน ผล มีขนาดใหญ่ เปลือกชั้นนอกที่หุ้มเมล็ดมีลักษณะเรียบ สีน้ำตาล ส่วนที่เป็นกะลา (shell) หนา สีเหลืองอมเขียว นั้นแท้จริงแล้วมีลักษณะแปด เพียงแต่เป็น พู (lobed) ผลของมะพร้าวทะเลนี้โดยทั่วไปมักมี 2 พู อาจพบที่มี 3 พูบ้าง แต่ที่มี 6 พูน้นน้อยมาก เนื้อใน (kernel หรือ endosperm) อ่อนนุ่ม อุดมด้วยไขมัน น้ำมัน และโปรตีน แต่เมื่อผลแก่ (ใช้เวลา 5 ปี) ส่วนที่เป็นเนื้อจะแข็ง เรียกกันว่า vegetable ivory นิยมใช้แกะสลัก และทำกระดุม

ปาล์ม *Lodoicea maldivica* หรือมะพร้าวทะเล ถือเป็นปาล์มที่มีขนาดใหญ่กว่าปาล์มทั้งหลายสามารถขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดตั้งแต่ดินทรายชายฝั่งทะเล จนถึงดิน

ตามยอดภูเขาที่แห้งแล้ง แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินตามหุบห้วยที่ประกอบด้วยหินผุและสารอินทรีย์รวมกันอยู่ อย่างไรก็ตาม ดังได้กล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่า มะพร้าวทะเลเป็นพืชที่ปลูกยากพืชหนึ่ง ปัจจัยสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตได้แก่ดินที่มีการระบายน้ำดี อากาศร้อนที่มีความชื้นเพียงพอ เริ่มที่เดียวคือการเพาะ ลูกมะพร้าวทะเลที่แก่เต็มที่ จะใช้เวลาเพาะ 6 เดือน - 1 ปี หรือนานกว่านั้นจึงจะงอก ต้นอ่อนต้องการความร้อนและความชื้นสูงมาก ๆ และรากที่เริ่มเจริญก็ต้องการพื้นที่กว้าง ๆ รวมทั้งแสงสว่างและดินที่อุดมด้วยอินทรีย์วัตถุด้วย ผู้มีประสบการณ์แนะนำให้ทำการเพาะลูกมะพร้าวทะเลตรงจุดที่ตั้งใจจะปลูกเลยทีเดียวเพราะเมื่อเมล็ดงอกจะส่งส่วนฐานของคัพภะ (radicle) และปลายรากแทงลึกลงในดินถึง 2 ฟุต แล้วงอกยาวต่อไปอีกจนเจริญ

เป็นต้นอ่อนโผล่พ้นผิวดินห่างจากลูกมะพร้าวถึง 12 ฟุต ซึ่งต้นกล้าในระยะนี้จะถูกกระแทกกระเทือนไม่ได้เลย มิเช่นนั้นต้นอ่อนจะตายได้ง่าย ๆ 9 เดือนภายหลังจากวันงอก ต้นมะพร้าวทะเลจึงจะเกิดใบแรก และใบถัด ๆ ไปก็จะเกิดขึ้นทุก ๆ 9 เดือนด้วย

ปาล์ม *Lodoicea* ออกดอกยากมาก จะไม่ออกดอกจนกว่าต้นจะมีอายุอย่างน้อย 30 ปี แต่ก็มีบางรายงานที่กล่าวว่า พบบางต้นออกดอกเมื่ออายุเพียง 13 ปี เช่นต้นที่ปลูกอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์จอร์จทาวน์ (Georgetown) เป็นต้น ส่วนต้นหนึ่งที่จาไมก้าออกดอกเมื่ออายุเกือบ 50 ปี เมื่อใบตั้งสูงจากพื้นดินถึง 20 ฟุต และยังไม่มีส่วนต้นด้วยซ้ำ จึงอาจพูดได้ว่า *Lodoicea* ต้นที่โตเต็มที่ที่มีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 100 ปี

000000000



โตไม่รู้ลัม (Prickly-leaved elephant'food) : โตไม่รู้ลัมตัวจริง ต้นจริง

เมื่อได้เล่าเรื่องมะพร้าวทะเล (Lodoicea maldivica Pers.) แกมโต ตั้งสมญาให้เสียด้วยว่า “โตไม่รู้ลัม แห่งมหาสมุทรอินเดีย” นั้น เกิดปัญหาติดตามมาว่า เรื่องราวของต้นไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษนี้คงจบลงแต่โดยดีไม่ได้เป็นแน่หากจะไม่นำเรื่องสมุนไพรโตไม่รู้ลัมตัวจริงต้นจริงมากล่าวถึงไว้ในที่นี้ด้วย

ชื่อของสมุนไพรโตไม่รู้ลัม บ่งบอกถึงความชาญฉลาดบวกอารมณ์ขันของคนโบราณที่ตั้งใจจะบอกใบ้ให้ลูกหลานไทยสามารถจดจำคุณสมบัติของต้นไม้เอาไว้ได้แม่นยำอย่างไม่มีผิดพลาด หากเป็นความสับสนแต่อย่างใดไม่ นอกจากนั้นยังจะเห็นได้ว่ามีสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ที่

มีชื่อติดอันดับ เรท เอ็กซ์ เรทอาร์ ทำนองเดียวกันและด้วยเหตุผลเดียวกันนี้อีกเป็นจำนวนมากด้วย


โตไม่รู้ลัมเป็นสมุนไพรที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนังสือ Plant Resources of South-East Asia No. 12(1) : Medicinal and Poisonous Plants 1. ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1999 ได้บันทึกสรรพคุณที่ชาวบ้านในหลาย ๆ ประเทศมีความเชื่อถือและใช้ประโยชน์เอาไว้อย่างละเอียดพอสมควร อย่างเช่นที่ มาเลเซีย ใช้ใบและรากต้มเป็นยาเจริญอาหาร ถ่ายพยาธิ แก้อาเจียน ส่วนใบ ตำทาท้องแก้ท้องอืด อื่นโดนีเซีย ใช้รากบดหรือต้มรักษาโรคมูกิตระดูขาว โรคโลหิตจาง และเป็นยาบำรุงระหว่างตั้งครรภ์ ใบใช้ถ่ายพยาธิและบำรุงกำลังทางเพศ

แก้อาเจียน แก้อาการท้องร่วง ลาว เขมร และเวียดนาม ใช้ทั้ง 5 (ต้น ใบ ดอก ผล ราก) ต้มเป็นยาเจริญอาหาร ขับเหงื่อ ขับประจำเดือน และรักษาอาการท้องอืด อินเดีย จีน แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ รากและใบต้มหรือดองแก้ท้องร่วง บิด โรคปอด โรคผิวหนัง ปัสสาวะกะปริบกะปรอย เลือดกำเดา ดีซ่าน บวมหน้า ระบายน้ำในไต และโรคหนองใน สำหรับประเทศไทย สมุนไพรโตไม่รู้ลัมใช้ทั้งต้นเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ไข้ แก้เหน็บชา บำรุงหัวใจ บำรุงกำหนด ส่วนรากใช้แก้อาการ รักษาไข้มาเลเรีย และขับพยาธิ แก้อาการท้องร่วงและบิด บำรุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับระดู

จะเห็นได้ว่า สรรพคุณของสมุนไพรโตไม่รู้ลัมหาใช่จะมีแต่เฉพาะในด้านช่วยบำรุงกำลังทางเพศเท่านั้นไม่ แต่สามารถใช้ทำเป็นยารักษาโรคได้อีกมากมายหลายโรคดัง



ความสำคัญองพืช




กล่าวแล้ว ถ้าจะว่าเฉพาะสรรพคุณช่วยรักษาโรคตายทั้งเป็นให้พลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้อีกนั้น ตำรา “ยากลางบ้าน” เล่ม 1 เรียบเรียงโดยหมอบริญญา อุทิศชลาชนนท์และคณะบอกตำรับง่าย ๆ ของคนไทยโบราณเอาไว้ว่า ใช้ต้นโตไม่รู้ล้มตำสด ๆ 1 กำมือผสมกับสุรา รับประทานวันละ 1-2 ครั้ง หรือตากแห้งตำเป็นผง

ดองสุราหรือคูลูกน้ำผึ้งปั้นลูกกลอนขนาดปลายนิ้วกลาง รับประทานวันละ 1-2 ครั้ง กับอีกตำรับหนึ่งว่าให้ใช้ บรเพ็ดพุงช้าง โตไม่รู้ล้ม และม้ากระทีบโรง ผึ่งแห้งดองสุรา รับประทาน 15-30 วันจะฟื้นคืนคง ทั้ง 2 ตำรับนี้คือภูมิปัญญาไทยที่ท่านได้บอกกล่าวเอาไว้ด้วยว่าเป็นนางเนื้อชอบกลางยา ผู้นำไปใช้อาจได้ผลมาก

น้อยไม่เท่ากัน ที่สำคัญคือต้องรู้มูลเหตุของความเจ็บป่วย (จนล้มไม่ลุก) ว่าควรเนื่องมาจากการขาดฮอร์โมน จึงจะใช้ได้ผล ส่วนมูลเหตุอื่น เช่น จากโรคพิษสุราเรื้อรัง (เมาจนหมดน้ำยา) หรือจากสิ่งแวดล้อมที่บ้านเป็นพิษนั้น ท่านว่าโตไม่รู้ล้มคงเหลือสักก็ให้คงช่วยอะไรไม่ได้



ทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลที่ได้รวบรวมแล้วนำมาเล่าสู่กันฟัง การจะตัดสินใจใช้สมุนไพรชนิดใดรักษาโรคควรเป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้นักวิชาการต่างก็กำลังพยายามทำงานวิจัยโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์จากแพทย์แผนโบราณเข้าผสมผสานเพื่อให้ได้แนวทางการใช้สมุนไพรให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสามารถใช้เป็นหลักสำหรับถือปฏิบัติได้ต่อไป

โตไม่รู้ล้มมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Elephantopus scaber* L. เป็นพืชอยู่ในวงศ์ (family) COMPOSITAE พบขึ้นอยู่ทั่วไปในทวีปอเมริกาเขตร้อน





ความท้าทายของพืช




น้ำเงินอ่อนหรือม่วง บางครั้งสีขาว ผล
ยาวประมาณ 4 มม. มีกลีบเลี้ยง (ca-
lyx) รูปเข็มหุ้มอยู่ยาว 4-6 มม. ได้
ไม่รู้ลืมพบขึ้นตาม ทุ่งหญ้าที่
เสื่อมโทรม ข้างถนน ทุ่งนา หรือชาย
ป่า ที่สูงตั้งแต่จากระดับน้ำทะเลจนถึง
1,500 เมตร

แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไม้พุ่มสูงถึง 80 ซม. ลำ
ต้น แข็ง ใบ สาก เรียงตัวซ้อนขึ้นมา
เป็นวงกลม (radical rosette) รูปไข่
ยาว ขนาด 5-38 ซม. X 1-6 ซม. ก้าน
ข้อดอก ยาว ดอก ประกอบด้วยกลีบ
ดอก (corolla) ยาว 7-9 มม. สี



บรรณานุกรม

- บุญรัตน์กรกิจ, ลัดดาวัลย์ และสุภาวิตา, ถนอมจิต. 2522. ชื่อพืชสมุนไพรและประโยชน์. 109 หน้า.
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน. 2523. สวนป่าสมุนไพร. แผ่นพับจัดทำโดยสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา. 8 หน้า.
- อุทิศชลาหนท์, ปริญญา. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. ยากกลางบ้าน เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2. แพทย์แผนโบราณ ทำพระจันทร์. 48 หน้า.
- Bailey, L. H. 1963. The Standard Cyclopedia of Horticulture Vol. II. New York, The MacMillan Company, pp. 1201-2421.
- Burkill, I. H. 1966. A dictionary of the economic products of the Malay Peninsula Vol. II. Kuala Lumpur, Malaysia, Publish on behalf of the Governments of Malaysia and Singapore by the Ministry of Agriculture and Co-operatives. pp.1241-2444.
- Corner, E. J. H. 1966. The Natural History of Palms. London W1, Weidenfeld and Nicolson, 20 New Bond Street. 393 pp.
- de Padua, L. S., Bunyapraphastara, N. and Lemmens, R. H. M. J. (editors). 1999. Plant Resources of South-East Asia No. 12 (1). Medicinal and poisonous plants 1. Backhuys Publishers, Leiden, the Netherlands. 711 pp.
- Jones, D. L. 1989. Palms in Australia, Reed Books Pty Ltd. NSW 2086, 2 Aquatic Drive, Frenchs Forest. 279 pp.
- Krempin, J. 1993. Palms & Cycads Around the World. Queensland, Herron Book Distributors Pty Ltd. Australia. 276 pp.
- McCurach, J. C. 1960. Palms of the World. New York, Harper & Brothers. 290 pp.
- Menninger, E. A. 1967. Fantastic Trees. New York, The Viking Press. 304 pp.
- Menninger, E. A. 1977. Edible Nuts of the World. Horticultural Books, Inc. P.O. Box 107, Stuart, Fl. 33494. 175 pp.
- Talalaj, S., Talalaj, D. and Talalaj, J. 1991. The Strangest Plants in the World. Melbourne, Hill of Content, Australia. 166 pp.
- The Wealth of India. 1962. A Dictionary of Indian Raw Materials and Industrial Products. Raw Materials Vol. VI: L-M. Council of Scientific & Industrial Research: New Delhi. 483 pp.
- Whitemore, T. C. 1998. Palms of Malaya. Bangkok, White Lotus Co.Ltd. Thailand 136 pp.



นี่ยังไง
เครื่องหมาย
ของความอร่อย



ถ้ามีริบไบกิน
หน้อย อร่อย
บอกกันด้วยนะ

ถ้วยเดียวลูกชิ้นหมูพริกกะเทียม
เจ้าคำหรับสูกยอกของความอร่อย
มาตรฐานที่เป็นสูตรเฉพาะตัว
อย่าลืมนะคะแะอุกทมนุสขาใกล้บ้านท่าน




ใส่ใจคุณภาพเพื่อผู้บริโภค
ถ้าพิสุจน์ลูกชิ้นหมูพริกกะเทียม

40/14 ซ.วัดเตา16งศิณ ถนนตติงชัน-ตุพรรณบุรี อ.บางไทรจ๋ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 926-6509, 926-7928 แฟกซ์. 926-6508

ECONEER PROCESSOR

DIGITAL DATA PRINT PROCESSOR เชื่อมต่อระบบของท่าน
ระหว่าง PROCESS INDICATOR และ COMPUTER ให้สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้นด้วย ECONEER PROCESSOR



- จัดเก็บข้อมูลจาก PROCESS INDICATOR ให้อยู่ในรูปแบบ DIGITAL
- ต่อออก PRINTER ได้โดยตรงจากเครื่อง
- ส่งผ่านข้อมูลสู่ PC ได้โดยผ่าน Rs-232 หรือ Rs-485
- เก็บข้อมูลได้ถึง 32 KB ขยายได้สูงสุด 56 KB
- บันทึกข้อมูลได้แม้ถูกตัดไฟเลี้ยงระบบ

LEVtech. LEVEL INSTRUMENTATION



เครื่องวัดระดับในถังไซโล ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการทางงานอุตสาหกรรมได้กว้างขวาง
ใช้ได้ทั้งของเหลว, ซีเมนต์, ผงแป้ง, หรือสารเคมี
พร้อมทั้ง LEVEL INDICATOR ที่อ่านตั้งค่าง่ายดาย

ENCLOSURE : CAST ALLMINIUM

TEMP. LIMITS : 40 °C

MAX. RANGE : 20.0 m

MEASURING CABLE NYLON

OUT PUT PULSE 4-20 mA


POWER SUPPLY : 24 VDC

PRESSURE : ATM.

MOUNTING : 3" NPT FEMALE THREADS

RESOLUTION : 12 bit D/A

LINEARITY : 0.1% OF FULL SCALE




GENIX INDICATOR

DIGITAL WEIGHT INDICATOR FOR THE 21st CENTURY

- CALIBRATION METHOD : FULL DIGITAL CALIBRATION
- DISPLAY TYPE : 7 SEGMENT, 8 DIGITS, 14 mm
- RESOLUTION : 40,000 DIVISION
- PROTECTION : OVER VOLTAGE PROTECTION
- POWER SUPPLY : 220 VAC
- OUTPUT : RELAY, 0-10 V, 4-20 MA
- INTERFACE : PRINTER, RS-232, RS-485



ขายปลีก-ส่ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด



✦ HARDDISKS

✦ MONITORS HANSOL, SOCOS, ADI

✦ CD-ROM DRIVES

✦ MAIN BOARD


✦ CPU PENTIUM, CELERON, AMD

✦ PRINTERS DOT, INKJET, LASER JET

✦ SCANNERS

✦ UPS, MODEMS

WE SERVED YOU THE BEST SOLUTION



ROMBIX CO., LTD. บริษัท รอมบิกซ์ จำกัด

29/168 ม.เอกอินทรา ซ.รามอินทรา 14 ถ.รามอินทรา จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 943-6502, 943-6851, 948-5120 FAX : 943-6502 E-mail : ccpc

ขอสนับสนุน
วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยความปรารถนาดี
จาก

บริการ ออกแบบ ติดตั้ง

กันสาด ผ้าใบ ผ้าม่าน มู่ลี่ โครงหลังคา
กระเบื้อง ประตุม้วน ประตูยัด เหล็กดัด
มุงลวด งานเหล็กทุกชนิด
เดินท่อเข้า รับซ่อมประตุม้วน


PATANAKARN DE SIGN

พัฒนาการดีไซน์


9/15-16 ถ. สุขุมวิท ก.ม. 29 ต. ท้ายบ้าน อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
TEL. (02) 387-2171, (02) 387-0410, (01) 996-3215



กันสาด



ผ้าม่าน



ประตุม้วน

ด้วยความปรารถนาดี จาก

บริษัท ม.ต.ร.อุตสาหกรรมไม้ จำกัด

M.T.R.WOOD INDUSTRIES CO.,LTD

Ins. 510-1991, 510-9927, 945-2852

“ บริการ อนไม้-สไม้แปรรูปทุกชนิด ”

ในเครือ บริษัท มิตรมุขตารี จำกัด

ที่ตั้งโรงงาน 118/2 หมู่ 5 ซอยวัดคูบอน
แขวงคันนายาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทร. 5109927 โทรสาร 5101994

ด้วยความปรารถนาดี

จาก



บริษัท เอสพี ปีโตรเลียม จำกัด

36/85 พี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 24

ช.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 664-2615-21 โทรสาร. 664-2622

มือถือ. 01-8192575

เพื่อการวิจัย และพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์

ขอสนับสนุน

วารสาร "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ด้วยความปรารถนาดี

จาก

ราชากระดาศ

อภิสิทธิ์ สุทธิพรเมธา

และครอบครัว

33/39-43 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร 10150

โทร. 4163854

โรงพยาบาลธนบุรี ก้าวสู่สหัสวรรษ 2000 ให้บริการรักษาพยาบาล เพื่อคนไทยทั่วประเทศ



.....

**โรงพยาบาลธนบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
อย่างต่อเนื่องและมั่นคงมากกว่า 23 ปี โดยมีเครือข่ายทั้งสิ้น 31 แห่ง ในกรุงเทพฯ
3 แห่ง คือ โรงพยาบาลธนบุรี 1 โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลปิยะเวท
และโรงพยาบาลในต่างจังหวัดอีก 28 แห่ง นอกจากนี้ยังขยายการให้บริการอีกหลายๆ ด้าน ดังนี้**

.....



โครงการใหม่ล่าสุดของบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี
Health Gate Clinic โครงการใหม่ล่าสุด ที่ให้
บริการด้านสุขภาพในรูปแบบคลินิกทันสมัยใกล้ๆ
คุณ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และให้ข้อมูล
คำปรึกษาด้านสุขภาพ เพื่อความสะดวก
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาล



เอเพ็กซ์ เฮลท์ แอนด์ อีกรีกส์ ให้บริการด้านประกันสุขภาพมานานกว่า 20 ปี
<http://www.apexhi@bkkloinfo.co.th>
ด้วยกรรมวิธีหลายรูปแบบ ครอบคลุมการให้บริการลูกค้า
ทุกประเภท โดยให้บริการด้านคำปรึกษาสายด่วน ฮอตไลน์
แก่สมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง "เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ
ครบครันเรื่องบริการ ชำนาญด้านสุขภาพ"



โรงพยาบาลปิยะเวท พร้อมเข้าสู่สหัสวรรษใหม่
<http://www.piyavate.com>

ภายใต้การดำเนินงานของทีมบริหารในเครือ
โรงพยาบาลธนบุรี ให้บริการผู้ป่วยทั้งใน และ
ต่างประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ จนเป็นที่
ยอมรับในคุณภาพเป็นอย่างสูง ทางด้านบุคลากร
การแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือการแพทย์
อันทันสมัย นอกจากนี้ยังมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยวัยทอง
เปิดบริการดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด



เอเพ็กซ์ เฮลท์ แอนด์ อีกรีกส์ ดำเนินการค้าขายและ
ผลิตสินค้าทางการแพทย์

ที่มีมาตรฐาน ในราคาไม่แพง ให้บริการผ่านร้านขายยา APEX
ที่มีสาขาในกรุงเทพฯ 25 สาขา ต่างจังหวัด 10 สาขา
และจะขยายเพิ่มอีก 30 สาขาในเร็ววันนี้



โลจิกอล อินฟอร์เมชั่น เนทเวิร์ก -LINK เน็ตเวิร์ก
โรงพยาบาลธนบุรี ให้บริการเรื่องนโยบายข้อมูลหรือข้อมูล
<http://www.logical.co.th>

เพื่อวางระบบในการบริหารโรงพยาบาล และให้บริการ
เข้าซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาแพง พร้อมรับบริหาร
โรงพยาบาลทั้งในและนอกประเทศ



บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) TEL : 412-0020 FAX : 412-9579
THE THONBURI HOSPITAL PUBLIC CO.,LTD. <http://www.thonburi-hosp.com>

SOSUCO

FLOOR & WALL TILE



The Tiles shown in the photo features
 Yanathip - Pink 8" Kanimanee - Dark blue, Sky blue Pindawan - Pink 8x10"
 Petchkumron - Blue Petchsingkorn - Sky blue, Saisayam - Green, Gold Nurnsaran - Beige 12"
 Palamo - Pink 18"



SOSUCO CERAMIC CO., LTD. THE SOSUCO GROUP INDUSTRIES CO., LTD.
 Head Office/Marketing And Sales Office 2/1 Phibulbongkram RD, Bangsue BANGKOK 10800

TEL. (662) 913-2440 FAX. (662) 587-5559




ถังเก็บ-หมักเบียร์



ห้องเย็น




โรงงานพาสเจอร์ไรส์




โรงงานแช่แข็ง



“คุณภาพพร้อมบริการ”



ตู้ฟรีสเร็ว (I.Q.F.)



เครื่องทำน้ำแข็งหลอด



แผ่นทำน้ำเย็น

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ปี 2542
ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง (Design)




ผลิต รับสร้าง และจำหน่าย

เครื่องทำน้ำแข็งหลอด, โรงน้ำแข็ง, ห้องเย็นขนาดเล็กและใหญ่
โรงงานนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มและโรงงานเบียร์
โรงงานผลิตอาหารต่าง ๆ, ตั้งสถานีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
และเคมีภัณฑ์, ปิบบดเดนเลส, วาล์ว, ก่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ

บริษัท พัฒนากล จำกัด (มหาชน)

20/14-15 หมู่ 10 สุขุมวิท 103 (ตรงข้ามสวนหลวง ร.9)
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 328-1032-49, 726-2716
โทรสาร : 328-1245, 328-1058
URL : <http://www.patkol.com>
E-mail : sales@patkol.com



Thainox

ผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



ทรงคุณค่าด้วยความล้ำสมัย แข็งแกร่งและเงางาม ผลิตภัณฑ์จากแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่เปี่ยมด้วยประโยชน์ใช้สอย ให้ชีวิตอีกระดับสำหรับคุณ
วันนี้ ไทยน็อกซ์คือผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่โรงงานไทยน็อกซ์ในระยองอินดัสเทรียลพาร์ค เราผลิตแผ่น
เหล็กกล้าไร้สนิมคุณภาพสูง ทั้งชนิดแผ่นและม้วน ในความหนาและความกว้างหลากหลายระดับ เพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เครื่องใช้ในครัว
เรือน การก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร ท่อต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ที่มีความทนทานสูง เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องจักรในโรงงาน อุตสาหกรรมคอน-
เทนเนอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานโลก เราผลิตแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมคุณภาพสูง ที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างไม่มีขีดจำกัดสำหรับโลกสมัยใหม่

บริษัท ไทยน็อกซ์ สตีล จำกัด


สำนักงานใหญ่ : ชั้น 23 ซิทีโอ ทาวเวอร์ 191 ถนนเฉลิมพลดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10110 โทร 261 5323-30 โทรสาร 261 1057

โรงงาน : 324 หมู่ 8 ถนนท่า-ปลวกแดง ต.มาบข่า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21180 โทร (038) 636 125-141 โทรสาร (038) 636 099


สถานการณ์การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าในประเทศไทย

พรทิพย์ อังคปรีชาเศรษฐ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900



ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งมีพื้นที่ของประเทศที่ประกอบด้วยสภาพนิเวศธรรมชาติหลากหลายชนิด นับตั้งแต่ป่าสนเขา ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบแล้ง ป่าผลัดใบ ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน ป่าชายหาด รวมทั้งหาดทราย หาดเลน และแนวปะการัง เป็นต้น ด้วยสภาพนิเวศที่หลากหลายเหล่านี้ ประเทศไทยจึงเป็นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ที่ชุกชุมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก



นอกจากนั้นประเทศไทยยังเป็นจุดบรรจบของชนิดพืชและสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากพื้นที่ในหลายบริเวณโดยรอบของประเทศ เช่น ชนิดที่มาจาก อินโดจีน อินเดีย พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย จึงทำให้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทยมีสูงมาก ในปัจจุบันเท่าที่สำรวจแล้ว พบว่ามีจำนวนของพืชและสัตว์โดยประมาณดังต่อไปนี้ มีพืชชั้นสูงจำนวน 20,000 - 25,000 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน 285 ชนิด นกจำนวน 950 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานจำนวน 313 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 107 ชนิด ปลาจำนวน 1,500 ชนิด และมีสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ รวมกันประมาณ 11,900 ชนิด

ทั้งพืชและสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ธรรมชาติได้เอื้อให้กับมนุษย์นำมาใช้สอย เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้โดยปกติสุข ตามปกติแล้วการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตย่อมเกิดขึ้นตาม

วัฏจักรของธรรมชาติและมียุ่ตลอดเวลา ในอดีตการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ใช้เพื่อการยังชีพเป็นหลัก ทำให้ธรรมชาติที่สูญเสียไปสามารถฟื้นฟูตัวเองกลับสู่สภาพเดิมได้ การสูญพันธุ์จึงมีน้อย แต่ทว่าปัจจุบันการสูญเสียชนิดพันธุ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนใหญ่จะเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งกบฏไทยผลประโยชน์จากธรรมชาติกันอย่างมากมาย มหาศาล จนธรรมชาติไม่สามารถปรับตัวได้ทัน และเสื่อมสิ้นสภาพไปในที่สุด และนี่คือสาเหตุหลักในการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า ซึ่งประกอบด้วย

1. การรบกวนและการทำลายแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่า เช่น การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาใช้สอยและเพื่อการค้า การทำไร่เลื่อนลอย การพัฒนาเพื่อเป็นพื้นที่ทำกินที่อยู่อาศัย สร้างเขื่อนสร้างถนน ประกอบกับมีการขนส่งที่สะดวก เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น จึงทำให้เกิด

การสูญเสียพื้นที่ป่าจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก

2. การล่าสัตว์เพื่อยังชีพ และเพื่อการค้า ถึงแม้ว่าการล่าสัตว์แบบยังชีพภายในหมู่บ้านจะมีอันตรายต่อสัตว์น้อยกว่าเพื่อการค้าก็ตาม แต่ก็ยากต่อการควบคุม จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์เฉพาะถิ่นหลายชนิดสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ ปัจจุบันก็ยังมีพบอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ป่า ส่วนการล่าเพื่อการค้านั้น มีผลต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนาของพราน และเครื่องมือล่าสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ นั้น จะช่วยให้ล่าสัตว์ได้ครั้งละมากๆ


3. การเป็นพิษของสิ่งแวดลอม เช่น น้ำเสีย อากาศเสีย และสารเคมีเป็นพิษ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีแหล่งกำเนิดมาจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการทำการเกษตร สารพิษเหล่านี้หากมีปริมาณสูง จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ ทำให้มีการเติบโตช้า อัตราการขยายพันธุ์ลดลง ตาย หรือสูญพันธุ์ในที่สุด

4. สาเหตุการสูญพันธุ์อีกสาเหตุหนึ่งนั้น มักจะเกิดมาจากตัวของสัตว์เอง

4.1 ประชากรของสัตว์ชนิดนั้นมีเหลืออยู่ในธรรมชาติอยู่น้อยมาก อีกทั้งยังมีแหล่งอาศัย กระจัดกระจาย โอกาสในการจับคู่ผสมพันธุ์และขยายพันธุ์จึงมีน้อย

4.2 เมื่อสิ่งแวดล้อมเดิมถูกทำลายไป สัตว์บางชนิดไม่สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้

การป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั้น สิ่งจำเป็นที่จะต้อง



รู้เป็นอันดับแรกก็คือ สถานภาพปัจจุบันพร้อมทั้งชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ปัจจุบันมีเอกสารอ้างอิงที่พอจะตรวจสอบได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นคือ IUCN Red Data Book แต่ก็เป็เอกสารที่เก่าแก่มากแล้ว ไม่ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2539 ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลูมมาตย์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับสถานภาพของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย เพื่อให้ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าชนิดพันธุ์ใดอยู่ในสถานภาพไหน เช่น สูญพันธุ์ไปจากประเทศแล้ว (extinct) หายาก (rare) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) หรืออยู่ในภาวะถูกคุกคาม (threatened) การประชุมครั้งนี้ได้เน้นเฉพาะสัตว์ 5 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammals) นก (birds) สัตว์เลื้อยคลาน (reptiles) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (amphibians) และปลา (fishes) โดยเป็นการหารือกันเพื่อจะหาจุดร่วมระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ



ผลประชุมสรุปได้ว่า มีสัตว์ป่าในประเทศไทยหลายชนิด ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่น้ำวิกฤตเป็นอย่างยิ่ง โดยมีสัตว์ชนิดที่ถูกจัดอยู่ในสถานะที่

มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์รวมทั้งสิ้น 720 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์เสี่ยงลูกด้วยนม 120 ชนิด นก 255 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 70 ชนิด สัตว์สะเทิน

น้ำสะเทินบก 35 ชนิด และปลาอีก 240 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 23 ของชนิดสัตว์ทั้ง 5 กลุ่ม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (รายละเอียดในตารางที่ 1 และตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 จำนวนชนิดของสัตว์แต่ละกลุ่มที่มีสถานภาพที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ประเภทของสัตว์	จำนวนชนิด							
	สูญพันธุ์แล้ว	ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	ใกล้สูญพันธุ์	มีแนวโน้มสูญพันธุ์	ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น	ข้อมูลไม่เพียงพอ	ใกล้ถูกคุกคาม	รวม
สัตว์เสี่ยงลูกด้วยนม	4	13	35	62	6	-	-	120
นก	5	38	69	82	-	2	59	255
สัตว์เลื้อยคลาน	1	7	5	28	29	-	-	70
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก	-	-	-	26	7	-	-	35
ปลา	3	-	29	155	16	33	4	240
รวมทั้งสิ้น								720

ตารางที่ 2 ชนิดสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้ว

ประเภทของสัตว์	สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้ว	จำนวนชนิด	สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ*	จำนวนชนิด	รวม
สัตว์เสี่ยงลูกด้วยนม	สมัน** (<i>Cervus schomburgki</i>)	1	แรด (<i>Rhinoceros sondaicus</i>) ละมั่ง (<i>Cervus eldi</i>) กูปรี (<i>Bos sauveli</i>)	3	4
นก	นกช้อนหอยใหญ่ (<i>Pseudibis gigantea</i>) นกพงหญ้า (<i>Graminicola bengalensis</i>)	2	นกกระสาปากเหลือง (<i>Mycteria cinerea</i>) นกช้อนหอยดำ (<i>Pseudibis davisoni</i>) นกกระเรียน (<i>Grus antigone</i>)	3	5
สัตว์เลื้อยคลาน	จระเข้ปากกระทุงเหว (<i>Tomistoma schlegeli</i>)	1	-	-	1
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก	ยังไม่มีรายชื่อ	-	ยังไม่มีรายชื่อ	-	-
ปลา	ปลาหางเหี้ยยว, ปลาหางไหม้ (<i>Balantiocheilus melanopterus</i>) ปลาเลื้อยตอ (<i>Coius microlepis</i>) ปลาสาวยู, ปลาหัวเกศ, ปลาเกด (<i>Platytrapius siamensis</i>)	3	-	-	3

หมายเหตุ : * สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ หมายถึง ยังมีเหลืออยู่ในสถานที่เพาะเลี้ยง

** สมัน สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยและจากโลกแล้ว

จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ทำให้เห็นได้ว่าสถานการณ์ของสัตว์ป่าของไทย ตกอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงถึง 720 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 23 ของชนิดสัตว์ป่าที่มีอยู่ทั้งหมด โดยมีมนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้ มนุษย์กลุ่มหนึ่งทำไปเพราะขาดความรู้ เพราะความยากจน และเพราะขาดโอกาสที่ดีในการดำรงชีวิต ทำไปเพื่อความมีชีวิตอยู่รอดของตนเองและครอบครัว แต่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ มีเงิน มีอิทธิพล มีอำนาจหน้าที่การงานและเป็นกลุ่มที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปต่างๆ ที่รู้ถึงผลเสียหายและความหายนะที่จะติดตามมา แต่ไม่ได้คำนึงถึง เพราะนึกถึงประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก กลุ่มคนประเภทหลังนี้จึงเป็นกลุ่มคนที่เป็นอันตรายต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

แม้ว่าปัจจุบัน จะมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มชนหลายกลุ่ม ได้พยายามวางกฎระเบียบข้อบังคับ บทลงโทษ และช่วยกันดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ตาม แต่ก็ยังบังเกิดผลน้อยมาก เนื่องจากยังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้ง ถึงผลประโยชน์ที่จะได้จากธรรมชาติและผลกระทบที่จะติดตามมา เมื่อความหลากหลายของธรรมชาติได้ถูกทำลายจนไม่เพียงพอ




ต่อการดำรงชีวิต อีกทั้งยังไม่ได้มีจิตสำนึกและมีความรักธรรมชาติอย่างจริงจัง มีความปรารถนาที่จะช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไป และหากสังคมไทยยังขาดจิตสำนึกในเรื่องเหล่านี้แล้ว เป็นที่แน่นอนว่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในประเทศก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ ไปไม่มีที่สิ้นสุด

ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกให้มีความรัก ห่วงแหน และห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ทุกๆ คนในสังคมควรจะต้องร่วมมือช่วยกันกระตุ้นให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะบุคคลรอบข้างได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยเน้นที่เยาวชนของชาติ ซึ่งจะเติบโตมาเป็นกำลังของประเทศชาติในอนาคต


ในบรรดาสื่อทางด้านสิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยาที่ออกมาให้เห็นเกือบทุกสื่อ ทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปสารคดี หรือการ

สนทนาทางวิชาการ ซึ่งดูจะเป็นเรื่องหนัก ไม่เป็นที่สนใจของคนทั่วไป เนื่องจากไม่มีจุดเร้าใจที่จะช่วยให้ผู้ใช้สื่ออยากจะมีส่วนร่วมด้วย และที่สำคัญที่สุดคือ บทความ และบทสนทนา ที่นำเสนอ นั้นค่อนข้างยากที่ชาวบ้านธรรมดาทั่วๆ ไป จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง จึงทำให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจที่จะติดตาม ถึงเวลาแล้วที่สื่อควรจะปรับบทบาทและการนำเสนอให้ออกมาในรูปแบบใหม่ๆ ให้สังคมได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยบ้าง เช่น นำเสนอเป็นเรื่องสั้นๆ น่าสนใจ ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย การเล่นเกมส์ การทายปัญหา การจัดกิจกรรมต่างๆ และการนำเสนอโดยผ่านดารา นักร้อง นักแสดง คณะตลกที่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน และที่สำคัญที่สุด คือ กระบวนการศึกษาธิการ ควรจะบรรจุไว้ในบทเรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติและปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง



บรรณานุกรม


- สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. 2539. รายงานการประชุมจัด
สถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย. บริษัทอินทิเกรตเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จำกัด. 52 หน้า.
- สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. 2539. ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศไทย (Thailand's Biodiversity). บริษัทอินทิเกรตเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จำกัด 39 หน้า.





มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ขอสนับสนุนผลงานและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของคนไทย
ด้วยถินันทนการจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเปิดสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนี้




ระดับปริญญาตรี

- ✧ คณะพยาบาลศาสตร์
- ✧ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
 - วิทยาการโทรคมนาคม
 - เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์
 - สถิติประยุกต์
- ✧ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 - วิศวกรรมไฟฟ้า
 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 - วิศวกรรมโทรคมนาคม
- ✧ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
 - เทคโนโลยีการอาหาร
 - อุตสาหกรรมเกษตร


ระดับปริญญาโท

- ✧ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- ✧ สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์
และวิศวกรรม
- ✧ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ✧ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์
- ✧ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ✧ สาขาวิชาระบบสื่อสารแถบความถี่กว้าง
- ✧ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
- ✧ สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม
- ✧ สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม
- ✧ สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา



ระดับปริญญาเอก

- ✧ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- ✧ สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์
และวิศวกรรม



มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ห้วยหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 3004543, 3004553 โทรสาร. 3004563

<http://www.au.ac.th>

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

โดยการนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ

ทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล และ นฤมล รื่นไวย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คำนำ

การแข่งขันสินค้าเกษตรในทศวรรษหน้าจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อกฎเกณฑ์ขององค์การค้าโลก (WTO) ถูกใช้เต็มรูปแบบ ความอนุเคราะห์เชิงภาษี (GSP) จะค่อย ๆ หดหายไป การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อกีดกันการค้าจะไม่สามารถทำได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรทั้งผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น ข้าว ถั่วเหลือง ปาล์มน้ำมัน ถั่วลิสง สับปะรด กาแฟ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่จะประสบปัญหาการแข่งขัน และอาจสูญเสียตลาดทั้งในและต่างประเทศ แม้ว่าการกีดกันการค้าทางด้านภาษีจะถูกยกเลิกตามกฎเกณฑ์ขององค์การค้าโลก (NBT: none barrier tariff) แต่ก็ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่จะออกมาบังคับ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องน่าวิตกสำหรับประเทศไทย รวมทั้งประเทศที่กำลังพัฒนา ยกตัวอย่าง เช่น มาตรการทำลายสิ่งแวดล้อม มาตรการคุณภาพและมาตรฐานสินค้า มาตรการแรงงาน มาตรการสุขอนามัยของสัตว์ ฯลฯ มาตรการเหล่านี้เอื้ออำนวยให้ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีความพร้อม ในขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนายังขาดความพร้อมในเรื่องดังกล่าวทุกด้าน จึงอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการต่อสู้และปกป้องสินค้าเกษตรในตลาดโลก

1. สถานะการเกษตรของประเทศไทย

ตารางที่ 1. แสดงถึงสถานะการผลิตการเกษตรของประเทศไทย

ปี พ.ศ. เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา	มูลค่าผลิตผลการเกษตร (ล้านบาท)	มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)	สัดส่วนต่อมูลค่าการส่งออก (ร้อยละ)
สิ้นปีที่ 2 ของแผน 3	78,762	23,088	74.1
สิ้นปี แผน 3	111,325	45,706	75.93
สิ้นปี แผน 4	191,264	100,271	67.31
สิ้นปี แผน 5	200,361	133,330	57.13
สิ้นปี แผน 6	332,488	256,036	25.43
สิ้นปี แผน 7	552,750	484,847	26.93

จากตัวเลขดังแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ามูลค่าผลิตผลการเกษตร และมูลค่าการส่งออกของประเทศในปี พ.ศ. 2516 ซึ่งสิ้นปีที่ 2 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 3 ปรากฏว่าประเทศไทยมีมูลค่าผลิตผลการเกษตร 78,762 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นมูลค่าส่งออก 23,088 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการส่งออกร้อยละ 74% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด ตัวเลขผลิต

ผลการเกษตรได้เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 3, 4, 5, 6 และ 7 เป็น 111,325, 191,264, 200,361, 332,488 และ 552,750 ล้านบาท ตามลำดับ จากตัวเลขมูลค่าผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนการส่งออกของผลิตภัณฑ์เกษตรเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกทั้งหมดแล้วกลับปรากฏว่าคิด

เป็นสัดส่วนที่ลดลง กล่าวคือมูลค่าสินค้าออกของเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละของมูลค่าส่งออกทั้งหมด เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 3 เท่ากับ 75.93 และเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 4, 5, 6 และ 7 ปรากฏว่าเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.31, 57.13, 35.40 และ 26.93 ตามลำดับ การที่มูลค่าสัดส่วนการส่งออกทางเกษตรกรรม

และผลิตภัณฑ์ลดลงตามลำดับนั้น เนื่องจากประเทศไทยได้พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้สัดส่วนการส่งออกของเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกลดลง

แม้สัดส่วนการส่งออกของเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์ส่งออกทั้งหมดจะลดลงก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าไม่ว่าจะทางด้านการผลิตของประเทศ หรือส่งออก จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งให้เห็นว่าภาคเกษตรยังคงเป็นรายได้หลักที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจรวมของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรจึงทวีความสำคัญโดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

2. ประเด็นเกี่ยวกับพันธกรณี

ก่อนการค้าเสรีโลก

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ได้พัฒนาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า หรือ GATT (General Agreement on Tariff and Trade) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม 81 ประเทศ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกแรกเริ่ม (ลำดับที่ 59 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537) ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการผูกพันกับพันธกรณีขององค์การการค้าโลก

แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกในหลายๆ กรณี เช่น การเปิดตลาดการค้าสินค้า ทั้งจากการลดภาษีศุลกากรของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย การเปิดเสรีตลาดการค้าและบริการระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎระเบียบ



การค้าที่ได้รับการปรับปรุงให้ชัดเจน รวมทั้งการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศเล็ก ๆ ที่ขาดอำนาจในการต่อรอง โดยเฉพาะกับคู่ค้าที่เป็นประเทศใหญ่ ซึ่งในอดีตมักจะใช้อำนาจทางเศรษฐกิจบีบบังคับประเทศเล็กอย่างไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตามในฐานะสมาชิกประเทศไทยย่อมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมทั้งปรับตัวเพื่อสู้กับการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงข้อตกลงที่สำคัญภายใต้องค์การการค้าโลก ซึ่งได้เริ่มใช้บังคับให้สมาชิกปฏิบัติตาม

การตกลงที่สำคัญภายใต้องค์การการค้าโลก

การตกลงที่สำคัญภายใต้องค์การการค้าโลกสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

(1) การเปิดตลาด ภายใต้ข้อตกลงทุกประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องลดภาษีศุลกากร ทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร สำหรับสินค้าเกษตรนั้นทุกประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้า และต้องลดภาษีลงเฉลี่ย

ร้อยละ 36 และ 24 โดยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15 และ 10 ในแต่ละรายการสินค้าภายใน 5 และ 10 ปี สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาตามลำดับ

(2) กฎระเบียบการค้า ได้มีการปรับกฎระเบียบการค้า ระเบียบที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยตรง คือ ข้อตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวได้อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถกำหนดระดับความปลอดภัย และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้านำเข้า (แต่จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ) จากที่ตกลงดังกล่าวจะเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรจึงนับวันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อการแข่งขันทวีความรุนแรง หากไม่มีการพัฒนาคุณภาพในเรื่องดังกล่าวก็จะเป็นช่องว่างให้ประเทศสมาชิกคู่ค้าใช้เป็นสิ่งกีดกั้นการนำเข้า นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านการทุ่มตลาด การตอบโต้การอุดหนุน

(3) ข้อตกลงในเรื่องที่ยังไม่มีกฎหมายหรือมีก็น้อยมากของ GATT กำกับมาก่อน เรื่องดังกล่าวได้แก่ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า การค้าบริการและมาตรการลง

ทุนที่เกี่ยวกับการค้า ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานั้น ได้กำหนดขอบเขตและมาตรฐานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาวิจัยวิธีการรวมทั้งผลิตสินค้าตัวใหม่ที่จะลดการใช้สารเคมีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จะเห็นว่าได้มีหลาย ๆ ประเทศพยายามปรับปรุงพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านพันธุวิศวกรรม เช่น สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการติดต่อพันธุกรรมหรือ genetically modified organisms (GMOs) และจัดเป็นสิทธิบัตรอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์จาก GMOs ในปัจจุบันกำลังได้รับการต่อต้านจากประเทศในทวีปยุโรปซึ่งมีความกลัวต่อเรื่องดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะมีการต่อต้านในเรื่องดังกล่าว และประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ประกาศข้อบังคับห้ามนำพันธุ์พืชที่ติดต่อทางพันธุกรรมเข้ามาปลูกเป็นการค้า รวมทั้งความไม่พร้อมของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว แต่ประเทศไทยก็ยังมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกรรม

เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีการปกติ (conventional breeding) การลดการใช้สารเคมีโดยกรรมวิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องเกษตรอินทรีย์ (organic farming) และการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี (biocontrol) รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวตลอดจนการบรรจุภัณฑ์และขนส่ง ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

3. นโยบายของรัฐในการพัฒนา

คุณภาพผลผลิตเกษตร


นับแต่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้มีนโยบายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยคำนึงถึงการเกษตรมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการเกษตรอื่น ๆ

นโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้จึงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการเร่งรัดพัฒนาการผลิต ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ทั้งนี้โดยพิจารณาจากตัวแปรต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อาทิเช่น การชลประทาน การจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการเกษตร ได้แก่ แหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ รวมทั้งการปรับปรุงคันคว่ำการวิจัยทางการเกษตรให้ทันสมัยและก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงสมรรถภาพในการผลิตและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการผลิต และปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ผลผลิตได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามการพัฒนาทางการเกษตรในระยะแรก ๆ นั้น กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ยังไม่ได้นำผลประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณามากนัก ทั้งนี้เป็นไปตามทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ถูกกำหนดภายใต้เงื่อนไขของตลาดโลก และจุดมุ่งหมายการพัฒนาประเทศที่ตั้งไว้บนความมั่งคั่ง และการเพิ่มพูนรายได้ประชาชาติเป็นสำคัญ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรในบางด้าน จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น การปรับปรุงปริมาณ หรือคุณภาพของผลผลิตโดยการนำสารเคมีเข้ามาใช้มากเกินไป จนในที่สุดก่อให้เกิดผลเสียหลายต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมเป็นต้น ด้วยเหตุนี้แนวโน้มของการพัฒนาทางการเกษตรจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ชัดเจนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งแนวโน้มการพัฒนาทางการเกษตรจะเป็นไปในแบบการพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainable development)

จากปี พ.ศ. 2510-2542 ในปัจจุบันรัฐบาลไทยยังเล็งเห็นว่า ภาคการเกษตรเป็นการผลิตที่สำคัญของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการเสริม



สร้างศักยภาพของประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรภายในประเทศรวมทั้งเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญของตลาดโลก อย่างไรก็ตามแนวทางการพัฒนาทางด้านเกษตรไทยนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการเปิดเสรีทางการค้าและการบริการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่าง

ด้านบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(1) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและตัดสินใจเพื่อเน้นการพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืน

(2) พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร และผู้ประกอบการในภาคเกษตรให้สามารถรับ และทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตใหม่

(3) เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในการประสานงานกับภาครัฐ

เฉพาะสารตะกั่วในผลผลิตเกษตรทั้งพืชสัตว์อย่างเข้มงวด และจัดให้มีระบบประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(6) พัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร

(7) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เน้นระบบการเกษตรที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ

ในแง่ของการวิจัยและพัฒนาที่เอื้ออำนวยต่อคุณภาพของผลผลิต



ประเทศใหม่ ๆ ภายใต้การกำกับของ WTO ดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งจะมีผลให้รูปแบบการผลิตและการค้าของประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่มากขึ้น

แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพผลิตผลการเกษตรของไทย

การพัฒนาทางการเกษตรในแง่ของการพัฒนาคุณภาพผลิตผล ตามที่รัฐบาลกำหนดครอบคลุมประเด็นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านกิจกรรมการเกษตร

(1) จัดหาแหล่งน้ำที่เพียงพอเหมาะสมแก่การผลิต

(2) พัฒนาด้านการขนส่งสินค้าเกษตร ซึ่งมีผลต่อคุณภาพเมื่อผลิตผลไปสู่ผู้รับปลายทาง

(3) จัดหาข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตและการตลาด

(4) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น

(5) พัฒนาด้านการกำหนดมาตรฐานและตรวจสอบสารพิษโดย

การเกษตร กล่าวได้ว่าเส้นทางการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว มุ่งเน้นที่การแปรรูปผลิตผลการเกษตรเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรม

ในช่วงแรกนั้น ผลิตผลการเกษตรมีลักษณะเป็นวัตถุดิบ หรือนำมาใช้แปรรูปขั้นพื้นฐาน และได้มีการพัฒนามาจนเป็นผลิตผลแปรรูปมูลค่าสูง ทั้งเพื่อการส่งออกและใช้บริโภคเองในประเทศ ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (final products) ที่มีมูลค่าเพิ่ม

ดังนั้นจากการรวบรวมปัญหาในการพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางเกษตรในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงสามารถสรุปได้ว่า แนวโน้มในการพัฒนาในช่วงต่อไปควรมุ่งเน้นไปยังประเด็นดังต่อไปนี้

- เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการผลิต และพื้นที่
- ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย สารเคมี
- การค้นคว้าวิจัยด้านพัฒนาพันธุ์ การเกษตรกรรม เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์
- ทรัพยากรน้ำ และดิน
- แรงงานที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ
- การขนส่ง บรรจุกัญท์ การเก็บรักษา
- การควบคุมโรคก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
- การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
- การพัฒนาเครื่องมือการเก็บเกี่ยว
- วิธีการนำไปใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยีการแปรรูป
- การจัดทำฐานข้อมูลทางการเกษตร
- การเพิ่มการส่งออก และลดการนำเข้า
- ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา

- องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ และการถ่ายทอด

4. การพัฒนาคุณภาพผลิตผลเกษตร

ก่อนการเก็บเกี่ยว

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า การพัฒนาคุณภาพผลิตผลเกษตรเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในทศวรรษหน้าที่มีการแข่งขันทางการตลาดจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การพิจารณาคุณภาพผลิตผลเกษตรนอกจากจะดูจากสีส้ม ขนาด รูปทรง ลักษณะภายนอกแล้ว ในปัจจุบันสิ่งที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วและมีอำนาจการซื้อสูงมักจะคำนึงมากที่สุดคือความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดแมลงโรคพืชและวัชพืช หรือแม้แต่ปุ๋ยซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสารเคมีดังกล่าวข้างต้นก็สามารถก่อกวนอันตรายรวมทั้งต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดไม่ถึง คณะกรรมการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา ได้รายงานไว้ในปี ค.ศ. 1975 ว่า การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่เกินขอบเขตก่อให้เกิดมะเร็งในผู้บริโภค และเมื่อไนโตรเจนมีปริมาณ

เกินกว่า 10 ส่วนในล้านส่วนของผลิตผลเกษตรจะทำให้หญิงตั้งครรภ์เกิดการแท้ง ทารกที่เกิดจากมารดาที่บริโภคผลิตผลดังกล่าวเมื่อเกิดมาจะมีความผิดปกติทางสมอง นอกจากจะเกิดผลภัยต่อสุขภาพทางผู้บริโภคแล้ว การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปยังทำให้ผลผลิตลดลงเนื่องจากมีความอวบหนาทำให้ต้นหักล้มง่าย และลดความสามารถในการต้านทานต่อโรคและแมลง ยิ่งกว่านั้นยังทำให้คุณภาพลดลงถ้าการเก็บรักษา บรรจุกัญท์ และวิธีการขนส่งไม่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างกว้างขวางของเกษตรกรทั่วโลกมีส่วนทำลายชั้นโอโซน ซึ่งเป็นภัยที่คุกคามต่อพลโลกในปัจจุบัน ดังนั้นการใช้สารเคมีในการเกษตรจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกต่อคุณภาพผลิตผลเกษตร และเป็นเป้าหมายแรกที่จะถูกเพ่งเล็งในการนำมาเป็นข้ออ้างกีดกันการค้า โดยไม่ผิดกติกาการค้าเสรีของ WTO ด้วย รายงานนี้จึงเน้นถึงวิธีการพัฒนาคุณภาพโดยเน้นลดการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวเป็นหลัก ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

(1) การใช้พันธุ์ต้านทาน คำว่าพันธุ์ต้านทานบ่อยครั้งที่ถูกตีความหมายผิด ๆ ว่า หมายถึง พันธุ์ที่แมลงไม่สามารถทำลายได้ ความหมายของคำว่าพันธุ์ต้านทานหมายถึง ความสูญเสียหรือเกิดความเสียหายอันเกิดจากการทำลายของศัตรูพืชน้อยกว่าพันธุ์ที่ไม่ต้านทาน ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์หลายท่านจึงมักใช้คำว่าทนทาน (tolerant) แทนคำว่าต้านทาน (resistant) คำว่าพันธุ์ต้านทานยังไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทนทานต่อแมลงทุกชนิด พันธุ์ต้านทานอาจทนทานต่อศัตรูทั่วไปยกเว้น ศัตรูชนิดใดชนิดหนึ่ง พันธุ์ต้านทานอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาคุณภาพ เพราะนอกจากจะเพิ่มคุณภาพของ



ผลิตผลแล้วยังลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากลดการใช้สารเคมีรวมทั้งส่ง ผลต่อการรักษาสีสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ พันธุ์ต้านทานของพืชชนิดต่าง ๆ ใน ปัจจุบันยังมีน้อย แต่ว่าพันธุ์ต้านทาน เหล่านี้ได้ลดความสูญเสียของผลิตผล อันเกิดจากโรคแมลงอย่างมหาศาล ตัวอย่างเช่น ข้าวสาลีพันธุ์ Kansas orange sorgo เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ dwarf yellow milo ซึ่งไม่มีความ ต้านทาน ปรากฏว่าแมลงจะวางไข่ และฟักเป็นตัวอ่อนบนพันธุ์ที่ต้านทาน โดยเฉลี่ยเพียง 0.3 ตัวต่อต้น ในขณะที่



ที่แมลงชนิดเดียวกัน (Hessian fly) วางไข่บนพันธุ์ที่ไม่ต้านทานเฉลี่ยสูงถึง 99.4 ตัวต่อต้น อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น alfalfa ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์พันธุ์ Team, Weevilcheck และ Gladiator ซึ่งทนทานต่อการกัดกินของตัวง พันธุ์เหล่านี้เมื่อถูกกัดกินจะสามารถ เจริญเติบโตใหม่ในอัตราเร็วเร็วกว่า ปกติ จึงทำให้ลดความเสียหายจาก การทำลายของตัวงได้มาก ข้าวโพดก็ มีพันธุ์ต้านทานหลายพันธุ์ ซึ่งทน ทานต่อการทำลายของหนอนเจาะลำ ตัน อย่างไรก็ตามความต้านทานดัง กล่าวจะลดน้อยลงเมื่อข้าวโพดมีอายุ มากขึ้น รากของข้าวโพดบางพันธุ์ สามารถแผ่ขยายได้รวดเร็ว ทำให้ลด ความเสียหายจากหนอนขอราก พืช บางชนิดมีสารเคมีที่รู้จักในนาม “antibiosis” ในตัวมันเอง เมื่อแมลง

มาเกาะกินจะทำให้อัตราการขยาย พันธุ์ของแมลงนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไปคือ แมลง หรือโรคพืชมีความสามารถในการ ปรับตัวเองได้ ดังนั้นพันธุ์ต้านทาน เมื่อปลูกในที่เดียวกันเป็นการค้า ติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจกลายเป็นพันธุ์ที่ไม่ต้านทานได้

ทุกวันนี้ได้มีการใช้เทคนิคทางพัน- ธุวิศวกรรมทำให้สามารถตัดต่อพันธุ- กรรมและสร้างพันธุ์ที่ต้านทานโรค แมลง หรือที่เรียกกันว่า GMOs เช่น ฝ้าย B.T. ซึ่งมีความต้านทานต่อแมลง


อย่างไรก็ตามฝ้ายพันธุ์ดังกล่าว ด้รับการต่อต้านจากหลาย ๆ ประเทศใน ทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่น โดยตั้ง ข้อสังเกตว่าเป็นพันธุ์ที่ทำลายความ สมดุลของแมลงธรรมชาติ แม้กระแ สการต่อต้านจะรุนแรง แต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไป คือ การปลูกฝ้ายใน ประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ ควรก็เนื่องจากหนอนเจาะสมอ การ ปลูกฝ้ายในแต่ละรุ่นต้องพ่นสาร กำจัดแมลงไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้ง ซึ่ง ได้ทำลายแมลงทั้งที่เป็นโทษและที่ เป็นประโยชน์ นอกจากนี้การใช้สาร กำจัดแมลงมากเกินไป ย่อมมีผลต่อ การทำลายจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ กิจกรรมจุลินทรีย์ในดินซึ่งมีส่วนใน การปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ ของดินลดลง การใช้สารเคมียังมีผล ต่อมลภาวะ ดังนั้นจึงควรประเมินผล

ดีและผลเสียระหว่างการปลูกพืช GMOs และพืชปกติในทุกแห่งทุกมุม แทนที่จะมองในมุมมองเดียว

(2) การปลูกพืชชนิดใหม่ การ เลือกพืชที่ไม่เหมาะสมกับการทำลาย ของแมลงในท้องถิ่นเป็นอีกวิธีการ หนึ่งในการลดการใช้สารเคมี ตัวอย่างเช่นฝ้ายที่ปลูกในเมือง Enter- prise มลรัฐ Alabama ได้ถูกหนอน เจาะสมอฝ้ายทำลายอย่างรุนแรงจน ไม่สามารถปลูกต่อไปได้ เกษตรกร เลยหันไปปลูกถั่วลิสงแทน ปรากฏว่า ได้ผลดีและกำไรสูงกว่าการปลูกฝ้าย เสียอีก ทุกวันนี้เกษตรกรได้สร้าง อนุสาวรีย์เป็นตัวแทนหนอนเจาะสมอฝ้าย เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ช่วยให้ ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

(3) พืชกับดัก (trap crop) เป็น วิธีการกำจัดแมลงอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ กันในไร่ข้าวโพด ทั้งนี้โดยปลูกข้าว โพดในช่วงปลายฤดูการเพาะปลูก และพยายามใช้ข้าวโพดหลาย ๆ พันธุ์ เพื่อดึงดูดแมลงมาวางไข่ หลังจากนั้น ตัดต้นข้าวโพดไปหมักเป็นอาหาร สัตว์แล้วปลูกพืชอื่นแทนข้าวโพดใน ฤดูการปลูกต่อไป

(4) การปลูกพืชหมุนเวียน การ แก้ไขปัญหาศัตรูพืชทั้งโรคแมลงและ วัชพืชอีกวิธีหนึ่งได้แก่ การปลูกพืช หมุนเวียน ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติมาช้านาน และได้พิสูจน์ว่าได้ผลดี ทั้งใน ด้านกำจัดศัตรูพืชและผลตอบแทน แต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่วิธีการดัง กล่าวในปัจจุบันได้ถูกละ เลຍ เนื่องจากมีการผลิตสารเคมีมาทดแทน นอกจากนั้นการพ่นสารกำจัดวัชพืช ยังมีผลกระทบต่อระบบการปลูกพืช หมุนเวียน ยกตัวอย่างเช่น สารกำจัด วัชพืชบางชนิดที่ใช้ในไร่ข้าวโพด จะ ทำให้ไม่สามารถปลูกถั่วเหลือง หรือ ข้าวโอ๊ต จากผลดังกล่าวทำให้ เกษตรกรต้องทำการปลูกข้าวโพด



อย่างต่อเนื่องเป็นผลให้เกิดการสะสมและระบาดของแมลง โรคและวัชพืชรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้จำเป็นต้องใช้สารเคมีมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์

(5) การกำจัดเศษซากพืช การกำจัดเศษซากพืชหลังการเก็บเกี่ยวเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลและใช้กันเป็นเวลานานมาแล้ว การกำจัดเศษซากพืชอาจทำได้โดยการเผา หรือไถกลบ การเผามีข้อเสีย คือ ทำให้สูญเสียอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารพืชที่สำคัญซึ่งมีอยู่ในซากพืช ดังนั้นในสหรัฐอเมริกาจึงนิยมใช้วิธีไถกลบซากพืชหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อกำจัดหนอนเจาะลำต้น วิธีการดังกล่าวปรากฏว่าได้ผลดี

(6) การใช้วันปลูกและวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเลือกวันปลูกและวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมแม้ว่าจะ เป็นวิธีที่ไม่สามารถกำจัดศัตรูพืช แต่ก็ เป็นวิธีที่สามารถลดความสูญเสียอันเกิดจากศัตรูพืช แม้วิธีนี้จะถูกค้นพบและใช้มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็ยังเป็นวิธีที่หลาย ๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วยังใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเลือกวันปลูกหรือวันเก็บเกี่ยวก่อนที่ศัตรูพืชจะระบาดอย่างรุนแรง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จะพยายามเลือกวันปลูกโดยให้ช่วงที่พืชปลูกมีความทนทานสูงในขณะที่ศัตรูพืชระบาด นักวิทยาศาสตร์การเกษตร

ของประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยว alfalfa เมื่อ alfalfa แตกกตาและเริ่มออกดอก ซึ่งเป็นจังหวะที่แมลงเริ่มระบาดแทนการใช้สารเคมี alfalfa เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วนำไปเป็นอาหารสัตว์จะเป็นการเพิ่มโปรตีนแก่สัตว์เลี้ยง ในขณะที่เดียวกันแมลงที่หลงเหลือในไร่จะไม่มีที่หลบซ่อนและเป็นอาหารของนก ประเทศในทวีปยุโรปหลาย ๆ ประเทศแนะนำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวโพดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นเวลาที่หนอนเจาะลำต้นระบาดครั้งที่สองที่มีความรุนแรงกว่าครั้งที่หนึ่งและเกินกว่าจะกำจัดได้ด้วยสารเคมี ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังการระบาดในครั้งที่หนึ่งแล้ว แมลงมีเวลาวางไข่และฟักตัวเป็นเวลานาน ดังนั้นแทนที่จะปลูกข้าวโพดเพื่อเอาเมล็ดจึงเปลี่ยนเป็นการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารสัตว์

(7) การใช้สารเคมีในระยะเวลาที่เหมาะสม นักเกษตรมีคำพูดประโยคหนึ่งที่พูดกันจนติดปาก คือ “treat when necessary schedules” คือใช้เมื่อจำเป็น คำพูดดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่พ่นสารเคมีเมื่อศัตรูพืชมีผลกระทบอย่างแท้จริงต่อผลผลิต แทนที่จะเป็น “routine spray schedules” หรือพ่นสารเคมีเมื่อถึงกำหนดเวลา ซึ่งเป็นการใช้สารกำจัดศัตรูพืชโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพิ่มต้นทุนการผลิต

องค์การ FAO ได้ประเมินว่าเกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมี 35-50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าใช้สารเคมีเมื่อจำเป็นและถูกต้องกับระยะเวลาที่เหมาะสม

(8) การประเมินความสูญเสียของพืชปลูก ดังได้กล่าวมาแล้วว่าใช้สารเคมีเมื่อจำเป็น แต่คำว่าจำเป็นอยู่ที่ไหน จากการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2542 ท่าน รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) ได้กล่าวความตอนหนึ่ง ซึ่งสรุปได้ว่า “วิทยาศาสตร์ไม่ใช่หน้าที่ของคนเก่งทางวิทยาศาสตร์หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์เพียงฝ่ายเดียว แต่วิทยาศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคนทุกกระทรวง” ถ้าตีความหมายคำพูดดังกล่าวให้ลึกยิ่งขึ้น นักเกษตรก็ต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอาจเป็นสิ่งจำเป็น แต่ขณะเดียวกันก็ควรประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และความสูญเสียอันเกิดจากศัตรูพืชด้วย ยกตัวอย่างเช่น ผลไม้ ถ้ามีหนอนเจาะเพียงหนึ่งรู ก็เป็นที่เชื่อแน่ว่าเป็นความสูญเสีย 100% เพราะจะไม่มีผู้ใดซื้อ แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นพืชผัก หนอนเจาะใบสัก 2 รู ความสูญเสียเกือบจะไม่มี ผักดังกล่าวก็ยังคงจำหน่ายในราคาปกติได้ ดังนั้นก่อนจะใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช จึงควรคิด

ว่าจำเป็นแค่ไหน ความจำเป็นวัดได้จากต้นทุนของสาร รวมทั้งค่าแรงในการใช้สารเคมีเปรียบเทียบกับความสูญเสียในทางเศรษฐกิจของผลผลิตนั้น ๆ ดังนั้นคำว่า “treat when necessary schedules” จึงไม่ควรถูกมองข้าม ตัวอย่างเช่น ผ่ายหรือถั่วเหลือง ซึ่งเป็นพืชที่ต้องอาศัยสารเคมีกำจัดหนอนเจาะสมอหรือหนอนเจาะฝักมาก ถ้าหากว่าหนอนเจาะสมอหรือฝักระบาดในขณะที่พืชกำลังให้สมอหรือฝักอ่อน ก็เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัด แต่ถ้าเกิดเมื่อสมอหรือฝักเริ่มแก่แล้ว ความสูญเสียอาจจะมีแค่ไม่เกิน 15% เมื่อเป็นเช่นนั้น จำเป็นต้องประเมินว่ามีความจำเป็นที่จะใช้สารเคมีหรือไม่ นักเกษตรจึงควรจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ในขณะที่เดียวกันด้วย

(9) การกำจัดด้วยชีววิธี การกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี เป็นวิธีที่สามารถลดการใช้สารเคมี ในขณะเดียวกันเพิ่มคุณภาพของผลผลิตรวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดศัตรูพืช ถึงแม้ว่าการกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธีนี้จะทำได้ยากและอาจใช้เวลา รวมทั้งจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศในการนำเข้าตัวห้ำหรือตัวเบียน (predator or parasite) ซึ่งมีข้อกำหนดในรายละเอียดต่าง ๆ แต่การใช้ประโยชน์จากชีววิธี ในการกำจัดศัตรูพืชจะลดค่าใช้จ่ายเป็นมูลค่ามากมาย ได้มีการประเมินว่าปริมาณการกำจัดแมลง 3 ชนิด คือ cotton boll weevil, cotton boll worm และ apple coding moth ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา คิดเป็น 40% ของปริมาณรวมสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้ในประเทศ ดังนั้นการพัฒนางาจัดแมลงโดยทางชีววิธีสำหรับแมลงทั้ง 3 ชนิด จะสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีอย่างมหาศาล ซึ่งนอกจากจะลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอเนกอนันต์


(10) การแบ่งเขตการเพาะปลูก การกำหนดชนิดพืชปลูกที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เป็นกรรมวิธีหนึ่งในการลดการใช้สารเคมี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เพิ่มคุณภาพของผลผลิต แม้ว่าการกำหนดชนิดพืชปลูกให้เหมาะสมกับภูมิประเทศรวมทั้งการแพร่ระบาดของศัตรูพืชอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสังคมและอาจได้รับการต่อต้านจากสังคมบางกลุ่ม แต่ผลประโยชน์โดยรวมที่ได้รับคุ้มค่า ยกตัวอย่างเช่น apple coding moth ทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีซีฟจักรครบวงจรปีละ 3 ครั้ง ในขณะที่ซีฟจักรครบวงจรเพียงครั้งเดียวในภาคเหนือ ดังนั้นจะเห็นว่า การปลูกแอปเปิลในภาคเหนือจะสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดแมลงอีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่พืชผัก ซึ่งชนิดและปริมาณแมลงจะผันแปรไปตามสภาวะภูมิอากาศ ยกตัวอย่างเช่น การใช้สารเคมีกำจัดในไร่มันฝรั่งในภาคเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเท่ากับ 42% เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารดังกล่าวบนพื้นที่เพาะปลูกที่เท่ากัน ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ การใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชก็เช่นเดียวกัน ในเขตพื้นที่เพาะปลูกที่เป็น

ภูเขา ปริมาณการใช้สารเคมีจะเท่ากับ 19% ของการเพาะปลูกบนที่ราบ ดังนั้นการแบ่งเขตการเพาะปลูกสำหรับแต่ละพืชจึงน่าจะได้รับการวิจัยอย่างจริงจัง

สรุป

ปริมาณการใช้สารเคมีในการเกษตรเพื่อกำจัดศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นแมลง โรค และวัชพืชเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้เนื่องจากศัตรูพืชสามารถปรับตัวให้ทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ ผลดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตซึ่งมีผลทำให้ดัชนีการครองชีพสูงขึ้นแล้ว ย่อมมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนถึงแวดล้อม เป็นที่ยอมรับว่าการแข่งขันทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมในอนาคตจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การกีดกันการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ อย่างชัดเจนตามกฎหมายขององค์การค้าโลกจะถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวด สำหรับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องสุขอนามัยของผู้บริโภคนั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้วในกฎหมายขององค์การค้าโลก ดังนั้นประเทศไทยในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกแรกเริ่มจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายอันดับแรกที่จะถูกนำมาใช้เป็นกฎหมายบังคับ กรรมวิธีในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรโดยพยายามลดการใช้สารเคมีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นอาวุธในการรักษาตลาดโลกในทศวรรษหน้าและอนาคต






สิ่งอันพึงน้อย

ศาสตราจารย์ นภา โล่ห์ทอง

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



จุลินทรีย์-ดัชนีตัวบ่งชี้

คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของ

ปริมาณจุลินทรีย์ในอาหาร

คุณภาพอาหาร


น้ำตาลมีผลต่อการผลิต

บ่งบอกคุณภาพอย่างไร

อาหารกระป๋อง

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม โดยที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้ จุลินทรีย์เหล่านี้พร้อมที่จะปนเปื้อนลงสู่อาหารและเจริญเพิ่มจำนวน ทำให้อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ดังนั้นการตรวจพบจุลินทรีย์ในอาหารจึงเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพของอาหารได้หลายประการ เช่น การพบจุลินทรีย์ไม่จำกัดชนิดในปริมาณมาก บอกได้ว่ามีข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต เป็นต้นว่าใช้วัตถุดิบที่ไม่สด หรือขาดความระมัดระวังเรื่องความสะอาด จึงเป็นโอกาสให้จุลินทรีย์ปนเปื้อนได้มาก นอกจากนี้ยังแสดงว่าการกำจัดจุลินทรีย์ไม่ได้ผล และมีการเก็บรักษาหรือวางจำหน่ายอาหารอย่างไม่เหมาะสม ทำให้จุลินทรีย์สามารถเพิ่มจำนวนได้ ซึ่งในขณะที่เจริญจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอาหารและปลดปล่อยของเสียจากกระบวนการเมแทบอลิซึม อาหารจึงมีคุณภาพต่ำลงทั้งด้าน สี กลิ่น รส เนื้ออาหารและอื่นๆ จนเกิดการเน่าเสียในที่สุด

นอกจากปริมาณจุลินทรีย์จะบอกถึงคุณภาพในด้านความสดของอาหารแล้ว การตรวจพบจุลินทรีย์บางชนิดยังแสดงถึงสุขลักษณะอาหาร ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น การพบจุลินทรีย์ที่โดยปกติอาศัยในลำไส้คน และสัตว์ เช่น เชื้อเอสเคอริเชีย โคลิ (*Escherichia coli*) หรือใช้เรียกชื่อย่อว่า อี.โคไล เป็นดัชนีแสดงว่า อาหารได้รับการปนเปื้อนจากอุจจาระหรือมูลสัตว์ทั้งโดยทางตรง เช่น จากมือผู้สัมผัสอาหาร หรือโดยทางอ้อม เช่น จากน้ำใช้หรือปฏิกูล ซึ่งมีใช่เป็นเพียงเรื่องน่ารังเกียจเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อความเป็นไปได้ที่อาหารนั้นอาจมีเชื้อโรคระบบทางเดินอาหารปนอยู่ด้วย เช่น โรคบิด ท้องร่วง ไวรัสตับอักเสบเอ เป็นต้น เนื่องจากไม่มีใครจะรับรองได้ว่าอุจจาระนั้นจะมาจากผู้ป่วยหรือไม่ ดังนั้นในการควบคุมคุณภาพอาหาร ส่วนใหญ่จึงมีการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ดัชนีเหล่านี้



การผลิตอาหารกระป๋องเป็นการแปรรูปที่ใช้ความร้อนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจุลินทรีย์ต่างชนิดกันจะทนความร้อนได้ต่างกัน เอนโดสปอร์ของแบคทีเรียจัดว่าเป็นโครงสร้างที่ทนความร้อนได้มากที่สุด และหากแบคทีเรียนั้นเป็นชนิดที่ชอบเจริญในที่อุณหภูมิสูง (50-55 °C.) ซึ่งเรียกว่าเทอร์โมฟิลิกแบคทีเรียเอนโดสปอร์จะยิ่งทนความร้อนมากขึ้น

แบคทีเรียที่สร้างเอนโดสปอร์เจริญได้ดีในอาหารที่เป็นกรดต่ำ (ไม่มีรสเปรี้ยว) เช่น เนื้อสัตว์ และผัก เป็นต้น ดังนั้นการให้ความร้อนอาหารประเภทดังกล่าว จึงต้องแน่ใจว่าทำลายเอนโดสปอร์ได้หมด ซึ่งหากมีเอนโดสปอร์ปริมาณมากในอาหารจะต้องเพิ่มความร้อนตามไปด้วย

ส่วนใหญ่เอนโดสปอร์เหล่านี้จะติดมากับวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร วัตถุดิบที่เป็นแหล่งสำคัญของเอนโดสปอร์ที่ทนความร้อนสูง ได้แก่ น้ำตาล เนื่องจากในกระบวนการผลิตน้ำตาลต้องเคี่ยวน้ำอ้อยให้งวด



อากาศในโรงงานน้ำตาลจึงร้อนอบอ้าวอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเสมือนห้องบ่มหมักที่มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อเทอร์โมฟิลลิกแบคทีเรีย ดังนั้นหากมีน้ำอ้อยหยดหรือตกค้างอยู่ตามบริเวณต่างๆ แบคทีเรียจะเจริญและสร้างเอนโดสปอร์ได้รวดเร็วมาก และกลับไปปนเปื้อนน้ำตาลในที่สุด โรงอาหารกระป๋องจึงควรตรวจคุณภาพด้านจุลินทรีย์ของน้ำตาล และโรงงานน้ำตาลควรรักษาความสะอาดไม่ให้เชื้อเจริญหมักหมมตามจุดต่างๆ เพื่อผลิตน้ำตาลคุณภาพดี

ความเป็นกรดของอาหาร

มีผลต่อประสิทธิภาพ

ของสารกันเสีย

การใช้สารเคมีหรือที่เรียกว่าสารกันเสียหรือสารกันบูด ทำลายหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สารเคมีที่ใช้ได้มีมากมายชนิดด้วยกัน แต่การจะใช้สารอะไรในปริมาณเท่าใดนั้น ต้องเป็นไปตามกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศ เนื่องจากการใช้สารเหล่านี้ในปริมาณ

มากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค นอกจากนั้นเพื่อให้การใช้ได้ผล ผู้ใช้ควรจะเข้าใจ ข้อมูลพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการยับยั้งหรือทำลายจุลินทรีย์ของสารนั้นๆ ในบรรดาสารกันเสียที่ใช้ในปัจจุบัน กรดอินทรีย์หรือเกลือและเอสเทอร์ของกรดนั้นๆ นับว่าเป็นสารกลุ่มหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีกับอาหารหลายชนิด การใช้สารกลุ่มนี้ถนอมอาหาร ผู้ใช้ต้องทราบว่าเฉพาะกรดอินทรีย์ที่ไม่แตกตัวเท่านั้นที่มีผลในการยับยั้งหรือทำลายจุลินทรีย์ แต่การแตกตัวของกรดจะเพิ่มขึ้นเมื่อ pH สูงขึ้น ทำให้เหลือปริมาณกรดที่มีฤทธิ์ในการทำลายจุลินทรีย์ลดลงเป็นลำดับ จึงจำเป็นต้องเลือกใช้กรดให้เหมาะสมกับชนิดอาหาร ทั้งนี้โดยพิจารณาจากค่า pKa (ระดับ pH ที่กรดแตกตัวไป 50%) ของกรดแต่ละชนิดซึ่งไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น กรดเบนโซอิก (benzoic acid) มีค่า pKa 4.2 ที่พีเอช 4.0 และพีเอช 6.0 จะมีกรดที่ไม่แตกตัวเหลืออยู่ 59.3 และ 1.44% ตามลำดับ ดังนั้นสารนี้จึงใช้ได้ผลดีเฉพาะเมื่ออาหารมีความเป็นกรดสูง พีเอชต่ำ เช่น น้ำผลไม้ แยมผลไม้ และเต้าเจี้ยว เป็นต้น


อาหารกระป๋อง

ที่วามบวมคืออย่างไร

การซื้ออาหารกระป๋องนั้น ผู้ซื้อไม่สามารถจะทราบถึงสภาพที่แท้จริงของอาหารที่บรรจุอยู่ภายในว่าเสื่อมคุณภาพหรือเน่าเสียหรือไม่ แต่ก็ใช้การสังเกตลักษณะภายนอกของกระป๋องประกอบการเลือกซื้อได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพของอาหารในกระป๋อง ส่งผลให้เกิดลักษณะที่เปลี่ยนไปของตัวกระป๋อง เช่น กระป๋องบวม ซึ่งเป็นผลจากการดันของก๊าซที่เกิดจากการเน่าเสียของอาหารโดยจุลินทรีย์หรือจากปฏิกิริยาเคมี

การบวมของกระป๋องมีลักษณะต่างๆ กันขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของก๊าซที่อยู่ภายใน ตั้งแต่บวมมากจนเห็นชัดและกดไม่ลง บวมเพียงเล็กน้อยเฉพาะส่วนผาด้านในด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน แต่สามารถกดบริเวณที่บวม ให้กลับสู่สภาพเดิมหรือไปจุดที่บริเวณอื่นได้ ในกรณีนี้มักจะมีเสียงดังฟู่ฟู่ในขณะที่กดไปจนถึงบวมแบบเห็นไม่ชัดเจน ซึ่งหากผู้ซื้อไม่ีประสบการณ์หรือไม่เข้าใจ





ถึงกรรมวิธีการผลิต จะไม่ทราบเลยว่ากระป๋องนั้นบวมหรือไม่ และในบางครั้งอาจเข้าใจผิดว่าได้อาหารมากดี ในเรื่องนี้จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าในการผลิตอาหารกระป๋องนั้นก่อนปิดผนึกฝา จะต้องไล่อากาศออกจากกระป๋อง ดังนั้นเมื่อปิดฝาแล้ว ความดันในบรรยากาศภายนอกจึงสูงกว่าภายในและกดให้ฝากระป๋องทั้งสองด้านเว้าต่ำลงกว่าขอบเล็กน้อย ซึ่งเป็นลักษณะปกติทั่วไป ของอาหารกระป๋อง ดังนั้นกระป๋องที่ฝาทั้งสองด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งเปลี่ยนจากที่เว้าลงเล็กน้อยมาเป็นเสมอขอบ จึงเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าเริ่มมีก๊าซเกิดขึ้นในกระป๋องแล้ว ถึงแม้ว่าลักษณะดังกล่าวจะไม่ตรงกับคำว่าบวมในความเข้าใจทั่วไป ก็ก็ตาม นอกจากการบวมแล้วยังมีข้อสังเกตอื่นอีกหลายประการ ที่จะชี้บ่งว่าอาหารภายในกระป๋องเสื่อมคุณภาพ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทความต่อไป

การจับส้มของกระป๋อง

อาจมีผลต่อ

คุณภาพอาหาร

ในบทความก่อนหน้านี้ได้พูดถึงลักษณะการบวมของอาหารกระป๋อง เพื่อประกอบการเลือกซื้อ แต่การบวมก็ไม่ใช่ข้อบ่งบอกการเสื่อมคุณภาพของอาหารที่บรรจุอยู่ภายใน

เพียงประการเดียว ลักษณะภายนอกที่สำคัญอีกลักษณะหนึ่ง ได้แก่ รอยสนิมที่ตะเข็บกระป๋อง จะมากหรือน้อยก็ตาม ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆ เพียงจุดเดียวก็ไม่ควรเสี่ยงบริโภค หรือซื้ออาหารกระป๋องนั้น ทั้งนี้ เพราะในกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง เมื่อผ่านการให้ความร้อนแล้ว จำเป็นต้องทำให้กระป๋องเย็นลงเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการพ่นหรือแช่น้ำเย็น ซึ่งเป็นที่ทราบจากบทความก่อนหน้านี้ว่า ความดันของบรรยากาศภายนอกจะมากกว่าความดันภายในกระป๋อง ดังนั้นในขณะที่แช่หรือพ่นน้ำเย็น น้ำจึงเข้าไปในกระป๋องได้ง่ายมาก หากมีรอยร้าวแม้เพียงจุดเล็กๆ จุดเดียว น้ำที่เข้าไปจะพาจุลินทรีย์เข้าไปด้วย และจุลินทรีย์เหล่านี้เองที่เป็นตัวการของการเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพของอาหารที่บรรจุอยู่ภายใน

ท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อมีรอยร้าวแล้ว ทำไมอาหารจึงไม่รั่วไหลออกจากกระป๋อง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะรอยร้าวเป็นจุดที่เล็กมาก อาหารจึงซึมออกมาได้เพียงเล็กน้อยจนสังเกตไม่เห็น แต่จะทำให้เกิดสนิมขึ้นที่บริเวณนั้นและอุดตันรอยรั่วอย่างสิ้นเชิง แต่ถ้าหากรอยรั่วใหญ่พอลักษณะเช่นนี้ย่อมเห็นได้ชัดเจนและคงไม่มีผู้ใดดูไม่ออก

อาหารกระป๋องที่เป็นอาหารน้ำ หากมีรอยบุบภายนอก ถึงแม้จะไม่รั่ว ก็อาจเป็นที่มาของการเสื่อมคุณภาพของอาหารได้ เนื่องจากการบุบนั้นทำให้เกิดการกระแทกของดีบุกหรือ

เหล็กเคอร์ที่เคลือบผิวแผ่นเหล็กภายในกระป๋องอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความเป็นกรดสูง จะทำปฏิกิริยากับเหล็กได้โดยตรง ทำให้เกิดการสึกกร่อน กลิ่นรสของอาหารจะเปลี่ยนไป และมีโลหะในอาหารมากเกินไปจนเกินกำหนด ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

การเสียของอาหาร

กระป๋องที่ไม่สามารถ

จะสังเกตจากลักษณะ

กระป๋องภายนอก (1)



ได้เคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับกระป๋องบวมและกระป๋องรั่ว เพื่อประกอบการเลือกซื้ออาหารกระป๋องมาแล้ว ในบทความก่อนหน้านี้ก็ใคร่ทำความเข้าใจว่า ถึงแม้ว่ากระป๋องที่ไม่มีลักษณะผิดปกติที่จะ

สังเกตจากภายนอกได้เลยอาหารที่บรรจุอยู่ภายในก็มีโอกาสเสียได้เนื่องจากจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุเป็นพวกที่ไม่ผลิตก๊าซ กระป๋องจึงไม่บวมและจุลินทรีย์เหล่านี้ก็ไม่ได้เข้าไปในกระป๋อง เนื่องจากกระป๋องไม่มีรอยรั่วจึงสังเกตรอยสนิมไม่ได้

ในกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องอาจมีจุลินทรีย์บางชนิด ที่ทนความร้อนสูงมากหลงเหลืออยู่ โดยเฉพาะในรูปของสปอร์ ซึ่งโดยปกติแล้วสปอร์เหล่านี้จะไม่งอกและไม่เจริญ



สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

เนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นพวกที่เจริญได้เฉพาะที่อุณหภูมิสูง (50-60 °C.) แต่หากการผลิตอาหารกระป๋องบกพร่องในขั้นตอนการทำให้กระป๋องเย็นทันทีหลังจากให้ความร้อนแล้วแบคทีเรียดังกล่าวที่หลงเหลืออยู่ก็จะมีโอกาสอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้อาหารเสียได้ ที่พบอยู่เสมอๆ ได้แก่ การเสียที่เรียกว่า แพลตซาวร์ (flat sour) ซึ่งมีความหมายว่ากระป๋องไม่บวมแต่อาหารเปรี้ยวเนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าว สามารถเปลี่ยน

stearothermophilus) และบาซิลลัสโคแอกกิวแลนส์ (Bacillus coagulans) เป็นต้น

การเสียของอาหาร

กระป๋องที่ไม่สามารถ

จะสังเกตจากลักษณะ

กระป๋องภายนอก (2)



น้ำตาลที่มีอยู่ในอาหารให้เป็นกรดโดยไม่เกิดก๊าซ เรียกแบคทีเรียกลุ่มนี้ว่าจุลินทรีย์แพลตซาวร์ (flat sour microorganisms) ซึ่งได้แก่ บาซิลลัสสเตรียโรเทอร์โมฟิลลัส (Bacillus


นอกจากการเสียแบบแพลตซาวร์ซึ่งอาหารเลอะและเปรี้ยวกว่าปกติแล้วยังมีการเสียของอาหารในลักษณะอื่นโดยที่ไม่สามารถจะสังเกตจากลักษณะภายนอกได้เช่นกัน ได้แก่ การเสียเนื่องจากแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือที่เรียกว่าก๊าซไข่เน่า เช่น คลอสทริเดียมไนกริฟิแคนส์ (Clostridium nigrificans) และคลอสทริเดียมไบเฟอเรนแทนส์ (Clostridium bifermentans) ซึ่งสปอร์ทนความร้อนได้ดีพอสมควร จึงอาจหลงเหลืออยู่ในกระป๋อง หากให้ความร้อนไม่เพียงพอ โดยปกติแบคที

เรียชนิดนี้จะทำให้กระป๋องบวมแบบที่สามารถกดให้ยุบลงได้ (soft swell) ในกรณีนี้จึงไม่เป็นปัญหา เพราะสามารถสังเกตได้จากภายนอก แต่ก็มีความเสี่ยงที่มอดค้ประกอบไม่เหมาะสมต่อการผลิตก๊าซ หรืออยู่ในระยะที่เชื้อเริ่มเจริญ จึงมีไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดขึ้นปริมาณน้อย และก๊าซนี้จะละลายน้ำได้ดี ปริมาณที่สะสมอยู่ในสภาวะที่เป็นก๊าซ จึงไม่มากพอที่จะทำให้กระป๋องบวม แต่เราก็จะสังเกตได้จากการที่อาหารมีสีคล้ำกว่าปกติ เนื่องจากไฮโดรเจนซัลไฟด์ทำปฏิกิริยากับเหล็ก ซึ่งมีอยู่ในอาหารได้ เหล็กซัลไฟด์ซึ่งมีสีดำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการสึกกร่อนของดีบุกหรือเหล็กเคลือบที่เคลือบภายในกระป๋อง ก๊าซจะทำปฏิกิริยากับแผ่นเหล็กที่ใช้ทำกระป๋องได้โดยตรง นอกจากสีจะคล้ำแล้วยังอาจมีกลิ่นก๊าซไข่เน่าอ่อนๆ อีกด้วย

ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่จะทำให้หวาดหวั่นจนไม่กล้ารับประทานอาหารกระป๋อง เพียงแต่ขอให้สังเกตลักษณะก่อนรับประทาน เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจริง



PED GROUP



PLANNING ENGINEERING DEVELOPMENT CO.,LTD.

รับออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

รับออกแบบและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

รับออกแบบและติดตั้ง MATV , CCTV

บริษัท สุนันท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า , สื่อสาร , แอร์ , สุขาภิบาล , ดับเพลิง



MEGASOFT COMPUTER CO.,LTD.

จำหน่ายคอมพิวเตอร์ , ซ่อม , วางระบบ LAN , NETWORK

COMPUTER GRAPHIC , CAI , PRESENTATION

บริการ INTERNET , รับสร้าง HOME PAGE ส่วนตัวและงานธุรกิจ

ขอแสดงความยินดี

การจัดทำวารสาร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการวิจัย และพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์

ด้วยความปรารถนาดี

จาก



บริษัท พี.พลาสติก จำกัด

1797 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. 513-5085, 513-7578-9 Fax: 513-3477

ผู้แทนจำหน่าย แผ่นพลาสติก อคริลิก

แผ่น P.V.C. ญีปุ่น-ไต้หวัน

ท่อพลาสติกใส กลวงและตัน ทุกชนิด

ขอสนับสนุน

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยความปรารถนาดี

จาก



บริษัท บางกอกเทรดดิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด

BANGKOK TRADING CENTER CO., LTD.

4/43 หมู่ 9 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

4/43 MOO 9 SAMUKKEE RD. BANGTALAD, PAKKRED NONTABURI 11120

TEL. (662) 573-8761, 980-1247-8, 573-1298 FAX: (662) 980-1519

จำหน่าย : อุปกรณ์ไฟฟ้าฯ, อุปกรณ์ไฟส่องสว่างฯ

รับเหมาติดตั้ง : ไฟส่องสว่างฯ, ไฟฟ้าฯ



Chemrite® Cleaner/Degreaser ใช้สำหรับล้างคราบ
สกปรกต่างๆ คราบน้ำมันและจารบี ไม่มีสารพิษ ใช้ได้กับ
ผิววัสดุแทบทุกชนิด ตั้งแต่อาคาร โรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์
และชิ้นส่วนวัสดุในการผลิต
สินค้าอื่นๆ เช่น โอริง ซีล ปะเก็นคอปเพลลา ปะเก็นหน้า
แปลน **Mechanical Seals** บริการให้คำแนะนำฟรี

บริษัท เวสต์บาวด์เอ็นจิเนียริง จำกัด

769/4 ถ. พระราม 9 ซอย 15 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320



Tel: 7197300-7 Fax: 7197309

ENERGY SAVER by ENER SAVER (THAILAND) CO.,Ltd.

การประหยัดไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตทุกคน นอกจากท่านจะได้ประโยชน์จากการประหยัดค่าไฟฟ้าแล้ว ท่านยังยืดอายุของหลอดไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศของท่านอีกด้วย ที่สำคัญท่านจะรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในทางอ้อมด้วยการที่การไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือแก๊สธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิตของบุตรหลานของท่านในอนาคต

หลักการการทำงานของชุดประหยัดไฟฟ้า

เมื่อแขกออกจากห้องพักเอากุญแจออกจากกล่องกุญแจ บางประตูห้อง ไฟทุกดวงที่ต่อเข้ากับระบบจะดับหมดในเวลา 30 วินาที และเมื่อเข้าห้องนำแป้นกุญแจมาเสียบหรือแปะบนกล่องกุญแจ ไฟทุกดวงจะกลับสู่สภาพเดิมก่อนออกจากห้อง



ระบบควบคุมไฟหัวเตียงซึ่งรวมระบบประหยัดไฟฟ้านิคมี่สาย สำหรับโรงแรมที่กำลังสร้างหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือชนิดไร้สาย สำหรับโรงแรมที่เปิดบริการอยู่แล้วโดยไม่ต้องแก้ไขหรือเดินสายไฟเพิ่มเติมอย่างไร

2083 AR/EN 0999AR คู้มทุนภายใน 4 เดือน
 2083 ALT จะคู้มทุนภายใน 6-8 เดือน
 ชุดควบคุมไฟหัวเตียงพร้อมระบบประหยัดไฟ คู้มทุนภายใน 18 เดือน

ต้องการสั่งซื้อหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท เอ็นเนอร์ เซฟเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

550 หมู่ที่ 12 ซอยธรากร 6 ถนนรามคำแหง มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร. 517-9065-6, 917-5041 โทรสาร. 517-3062

E-mail address : enersave @ ksc 15.th.com

Home page : www.ener-saver.com

ติดต่อ :

คุณภิญโญ หรือ คุณปณิญา



ใครจะเชื่อว่า ความงามสบายได้ทุกสิ่ง

แต่ภายในห้องที่เหลี่ยมแห่งนี้

มันเหมือนมีมนต์สะกด

ให้อ้อยอิ่งไปกับการปรู้งนั่น แต่งนี้

จนดูเหมือนว่า ไม่อยากให้ช่วงเวลาสั้นๆ นี้ ผ่านไป

...เอ หรืออย่างนี้ที่เรียกว่า อำนาจของความงาม

American Standard

ผู้นำด้านสุขภัณฑ์

4-STROKE MANUAL CLUTCH CASUAL SPORT



4 จังหวะ:
คลัทช์มือ/รุ่นแรก

SUPER CLEAN

เคา์ริงหน้าสุดสวยระบบ BUILT-IN-TYPE
ไฟหน้าใหม่ตาเพชร (SINGLE DIAMOND HEADLIGHT)
พร้อมไฟเลี้ยวหน้าใหม่แบบ "MULTI-REFLECTOR"
ส่องสว่างเจิดจ้า



ไฟหน้าตาเพชร สวย สะกดทุกสายตา

ไฟท้าย ดีไซน์เรียบคม



ไฟท้ายและไฟเลี้ยวใหม่
แบบ "MULTI-REFLECTOR"
สวยสดใสนุ่มนวล
ส่องสว่าง ปลอดภัย
แม้ในเวลาค่ำคืน



คลัทช์มือ นิ่มนวล

บิดมันทันใจ


ไม่กระตุก

ออกตัวนิ่มนวล ชัสนุก บิดสะใจ
ไม่ต้องรอรอบ ไม่มีอาการกระตุก
หรือกระชาก และยังช่วยประหยัดน้ำมัน

แผงหน้าปัดเรือนไมล์

สไตล์เท่ๆ


แผงหน้าปัดเรือนไมล์
สไตล์แฟมิลีสปอร์ต
สวยสุดเจียบ
พร้อมสัญญาณไฟ
บอกเกียร์ครบชุด



ดิสก์เบรกหน้า เพิ่มความปลอดภัย
พร้อมล้ออะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป 5 แฉก

ในรุ่น ไนซ์ ซูเปอร์

มันใจในทุกเส้นทาง
หยุดสนิทด้วยดิสก์เบรกหน้า
แบบลูกสูบคู่ และเพิ่ม
ความสวยเก๋ยิ่งขึ้น
สำหรับรุ่นไนซ์ ซูเปอร์ กับ
ล้ออะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
5 แฉกโฉมใหม่ แบบต้น
TYPE Z (ไทป์ ซี)
แข็งแรง สวยหรู



รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น ผลิตภายใต้โรงงาน
ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริง ซึ่งได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานสากล **EN ISO 9002** และ
การจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม **EN ISO 14001**

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกคัน รับประกัน 10,000 กม. หรือ 1 ปี

หจก. ศรีทอง อิเล็กโทรเคมีเคิล

SRITONG ELECTRO CHEMICAL LIMITED PARTNERSHIP

119 หมู่ 11 ซอย ส.ไทยเสรี 2 ก.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

119 MU 11 SOI S.THAISERI 2 SUKSAWAD RD., NAIKONGBANGPRAKOD,

PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND.

TEL. 4258743, 4258745, 4258748, 4258416, 4258514 FAX: 4258744

ปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองอิเล็กโทรเคมีเคิล ดำเนินกิจการ 5
ประเภท คือ

1. การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. การฉีดพลาสติก
3. การชุบโครเมียมบนพลาสติกเอบีเอส
4. การชุบสแตนเลส
5. อลูมิเนียมอะโนไดซ์



WITH THE COMPLIMENT OF



C.P. Group of Companies



C.P. Intertrade Co., Ltd.

C.P. Tower 313 Silom Road, Bangkok 10500, Thailand Tel. 638-2000 Fax : 631-0977





สยามคูโบต้า

ผู้นำแห่งนวัตกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตร

เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรไทย




พบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ
สยามคูโบต้า ที่ฮอลล์ 1, BOI FAIR 2000



บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

101/19-24 หมู่ 20 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 โทร. (66)-2-909-0300 Fax. 909-1698



วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

ดาวเทียม Terra

เพื่อการติดตามตรวจสอบ


โลกจากบรรยากาศ

กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NASA) จัดส่งดาวเทียม 3 ดวงภายใต้โครงการ Earth Observing System (EOS) เข้าสู่วงโคจรรอบโลก โครงการนี้มูลค่า 7,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี มีจุดประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆของโลก ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ตลอดจนศึกษาว่าพฤติกรรมของมนุษย์บนโลกจะส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลง กระบวนการดังกล่าวหรือไม่

ดาวเทียมดวงแรกในโปรแกรมนี้มีชื่อว่า Terra ส่งขึ้นสู่อวกาศจากฐานทัพอากาศ

Vanderberg มลรัฐแคลิฟอร์เนียในวันที่ 16 ธันวาคม โดยมีน้ำหนัก 5,000 กิโลกรัม และมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากนั้นใน 3 ปีข้างหน้าจะตามด้วยดาวเทียมชื่อ Aqua และ Chem ดาวเทียมแต่ละดวงจะบรรทุกเอาเครื่องมือ probe ตรวจวัดคลื่นแสงทุก wavelength ตลอดจน



การวัดการเกิดเมฆ อุณหภูมิของน้ำทะเล และปริมาณการเจริญเติบโตของพืชต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นครั้งแรกที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจโดยถ่องแท้ถึงระบบของโลก (Earth System) ทั้งหมด

โครงการ EOS นี้

เกิดขึ้นก่อนยุคการบริหารใหม่ของ NASA ซึ่งมีคำขวัญว่าดาวเทียมรุ่นใหม่จะต้องสร้างในระยะเวลาสั้น ใช้ค่าใช้จ่ายถูกกว่าแต่ก่อนและต้องมีคุณสมบัติดีกว่า ดังนั้น แม้เป้าหมายจะคงเดิมแต่ขนาดโครงสร้างมีการลดขนาดลงจากเดิม จึงทำให้เป็นดาวเทียมสำรวจที่มีอายุสั้นกว่าเดิม

(ที่มา : Science, Volume 286, No. 5447, December 10, 1999) สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ธันวาคม 2542

เทคนิคการก่อสร้างถนนที่

ช่วยลดมลภาวะทางเสียง



ในทวีปยุโรป ประชากรประมาณ 17% หรือประมาณ 113 ล้านคน ต้องทนอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 65 เดซิเบล (A) ซึ่งเป็นระดับที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยถนนนับเป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง

แหล่งหนึ่งเช่นเดียวกัน ทางออกของปัญหามีมากมายหลายทาง ไม่ที่จะเป็นการลดเสียงดังจากเครื่องยนต์ การผลิตรถที่ก่อให้เกิดเสียงน้อยลง การใช้กำแพงกันเสียง และการใช้วัสดุกันเสียงใน

การก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการสร้างผิวนถนนที่ก่อให้เกิดเสียงดังน้อยลงซึ่งกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วมากกว่า 50 ก.ม./ชม. เสียงดังส่วนใหญ่จะมาจากการสัมผัสกันของขอบยางรถกับพื้นถนน การบีบอัดอากาศบริเวณหน้ายาง และการปล่อยอากาศออกทางด้านหลัง ฯลฯ เพื่อเป็นการลดเสียงที่เกิดจากการสัมผัสของยางกับพื้นถนน บริษัทผู้สร้างถนนจึงพัฒนาพื้นผิวแบบต่างๆ ที่ช่วยลดเสียงดังลงได้หลายเดซิเบล หลักการสำคัญของผิวนถนนแบบใหม่คือการลดขนาดของส่วนผสมที่มალาดผิวนถนนและเพิ่ม



วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า



ปริมาณช่องว่างในเนื้อยาง เมื่อก่อนนั้นขนาดอนุภาคเนื้อยางจะต้องใหญ่กว่า 14 มม. เพื่อให้รถเกาะถนนได้ดี ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงดัง แต่ปัจจุบันขนาดของอนุภาคได้ลดลงมาอยู่ระหว่าง 6-10 มม. และเปอร์เซ็นต์ช่องว่างได้เพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 20% นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับคลื่นเสียงได้เป็นอย่างดี

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ บริษัทก่อสร้างถนนต่างๆ ล้วนได้รับการมอบหมายจากส่วนปกครองท้องถิ่นให้สร้างถนนที่มีประสิทธิภาพในการลดเสียงดังภายใต้แรงกดดันจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ถนนที่มีรถวิ่งผ่านเป็นปริมาณมาก “ตลาดสำคัญของเราคือถนนสายชานเมืองที่ซึ่งมีรถวิ่งเป็นปริมาณมากด้วยความเร็วระหว่าง 70-100 กม./ชม.” Bernard Héritier ผู้รับผิดชอบฝ่ายเทคนิคบริษัท SCR-Beugnet กล่าว บริษัทสร้างทางด่วนก็เช่นกันที่เริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องการลดเสียงดัง ไม่เฉพาะสำหรับผู้อาศัยรอบข้างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้ขับขี่ที่จะได้ฟังวิทยุเทปในรถได้อย่างชัดเจน “เสียงเริ่มเป็นสิ่งที่ถูกค่าให้ความสำคัญ เราจึงเลิกขายพื้นถนนสำหรับทางด่วน เพราะแม้ว่ามันจะให้การยึดเกาะที่ดี แต่ก็ก่อให้เกิดเสียงดังมาก” Pierre-Marie Spillemaecker ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขายบริษัท Eurovia กล่าว

ถนนคอนกรีตยาง (Bituminous concretes) แบบบางมาก (VTBC) และแบบบางเฉียบ (UTBC) จากบริษัทต่างๆ ในฝรั่งเศสถือเป็นถนนที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านเสียงหรือการเกาะถนน ในอนาคตการผลิตจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะช่วยให้มีราคาลดลง นอกจากนี้หลายบริษัทยังได้เสนอการสร้างผิวถนนรูปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น บริษัท Gerland Routes ได้พัฒนาการสร้างผิวถนน Epsibel ขึ้นมา โดยผิวถนนจะประกอบด้วยคอนกรีตยางความพรุนสูงสองชั้นที่มีขนาดอนุภาคต่างกันมาก ชั้นล่างจะเป็นแอสฟัลต์พรุน HP 10/14 กับยางอีก 2.5% (หนา 4 ซม.) ส่วนชั้นบนจะเป็นชั้น Micro-phone HP 4/6, ยางแบบ Highly cohesive 4.5% และไฟเบอร์กลาส 0.8% (หนา 2 ซม.) ชั้นบางนี้จะช่วยลดการกระจายเสียงดัง ส่วนชั้นยางที่พรุนจะทำหน้าที่ดูดซับเสียงของเครื่องยนต์และแรงสั่นสะเทือนหลักการสร้าง “ถนนเงียบ” นี้ได้รับรางวัล Golden Decibel ในปี 1997


ผู้ชนะเลิศรางวัลนี้อีกรายหนึ่งแต่เป็นในปี 1995 คือบริษัท Colas ผู้ผลิตคอนกรีตยางแอสฟัลต์ Colsoft ซึ่งมีส่วนผสมของยางพาราผงที่ทำมาจากยางรถใช้แล้ว พื้นถนนชนิดนี้ นอกจากช่วยลดเสียงดังแล้ว พื้นที่มีลักษณะด้านยังช่วยลดการสะท้อนแสงและเพิ่มทัศนวิสัยขณะขับรถให้ดียิ่งขึ้น หลังจากทดสอบเสียงตามมาตรฐาน S 31-119 ที่เมือง Benfeld บนทางหลวงสาย RN 83 พื้นถนน Colsoft 0/6 สามารถช่วยลดเสียงดังลงได้

8 เดซิเบล (A) และยังช่วยให้รถเกาะถนนได้ดีอีกด้วย

ในเขต Alpes Maritimes ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส มีการพบว่าถนน Mallausséna มีการจราจรหนาแน่นเสียงอาจก่อความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยรวมทั้งคนขับได้ จึงมอบหมายให้บริษัท SCR-Beugnet นำ Citychape มาฉาบผิวถนน Citychape เกิดจากการหลอมด้วยความร้อนของส่วนผสมต่างๆ เช่น ยางพาราปนจากยางเก่า (1.5-2%) วัสดุจำพวก lime-stone-silicate ที่มีขนาดของอนุภาคต่างๆ กัน และยางบริสุทธ์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ได้ผิวถนนที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่มาจากยางรถยนต์ได้เป็นอย่างดี Citychape ได้รับรางวัลนวัตกรรมจากสหพันธ์การก่อสร้างสาธารณูปโภคแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังมีการผสมทรายละเอียดและออร์แกนิกไฟเบอร์ลงไปเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและความทนทานของพื้นผิวถนน เช่น Viaphone ของบริษัท Eurovia ที่ได้รับเลือกจากการทางฝรั่งเศสมาใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพถนน ส่วนแอสฟัลต์พรุนก็กำลังพัฒนาประสิทธิภาพสู่รุ่นที่ 3 เช่น Accrophone PE จากบริษัท Jean Lefebvre ซึ่งมีปริมาณช่องว่างประมาณ 30%


ที่มา : สำนักข่าวเทคโนโลยีฝรั่งเศส มิถุนายน 2542





แผนการระดับสิทธิบัตร

ของยีนมนุษย์



รัฐบาลสหราชอาณาจักรและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา กำลังวางแผนร่วมกันในการป้องกันการจดทะเบียน 100,000 ยีนมนุษย์จากบริษัทเอกชน โดยเป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่า ผลประโยชน์ทางการแพทย์จะสูญเสียไปหากบริษัทเอกชนได้สิทธิบัตรในการจดทะเบียนทางการค้าจากยีนของมนุษย์ดังกล่าว

ร่างกฎหมายทางพันธุกรรมของมนุษย์คาดว่าจะสำเร็จในต้นปีหน้า โดยกฎหมายนี้จะระบุว่า หากเอกชนได้สิทธิในการจดทะเบียนการค้าของยีนมนุษย์ จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายราคาแพงในการรักษาและการค้นคว้าพัฒนาต่อไปในอนาคต แต่บริษัทได้คัดค้านว่า ในอดีตที่ผ่านมา หากปราศจากสิทธิบัตร บริษัทจะไม่สามารถตั้งเงินกองทุนในการค้นคว้าวิจัยที่มีราคาแพงๆ ได้ ทั้งไม่มีการรับประกันเงินทุนที่ทดลองจ่ายไปในการค้นคว้า บริษัท Wellcome Trust ของอังกฤษ และ the US National Institute of Health-NIH ได้นำยีนที่ค้นพบแต่ละตัวออกสู่สาธารณะภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากค้น


พบเพื่อเป็นการป้องกันการจดทะเบียนสิทธิบัตร นอกเสียจากบริษัทอื่นได้ขอจดทะเบียนไปก่อนหน้านี้อยู่แล้ว วิธีการใหม่นี้ น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งในการต่อต้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร

Dr. Michael Morgan หัวหน้าผู้บริหารของ Wellcome Trust Genome Campus แห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ซึ่งดำเนินการส่วนใหญ่ของโครงการ International Human Genome Project กล่าวกับผู้สื่อข่าวของ BBC ว่า นี่คือการก้าวใหญ่ที่มุ่งหน้าไปสู่ความมั่นใจว่าข้อมูลในตัวเราทั้งหมด จะสามารถถูกนำมาใช้โดยไม่มีการคิดมูลค่า ซึ่งเขาเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้จะไม่ขัดขวางต่อการค้นคว้าและพัฒนาทางยาแต่อย่างใด ทั้งยังเป็นการมั่นใจได้ว่าบริษัทหนึ่งบริษัทใด ไม่สามารถหยุดยั้งการค้นคว้าพัฒนาของยีนตัวใดตัวหนึ่งได้ แผนการนี้เป็นที่ยอมรับและตีพิมพ์ในเอกสารของ the UK's Guardian Newspaper under US Freedom of Information Law ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Lord Sainsbury รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์

และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอังกฤษ และ Neal Lane ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ปรึกษากันหลายครั้งแล้ว จนเกิดเป็นการเปลี่ยนการตกลงอย่างไม่เป็นทางการที่จะไม่มีการให้สิทธิบัตร แต่จะเผยแพร่การวิจัยค้นคว้ายีนของมนุษย์ออกสู่สาธารณชนที่มีชื่อว่า the Bermuda Agreement ไปสู่การตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล

Craig Venter นักวิทยาศาสตร์และนักลงทุนชาวอเมริกา ผู้บุกเบิกงานด้านการค้นคว้ายีนของมนุษย์เจ้าของบริษัท Celera ได้คัดค้านโครงการดังกล่าว เนื่องจากเขาได้ค้นคว้าและพัฒนา ยีนของมนุษย์มา 100,000 ยีนแล้ว ซึ่งควรจะอนุญาตให้เขาจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ โดยเขาได้พยายามขอความสนับสนุนจาก the US Department of Energy-DoE แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุน รายงานล่าสุดแจ้งว่า the UK Department of Trade and Industry ได้ออกมายืนยันว่าการตกลงระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่มา : -BBC News Monday, September 20, 1999. สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรัสเซลส์, เบลเยียม สิงหาคม 2542



ในพื้นที่หลายๆแห่งบนโลกมีปัญหาดินเค็มจากชั้นเกลือใต้ดิน ทำให้การทำการเกษตรไม่ได้ผลเต็มที่ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแก้ไขปัญหานี้เริ่มมีการดำเนินการที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยนักพฤกษศาสตร์ทดลองผลิตพืชที่ดัดแปลงยีน (Genetically Modified Plants, GMOs) ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้แม้เมื่อใช้น้ำที่มีความเค็มสูง (200 mM NaCl) เป็นแหล่งน้ำ เทคโนโลยีใหม่นี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้าว ข้าวโพด หรือพืชในเชิงพาณิชย์ต่างๆ ได้ในอนาคต ผลวิจัยครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและจับตา

มองอย่างยิ่งในวงการวิจัยด้านความคงทนต่อความเค็ม (salinity tolerance) ในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาพืชที่เป็น salt-tolerant crops จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศกำลังพัฒนา เพราะกำลังเผชิญกับปัญหาดินเค็มและผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง ทั้งนี้ในระดับโลกปัญหานี้เกิดขึ้นในพื้นที่ชลประทาน 50% ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 30%

การทำการชลประทานในพื้นที่เกษตรที่พัฒนามานานหรือโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชั้นหินเกลือจะก่อให้เกิดปัญหาดินและน้ำเค็มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้เมื่อน้ำชลประทานระเหยหรือถูกพืชนำไปใช้จะทิ้งเกลือและแร่ธาตุไว้เบื้องหลังซึ่งเป็นตัวก่อปัญหาดังกล่าว พืชที่ทนความเค็มจะควบคุมเกลือโดยการผลักเกลือไปเก็บในโครงสร้างภายในเซลล์ที่เรียกว่า Vacuoles ทั้งนี้โดยมีผู้นำพาไปเป็นสารโปรตีนที่เรียกว่า Na^+/H^+ antiport ซึ่งจะ highly active มากกว่าปกติในพืชประเภทนี้ การวิจัยครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จในการค้นพบตำแหน่งของยีนที่ควบคุมการผลิตสารโปรตีน antiport เหล่านี้

ที่มา : Science, Volume 285, No. 5431, August 20, 1999 and Chemical & Engineering News, August 23, 1999
 สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
 สิงหาคม-กันยายน 2542

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการปศุสัตว์

การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดปัญหาเชื้อโรคในสัตว์ตลอดจนช่วยให้สัตว์เติบโตได้นั้นเป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งมานานหลายปีแล้ว แต่ข้อโต้แย้งเริ่มร้อนแรงขึ้นจากข่าวคราวที่เพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจำวันว่า เชื้อโรคแบคทีเรียซึ่งก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยในมนุษย์เริ่มมีความต้านทานหรือดื้อต่อยาปฏิ

ชีวนะที่ใช้รักษามากขึ้น สาเหตุมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดียวกับที่มนุษย์ใช้อย่างเกินความจำเป็นในกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์

จากการประมาณการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Center for Disease Control & Prevention-CDC) ที่เมืองแอตแลนต้า พบว่าในสหรัฐอเมริกามีการผลิตยาปฏิชีวนะในแต่ละปี

ประมาณ 22.3 ล้านกิโลกรัม ซึ่งในจำนวนนี้ 8.9 ล้านกิโลกรัม หรือราว 40% ใช้ในการปศุสัตว์เพื่อช่วยให้สัตว์โตเร็ว และกว่า 80% ของสัตว์ที่เลี้ยงจำพวก วัว สุกร สัตว์ปีก ได้รับยาปฏิชีวนะในอาหารที่ให้ในปริมาณต่ำกว่าที่จะให้ผลในการรักษาโรค (sub therapeutic level) การดื้อต่อยาปฏิชีวนะของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคใน




วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

มนุษย์และสัตว์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งในสหรัฐและทั่วโลกและจากหลักฐานที่เก็บข้อมูลมาโดยตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าสาเหตุนี้เกิดจากยาปฏิชีวนะที่ให้แก่สัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตาม ความเห็นจากหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงเกษตร สหรัฐ ยังเห็นว่า ควรต้องมีข้อมูลวิจัยมากกว่านี้เพื่อจะตัดสินใจกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าเดิมในการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ เพราะยังเห็นว่าการให้ยาปฏิชีวนะในระดับ sub therapeutic (น้อยกว่า 200 กรัมต่อตันอาหารสัตว์) จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคในสัตว์ สัตว์เติบโตเร็วและยังป้องกันการเกิดโรคระบาดร้ายแรงในสัตว์อีกด้วย

ในปีที่แล้วองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เสนอโครงการเพื่อประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างปลอดภัยในการปศุสัตว์ ตลอดจนพิจารณาถึงกรณีที่เกิดแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะในมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดำเนินการมิได้มีการกำหนดไว้ให้ชัดเจน เหตุผลหนึ่งที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรควิตกกังวลได้แก่ ปัญหาการที่กรณีเจ็บป่วยในประชากรสหรัฐ จากเชื้อโรคจากอาหารการกินมากขึ้น โดยศูนย์ฯ ประเมินว่าในปีหนึ่งๆ ประชากรสหรัฐ 76 ล้านคนเจ็บป่วยด้วยสาเหตุนี้ และกว่า 5,000 รายเสียชีวิตจากอาหารที่ปนเปื้อนด้วยไวรัส, แบคทีเรีย, parasite, สารพิษ toxin และโลหะหนัก เป็นต้น ในแต่ละปีประชากร 8,000 ถึง 18,000 รายต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล 2,400 รายเกิดการติดเชื้อในเลือด และจำนวน 500 รายเสียชีวิตด้วยเชื้อโรคที่มาจากอาหารคือ *Salmonella*, *Compylobacter* และ *Escheri-*

chia coli (*E. Coli* 0157:H7) ในขณะเดียวกัน FDA พบว่าเนื้อสัตว์ในตลาดมีการปนเปื้อนมากขึ้นด้วยแบคทีเรีย ทั้งนี้ FDA's Center for Veterinary Medicine รายงานว่า เนื้อวัว 1%, เนื้อหมู 8.7% และเนื้อสัตว์ปีก 20% จากซากสัตว์ที่ตรวจมีการติดเชื้อ *Salmonella* ในขณะที่เชื้อ *Compylobacter* จะติดเชื้อในซากสัตว์ของเนื้อวัว 4% เนื้อสุกร 31.5% และไก่ 88% แบคทีเรียเหล่านี้ปกติจะตายหากมีการทำอาหารอย่างถูกอนามัย แต่หากปรุงอาหารไม่สุก หรือมีดและเขียงที่ใช้ไม่สะอาดก็จะเป็นการปนเปื้อนได้ง่าย สาเหตุหนึ่งที่แบคทีเรียติดมากับอาหารเริ่มมีความดื้อยาต่อยาปฏิชีวนะนั้นได้แก่ การที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ



ชนิดเดียวกันกับที่ใช้รักษาโรคในมนุษย์ในการเลี้ยงสัตว์ ในสหรัฐมีการอนุญาตให้ใช้ยาปฏิชีวนะถึง 19 ชนิดในการใช้เป็นตัวกระตุ้นความเจริญเติบโต (growth promoter) ในสัตว์เลี้ยง ซึ่งในจำนวนนี้ 6 ชนิดเป็นยาปฏิชีวนะที่สำคัญในการรักษาโรคในมนุษย์ ยาปฏิชีวนะเหล่านี้เมื่อนำไปใช้ในอาหารสัตว์จะทำให้สายแบคทีเรียในกระเพาะเหลือแต่แบคทีเรียชนิดที่ดื้อยาไว้ในเนื้อสัตว์ที่นำมาขายเป็นอาหาร

สำหรับจุดยืนในเรื่องนี้นั้น American Public Health Association มีความเห็นเหมือนกลุ่ม European Union และองค์การอนามัยโลก (WHO)

ที่จะให้ยกเลิกการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดที่ใช้กับมนุษย์หรือชนิดที่คล้ายคลึงกันในการเป็น growth promoter ในสัตว์เลี้ยง ประเทศอังกฤษห้ามการใช้เพนนิซิลลิน (penicillin) และเตตราไซคลิน (tetracycline) ในการเลี้ยงสัตว์ในปี 2531 ในกรณีสหรัฐนั้น FDA มีการเสนอแผนการห้ามใช้ยาปฏิชีวนะดังกล่าวเช่นกัน แต่รัฐสภาไม่อนุมัติและให้ FDA ทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม การผลักดันในเรื่องนี้ในสหรัฐ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มองค์กรเอกชน เช่น Environmental Defense Fund (EDF) ในการรณรงค์ให้ FDA ยกเลิกการอนุญาตให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะ 6 ชนิด ซึ่งใช้ในการปศุสัตว์ ซึ่งได้แก่

penicillin, tetracycline, erythromycin, lincomycin, tylosin และ virginiamycin

ในขณะเดียวกันมีรายงานจาก National Research Council ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสรุปว่าแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะสามารถถ่ายทอดจากสัตว์สู่มนุษย์ได้โดยผ่านการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการปศุสัตว์สามารถก่อให้เกิดสภาพการดื้อยาได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถประเมินในด้านความเสี่ยงที่เกิดต่อสุขภาพของประชาชนได้ เพียงแต่ให้ข้อสังเกตว่าการยกเลิกการใช้ยาปฏิชีวนะในการปศุสัตว์ในสหรัฐ จะทำให้อเมริกันต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น



วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

ประมาณ 4.85 ถึง 9.72 เทรียญ
สหรัฐ ต่อคนต่อปีในการซื้อหา
อาหารจำพวกเนื้อสัตว์และปลา ส่วน
สถาบัน Animal Health Institute ซึ่ง

เป็นตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
อาหารเสริมในการปลูกสัตว์แสดง
ความเห็นว่ารบจนปัจจุบันมีหลัก
ฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะเชื่อม

โยงประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะในการ
ปลูกสัตว์กับอัตราการเพิ่มขึ้นของการ
ดื้อยาของเชื้อโรคในมนุษย์

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พฤศจิกายน 2542

NIH ถึงกฎเกณฑ์ในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ตัวอ่อน

เมื่อต้นเดือนธันวาคมนี้ The National Institute of Health (NIH) เสนอร่างแนวทางที่จะอนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากรัฐบาลหรือสหรัฐสามารถทำการวิจัยโดยใช้เซลล์ตัวอ่อน (Embryonic fetal stem cell) หลังจากที่ตั้งเงื่อนไขปฏิเสธมาตลอดหลายปีที่จะไม่ให้ทุนเนื่องจากเหตุผลทางด้านจริยธรรม แม้ว่าการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ของ NIH จะเป็นไปอย่างระมัดระวัง เห็นได้จากใช้ระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่มีข้อขัดแย้งในเรื่องนี้แต่ยังไม่วายถูกโจมตีจากกลุ่มผู้ต่อต้านการทำแท้ง โดยจะผลักดันให้รัฐสภาเข้าแทรกแซงและขัดขวางการให้ความสนับสนุนการวิจัยที่ใช้เซลล์ตัวอ่อนทั้งหมด นักวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมากมีความเชื่อว่า เซลล์ตัวอ่อนซึ่งสามารถเจริญเติบโตกลายเป็นเซลล์ต่างๆของร่างกายมีความ

สำคัญต่อการวิจัยขั้นพื้นฐาน (basic research) เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้าน Development Biology และการใช้รักษาโรค

ตาม Federal Law อนุญาตให้ NIH สนับสนุนการวิจัยบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อตัวอ่อน (fetal tissue) แต่



ห้ามการทดลองที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ตัวอ่อนมนุษย์ แต่ในเดือนมกราคม 2542 ที่ผ่านมานั้น Department of Health and Human Services ของสหรัฐ ซึ่งควบคุมดูแล NIH ได้ชี้ชัดว่า กฎหมายดังกล่าวไม่

ได้ห้ามการวิจัยที่ใช้เซลล์ตัวอ่อนที่แยกมาจากตัวอ่อนเพราะไม่สามารถพัฒนาเป็นคนได้แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว NIH ได้ตีพิมพ์ใน Federal Register เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมาถึงแนวทางอย่างละเอียด ยกตัวอย่างเช่น เซลล์ตัวอ่อนต้องมาจากการแช่แข็งเซลล์ตัวอ่อน ซึ่งเป็นผลเกินมาจากการผสมเทียมจากคลินิก เอ็กซอน และผู้บริจาค (donors) ต้องมีการแสดงความยินยอมโดยเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นต้น อย่างไรก็ตามสมาชิกรัฐสภาสหรัฐ ฝ่ายอนุรักษ์และกลุ่มต่อต้านการทำแท้งได้วิจารณ์แนวทางดังกล่าวว่าการสนับสนุนการวิจัยในเรื่องนี้จะนำไปสู่การผลิตตัวอ่อนมนุษย์ (human embryo) เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยเท่านั้น แนวทางที่เสนอสามารถดูได้ที่ Website <<http://www.nih.gov/news/stemcell/draftguidelines.htm>>

NIH GUIDELINES FOR RESEARCH ON EMBRYONIC STEM CELLS

Deriving new cell lines from embryos	Prohibited
Research on privately derived cell lines from embryos	Allowed
Deriving new cell lines from fetal tissue	Prohibited
Research on cell lines from fetal tissue	Allowed
Research that would use stem cells to create a human embryo	Prohibited
Combining human stem cells with animal embryos	Prohibited
Use of stem cells for reproductive cloning	Prohibited
Research on stem cells derived from embryos created for research purposes	Prohibited

(ที่มา : Science, Volume 286, No. 5447, December 10, 1999) สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ธันวาคม 2542



งานอันมีลิขสิทธิ์

นรินทร์ พสฺนธรรม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนสนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ลิขสิทธิ์คืออะไร

ลิขสิทธิ์เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น

เจ้าของผลงานทางลิขสิทธิ์จึงควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินประเภทที่สามารถซื้อขายหรือโอนสิทธิกันได้ ทั้งทางมรดกหรือโดยวิธีอื่นๆ การโอนสิทธิควรที่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำเป็นสัญญาให้ชัดเจน จะโอนสิทธิทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้

ลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

1. เจตนารมณ์ของกฎหมาย

ประเทศไทยมีการคุ้มครองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์มานานกว่า 100 ปี โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรก คือประกาศของพระสมุทวชิรญาณ ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้มีการปรับปรุง แก้ไข

ตลอดจนยกร่างใหม่หลายครั้ง จนฉบับสุดท้ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยมีเจตนารมณ์ที่สำคัญ ดังนี้

1.1 เพื่อคุ้มครองผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมและศิลปกรรม ซึ่งได้ใช้สติปัญญา แรงงานและเวลา ตลอด

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการสร้างสรรค์งาน

2. ประเภทของงานที่ได้รับความคุ้มครอง

งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยได้กำหนดให้

ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ไว้รวม 9 ประเภท ดังนี้

2.1 งานวรรณกรรม (Literary works)

“วรรณกรรม” หมายความว่างานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือจุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนาสุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

กฎหมายได้กำหนดให้ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ลักษณะงานชิ้นหนึ่งของวรรณกรรมด้วย ซึ่งมีความหมายดังนี้

“โปรแกรมคอมพิวเตอร์”

หมายความว่า คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือเพื่อให้ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด

2.2 งานนาฏกรรม (Dramatic works)



จนความวิริยะอุตสาหะสร้างสรรค์งานขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นในสังคม

1.2 เพื่อเป็นเครื่องตอบแทนให้ผู้สร้างสรรค์เกิดกำลังใจในการที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์งานให้มากขึ้น ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวิทยาการ

1.3 เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับ

“นาฏกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีไปด้วย

การรำ การเต้น หรือการแสดงต่างๆ แม้จะมีได้มีการบันทึกไว้ แต่หากมีการแสดงออกมาให้ปรากฏซึ่งความคิดสร้างสรรค์จากสมองของบุคคลใดก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที

2.3 งานศิลปกรรม (Artistic works)

“ศิลปกรรม” หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

1. งานจิตรกรรม (Work of painting and drawing) ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง เช่น การวาดเขียน (drawings) หรืออาภรณ์หรือวาดภาพด้วยสิ่งอื่นๆ นอกจากสี

2. งานประติมากรรม (Work of sculpture) ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ เป็นงานศิลปกรรมในรูปแบบสามมิติ เช่น งานแกะสลักงานปั้น งานหล่อรูปเหมือน เป็นต้น

3. งานภาพพิมพ์ (Work of lithography) ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย งานภาพพิมพ์นี้เป็นงานในลักษณะสองมิติ เช่นเดียวกับจิตรกรรม แต่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการพิมพ์และงานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์นี้ ควร



เป็นการวาดหรือเขียนลงบนวัสดุจากการพิมพ์ด้วยหมึก

4. งานสถาปัตยกรรม (Work of architecture) ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่งภายในหรือภายนอกตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างด้วย

5. งานภาพถ่าย (Photographic work) ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยใช้แสงผ่านเลนส์ไปยังฟิล์มหรือกระดาษ และล้างด้วยน้ำยาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใดๆ อันทำให้เกิดภาพขึ้นหรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือ หรือวิธีการอย่างอื่น งานภาพถ่ายนี้ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ถูกถ่ายภาพว่าจะเป็นสิ่งใดไม่ว่ารูปคน ภูมิ

ประเทศ เหตุการณ์ใดๆ ที่รวมถึงวิธีการแบบใหม่ๆ ไว้ด้วย เช่น การถ่ายภาพโดยใช้กล้องโพลาไรซ์ ซึ่งมีกระดาดรูปในตัวและไม่ต้องผ่านกรรมวิธีในการล้างภาพตามขั้นตอนทั่วไป โดยถือว่าการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น

6. งานภาพประกอบ แผนที่โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติ อันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ งานเหล่านี้ได้แก่ การสร้างสรรค์ในลักษณะต่างๆ คือ

6.1 งานภาพประกอบ เช่น การวาดภาพประกอบ อธิบายในหนังสือ นิตยสารเรื่องต่างๆ เป็นต้น

6.2 งานแผนที่ เช่น แผนที่โลก ทวีป หรือประเทศ เป็นต้น

6.3 งานโครงสร้าง เช่น ภาพโครงสร้างของรถยนต์ เครื่องบิน กระสวยอวกาศ เป็นต้น


6.4 งานภาพร่าง เช่น ภาพลายเส้นหรือภาพร่างอย่างหยาบๆเพี้ยนๆ เป็นต้น

6.5 งานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ เช่น แผนที่รูปหุ่นแสดงที่ตั้งของภูเขาแม่น้ำ

6.6 งานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น การออกแบบลักษณะของสื่อนำไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า เซมิคอนดักเตอร์ (semi conductor chip) ซึ่ง

ชื่นชม คุณค่าในตัวเองนั้น และหากเป็นการจัดทำเพื่อประโยชน์ทางการค้าแล้ว ก็เรียกกันโดยทั่วไปว่า “พาณิชย์ศิลป์” อันแตกต่างจาก “วิจิตรศิลป์” ส่วนการจัดทำอันถือว่าเป็นงานศิลปะประยุกต์อาจเป็นการนำงานศิลปะในลักษณะต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมารวมกันก็ได้ เช่น การนำงานประติมากรรมมาตกแต่งบ้าน หรือสวน การนำรูปภาพหรือภาพไม้มาทำเป็นภาพของกระดาษปิดผนังภายในอาคาร (wall paper) หรือการออกแบบย่อขนาดเล็กของสะพานแห่งลอนดอนติดกับพวงกุญแจ เป็นต้น

โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างไร อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก โดยเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบนั้นด้วย (ถ้ามี) กฎหมายกำหนดให้งานโสตทัศนวัสดุ หมายถึง เฉพาะแต่งงานอันเกิดจากการบันทึกภาพ และหมายความรวมถึงเสียงประกอบลำดับของภาพนั้นด้วย ดังนั้น งานโสตทัศนวัสดุจึงเป็นงานสร้างสรรค์ที่ปรากฏขึ้นด้วยการเห็นหรือทั้งเห็นและได้ยิน ลำดับภาพหรือทั้งภาพและเสียง ซึ่งบันทึกไว้ในสิ่งที่สามารถนำออกเล่นซ้ำได้โดยเครื่องกล หรือ



มีแนวความเห็นที่สามารถตีความให้ งานการออกแบบดังกล่าวอยู่ภายใต้ความหมายของงานลักษณะนี้

7. งานศิลปะประยุกต์ (Work of applied arts) ได้แก่ งานที่นำเอาจากข้อ (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวเอง ดังกล่าวนั้น เช่น นำไปใช้สอย นำไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า งานดังกล่าวนี้เป็นการนำเอางานศิลปะมาจัดทำเพื่อการใช้สอย ไม่ใช่เพื่อการ

2.4 งานดนตรีกรรม (Musical works)

“ดนตรีกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว

2.5 งานโสตทัศนวัสดุ (Audio-visual works)

“โสตทัศนวัสดุ” หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพ

เครื่องอำนวยความสะดวกใดๆ เช่น เทปวิดีโอ (video tape) แผ่นเลเซอร์ดิสก์ (laser disc) เป็นต้น

2.6 งานภาพยนตร์ (Cinematographic works)

“ภาพยนตร์” หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยลำดับของภาพ ซึ่งสามารถนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงในวัสดุอื่น เพื่อนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย (ถ้ามี) ภาพยนตร์นั้นเป็นโสตทัศนวัสดุประเภทหนึ่ง

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันได้เพิ่มเติมข้อความให้นิยามของภาพยนตร์ให้มีความชัดเจนขึ้น โดยการกำหนดให้ลำดับของภาพนั้นสามารถนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่นใด เพื่อนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ ภาพนิ่งอันเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์นำมาผ่านกรรมวิธีเป็นภาพในลักษณะภาพถ่าย ย่อมไม่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ ไม่สามารถนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ และได้รับความคุ้มครองสิทธิในประเภทงานศิลปกรรมเกี่ยวกับงานภาพถ่าย นอกจากนี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ยังกำหนดให้งานภาพยนตร์มีความหมาย รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วยเช่นเดียวกับงานโสตทัศนวัสดุ

2.7 งานสิ่งบันทึกเสียง (Sound recording works)

“สิ่งบันทึกเสียง” หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใดๆ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็น

สำหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้ไม่ให้ความหมายรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น ๆ สิ่งบันทึกเสียงจึงเป็นงานซึ่งเกิดจากการบันทึกเสียงต่างๆ อันได้แก่ เสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นๆ เช่น เสียงร้องของสัตว์ เสียงฟ้าร้อง เสียงพายุ เป็นต้น โดยบันทึกเสียงเหล่านั้นลงในวัสดุใดๆ ก็ตาม อันสามารถนำมาเล่นซ้ำได้โดยเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น เช่น เทปคาสเสต (cassette tape) แผ่นคอมแพคดิสก์ (compact disc) จานเสียง (gramophone record) เป็นต้น

2.8 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (Sound and video broadcasting works)

“งานแพร่เสียงแพร่ภาพ” หมายความว่า งานที่นำออกสู่สาธารณชน โดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เป็นการนำเอางานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ อันได้รับ

ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นแพร่เสียงทางวิทยุ หรือการแพร่เสียงและภาพหรือเฉพาะแต่เพียงภาพทางโทรทัศน์ หรือโดยวิธีการอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน เช่น เคเบิลทีวี หรือสัญญาณผ่านดาวเทียม เป็นต้น

2.9 งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ (Production in the literary, scientific and artistic domain)

กฎหมายได้บัญญัติไว้กว้างๆ โดยมีเหตุผล 2 ประการคือ

ประการแรก ในอนาคตอาจมีงานสร้างสรรค์บางอย่าง ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มของมนุษย์ที่สมควรได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ แม้ว่าจะไม่อาจจัดเข้าไปในงานประเภทใดประเภทหนึ่งโดยชัดแจ้งได้

ประการที่สอง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในอนุสัญญาเบอร์นที่ ให้คุ้มครองงานลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ ในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะไม่ว่าจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบใด



ผลการทดสอบคุณสมบัติ ทางรังสีของ TLD แบบผลึกเดี่ยว

บทคัดย่อ

ได้ทดลองศึกษาคุณสมบัติทางรังสีของหัววัดรังสี TLD ชนิด LiF (Mg, Cu) ที่เตรียมขึ้นในลักษณะผลึกเดี่ยวด้วยเทคนิคการปลูกผลึกเดี่ยวแบบ Bridge man - Stockbager Technique พบว่าการปลูกผลึกโดยใช้ความเข้มข้นของแมกนีเซียม 1.86 โมลเปอร์เซ็นต์ คอปเปอร์ 0.06 โมลเปอร์เซ็นต์ และนำผลึกไปฉายรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา จะให้แสงออกมาโดยมี glow curve ที่มีอุณหภูมิของพีคหลักคงที่ ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส มีความสัมพันธ์อย่างเป็นเชิงเส้นระหว่างความเข้มแสงกับปริมาณรังสีที่ผลึกได้รับ ในช่วง 101 ถึง 103 เซนติเกรย์ ดี มีความไวในการตอบสนองต่อรังสีเอกซ์ สูงกว่า TLD ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศ (TLD 100) ประมาณ 2 เท่า ไม่พบการจางหายไปของปริมาณแสงเมื่อนำผลึกที่ฉายรังสีเก็บไว้เป็นเวลา 1 เดือน

บทนำ

เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ โดสิมิเตอร์ (Thermoluminescence Dosimeter ; TLD) คือเครื่องวัดรังสีที่นิยมใช้ในการแพทย์ในงานรังสีวินิจฉัยโรค และรังสีรักษาโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังเหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคลได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น มีขนาดเล็กสะดวกในการพกพา มีความถูกต้องและเที่ยงตรงสูง TLD มีหลายชนิด การจะนำ TLD แต่ละชนิดไปใช้งานได้นั้นต้องมีการเลือกชนิดของ TLD ให้เหมาะสมกับ

จินตนา เหล่าไพบูลย์ และ เรวดีนทร์ เหล่าไพบูลย์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานงบประมาณแผ่นดิน

งานที่จะใช้ โดยดูได้จากผลการทดสอบคุณสมบัติของ TLD แต่ละชนิดนั้น

ปัจจุบันประเทศไทยยังต้องสั่งซื้อหัววัดรังสี TLD ชนิด LiF จากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงมาก และ LiF ที่สั่งซื้อเข้ามาจะมีลักษณะเป็นผงผลึกหรือเป็นผงผลึกที่ขึ้นรูป ซึ่งมีข้อเสียคือ มีลักษณะขุ่นมัว เมื่อ TLD ได้รับรังสีแล้วนำไปผ่านความร้อนแสงที่เปล่งออกมาจาก TLD จะทะลุผ่านไม่หมด เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาของการดูดกลืนแสงด้วยตัวเองของ TLD จึงจะเตรียมผลึกของ LiF ขึ้นเป็นผลึกเดี่ยวซึ่งมีคุณสมบัติโปร่งแสง และจะมีคุณสมบัติการเรืองแสงสูงขึ้น


ปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังคงใช้ฟิล์มวัดรังสีประจำบุคคลเพื่อเป็นตัวตรวจสอบปริมาณรังสีระหว่างที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ เป็นการเฝ้าระวังอันตรายจากรังสีที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงานได้ ในประเทศที่สามารถผลิต TLD ขึ้นใช้ได้เองจะมีการนำ TLD มาใช้แทนฟิล์มวัดรังสีประจำบุคคล เพราะการวัดรังสีโดยใช้ TLD มีความถูกต้องและเที่ยงตรงกว่าฟิล์ม นอกจากนี้ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ ในประเทศไทยที่มีสถาบัน การศึกษา เช่น โรงพยาบาลรา-

มาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการนำเข้ามาใช้ในงานวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็ง เช่น ใช้ศึกษาผลของรังสีที่มีต่อคนไข้ โดยใช้ TLD ในการศึกษา เพราะมีขนาดเล็กติดตัวคนไข้ได้สะดวกและสามารถที่จะสอดเข้าไปในอวัยวะภายในร่างกายได้แต่อุปกรณ์ที่เกิดกับโรงพยาบาลต่างๆ คือ TLD มีราคาแพงงานวิจัยแต่ละเรื่องต้องใช้ TLD ไม่ต่ำกว่า 100 เม็ด นักศึกษาที่ทำงานวิจัยส่วนมากมีปัญหาเรื่องทุนวิจัย จึงทำให้งานวิจัยไม่เป็นที่แพร่หลาย

เครื่องวัดรังสี TLD ชนิด LiF ที่ผลิตขึ้นนี้ ยังสามารถใช้วัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งในอนาคตถ้าประเทศไทยมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เครื่องวัดรังสีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หรือในปัจจุบัน หากประเทศเพื่อนบ้านเกิดมีอุบัติเหตุทางรังสีที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีปลิวมาถึงเมืองไทยก็สามารถนำ TLD ที่ผลิตขึ้นได้เองนี้ ไปทิ้งไว้ในสิ่งแวดล้อมแล้วนำมาประเมินค่าก็จะทราบปริมาณรังสีของฝุ่นกัมมันตรังสีที่ปลิวมาถึงประเทศไทยได้ ซึ่งสะดวกในการตรวจวัดปริมาณรังสี

ศึกษาคุณสมบัติการให้ TL ของผลึกเดี่ยว LiF (Mg,Cu) ที่ผลิตได้จากรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา เพื่อใช้เป็น TLD สำหรับวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา โดยศึกษาลักษณะของ glow curve , sensitivity, linearity และ fading

1. เครื่องซังสารชนิดละเอียด
2. Annealing furnace (0-1200 องศาเซลเซียส)
3. TLD ที่ได้จากการปลูกผลึกเดี่ยว ของ lithium fluoride (LiF) 99.5% บริษัท Fluka ผสมกับ magnesium fluoride (MgF_2) 97% บริษัท Fluka และ cupric fluoride dihydrate ($\text{CuF}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 97% บริษัท Fluka
4. ถาดหลุมโลหะทนความร้อนสำหรับใส่ TLD เพื่อ anneal
5. ถาดหลุมพลาสติก สำหรับใส่ TLD เพื่อฉายรังสี
6. เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ “Diagnostic X-ray” 40 - 90 กิโลโวลต์พีค Model 46 - 19706361 ของบริษัท GENDEX CORPORATION
7. เครื่องกำเนิดรังสีแกมมาจากโคบอลต์-60
8. เครื่องอ่าน TLD ของบริษัท Harshaw/Bicron Model 3500




รูปแสดงเครื่อง X-ray ที่ใช้สำหรับทดสอบคุณสมบัติทางรังสี



รูปแสดงเครื่องฉายรังสีแกมมาที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติทางรังสี



รูปแสดงเครื่องอ่านปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจาก TLD







รูปแสดงผลึกที่ตัดเพื่อนำไปใช้เป็นหัววัดรังสีวิธีดำเนินการวิจัย


1. ปลูกผลึกเดี่ยวของสาร ลิเทียมฟลูออไรด์ ผสมกับสารโด๊ปสองชนิด คือ แมกนีเซียม และคอปเปอร์ ด้วยเทคนิคบริดจ์แมน-สต็อกบาเจอร์
2. ตัดผลึกที่ได้เป็นเม็ดเพื่อใช้เป็นหัววัดรังสี
3. นำผลึกไป anneal ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง ต่อด้วย 100 องศา 2 ชั่วโมง
4. ทดสอบคุณสมบัติทางรังสีของผลึก
5. สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงาน

1) ผลการทดสอบ glow curve

จากการนำหัววัดรังสี TLD ที่ได้ ไปฉายรังสีแกมมาที่พลังงานของโฟตอน 1025 MeV ด้วยปริมาณรังสีต่างๆ ตั้งแต่ 10^1 cGy ถึง 10^4 cGy พบว่า ได้ glow curve ลักษณะดังรูปที่ 1 โดยพบว่า มีพีคหลักคงที่ ที่อุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียส



รูปที่ 1. แสดง glow curve ที่ได้จากการนำหัววัดรังสี LiF ที่เตรียมได้ไปฉายรังสีแกมมาจาก โคบอลต์-60 ที่ปริมาณรังสีต่างๆ กัน



2) ผลการศึกษา linearity

จากการนำเม็ดผลึกไปฉายรังสีที่ปริมาณรังสีต่างๆ กัน จะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีกับสัญญาณแสงได้กราฟดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2. แสดง linearity ของหัววัดรังสีที่เตรียมได้ เมื่อนำไปฉายรังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 ที่ปริมาณรังสี $10^1 - 10^3$ cGy

3) ผลการศึกษาความไว (sensitivity)

จากการนำหัววัดรังสีที่เตรียมได้และหัววัดรังสีที่ผลิตจากต่างประเทศ (TLD 100) ไปฉายรังสีเอกซ์ ที่พลังงาน 70 kVp ด้วยปริมาณรังสี 16 mR นำมาอ่านค่าสัญญาณแสงหลังฉายรังสีเป็นเวลา 5 นาที ได้ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบ sensitivity ของหัววัดรังสีที่เตรียมได้โดย Jintana (LiF single crystal) กับหัววัดรังสีที่ผลิตโดยบริษัท Harshaw (LiF poly crystal : TLD 100) เมื่อนำไปฉายรังสีเอกซ์

แหล่งผลิต TLD	สัญญาณแสง (°C)						X ± SD n=6	Relative response
เตรียมขึ้นเอง	44.85	44.16	44.37	44.74	44.28	46.82	44.87±0.992	2
Harshaw**	22.76	21.57	21.08	24.85	23.36	20.33	22.33±1.657	1

* น้ำหนัก/1 หัววัด = 10 mg

** น้ำหนัก/1 หัววัด = 40 mg


4) ผลการศึกษา fading

จากการนำเม็ดผลึกไปฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 100 cGY นำมาอ่านค่าสัญญาณแสงที่เวลาต่างๆ กัน ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัญญาณแสงจากหัววัดรังสี ที่นำไปฉายรังสีแกมมา ด้วยปริมาณรังสี 100 cGY แล้วนำมาอ่านค่าสัญญาณแสงที่เวลาต่างๆ กัน

เวลาหลังฉายรังสี (วัน)	Corrected reading (°C)			X ± SD
1	2.775	2.933	2.916	2.875 ± 0.087
15	2.960	2.841	2.851	2.884 ± 0.066
30	2.946	2.947	2.966	2.953 ± 0.011

* Corrected reading = สัญญาณแสง x ECF x ค่าแก้เนื่องจาก stability ของเครื่องอ่าน TLD



จากข้อมูลในตารางที่ 2 นำมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณแสงกับเวลาหลังฉายรังสี ดังแสดงในรูป

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณแสงกับเวลาหลังฉายรังสีสรุปผลการวิจัย

1. ลักษณะ glow curve ที่ได้เป็นลักษณะที่ดีมาก คือ มีตำแหน่งอุณหภูมิของพีคหลักคงที่ และมีพีคเดียวที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ไม่ปรากฏพีคแรกใดๆ ที่เกิดจากอิเล็กตรอนไปค้างอยู่ใน trap ตื้นๆ แม้จะอ่านค่าสัญญาณแสงหลังฉายรังสีในวันเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อดีตรงที่ในการนำ LTD ชนิดนี้ไปใช้งานนั้น ถ้าเป็นงานที่ต้องการทราบผลเร่งด่วน ก็สามารถนำเข้าเครื่องอ่านได้เลย ไม่ต้องใช้เทคนิค prereading anneal เพื่อไล่อิเล็กตรอนที่อยู่ใน trap ตื้นๆ ลงมาในแถบพลังงาน วาเลนซ์ก่อน เพราะพีคที่มีอุณหภูมิต่ำๆ จะเป็นพีคที่ไม่มีความคงที่ สามารถกำจัดได้โดยการนำไป prereading anneal อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที หรือนำ TLD ที่ฉายรังสีแล้วมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้พีคแรกของ glow curve ลดลงแต่พีคหลักยังคงที่ ลักษณะ glow curve ของ TLD-100 จะปรากฏ 2 พีค คือ มีพีคแรกและพีคหลัก glow curve ที่ได้จากหัววัดที่เตรียมได้และนำไปฉายรังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา มีลักษณะเหมือนกัน แสดงว่าผลึกที่ได้มีความลึกของ trap คงที่

2. มีความเป็นเชิงเส้น (linearity) ระหว่างปริมาณรังสี และสัญญาณแสง ในช่วงปริมาณรังสี absorb dose ระหว่าง $10^1 - 10^3$ cGY ดี

3. มีความไวในการตอบสนองต่อรังสี (sensitivity) เอกซ์ ที่ปริมาณรังสี 16 mR สูงกว่า TLD ชนิด LiF (TLD 100) ของบริษัท Harshaw ประมาณ 2 เท่า

4. จากการศึกษาค่า fading ไม่พบการจางหายไปของปริมาณแสงในเวลา 1 เดือน

จากคุณสมบัติที่ได้ทดสอบดังกล่าวมาแล้วข้างต้น นับว่า TLD ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว ที่เตรียมขึ้นได้เองนี้ เป็นหัววัดรังสีที่มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล เพื่อเฝ้าระวังอันตรายจากรังสีได้เป็นอย่างดี

- Burke, K. and Sutton, D. 1997. Optimization and deconvolution of lithium fluoride TLD-100 in diagnostic radiology. *British Journal of Radiology*. 70 : 261-271.
- Cameron, J. R., Zimmerman, D., Kenney, G., Buch, R., Bland, R. and Grant, R. 1964. Thermoluminescent Radiation Dosimetry Utilizing LiF. Health Physics, Pergamon Press. vol 10. p 25-29.
- Driscoll, C.M.H., McWhan, A.F., Hagant, J.B.O. and Dodson, J. 1986. The characteristics of new LiF preparations and sensitised LiF. *Radiation Protection Dosimetry*. 17 : 367-371.
- Gangang, C. 1989. The influence of non-emission competitive centres (NECC) on γ -ray dose response of LiF-TLD. *Appl. Phys.* 22 : 812-816.
- Hirning, C.R. 1992 Detection and Determination Limits for Thermoluminescence Dosimetry. Health Physics Society., p.223-227.
- Johnson, T.L., Robinson, R.L. and Luersen, R.B. 1977. Fading of LiF-Teflon Dosimeters Used in Identification Badges. Health Physics. Pergamon Press. vol. 1. p.31-32.
- Laudise, R.A. 1970. The Growth of Single Crystals. Prentice Hall, New Jersey.
- Mahajna, S., Yossian, and D. Horowitz, Y.S. 1995. Mechanisms in the Thermoluminescence of LiF-Mg, Cu, P. *Radiation Effects and Defects in Solids*. 136 : 1091-1095.
- Nakajima, T. and Watanabe, S. 1976. Influence of Heating Conditions on the Thermoluminescence Sensitivity of TLD-LiF Phosphors. *International Journal of Applied Radiation and Isotopes*. 27 : 113-121.





ข้อมูลฉบับไว
สะดวกทันใจผู้ใช้ไฟฟ้า



ทุกคำถามเรื่องไฟฟ้า มีคำตอบ
1130 Call Center
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า
ตลอด **24** ชั่วโมง



การไฟฟ้านครหลวง

ได้รับความอนุเคราะห์

จาก



มูลนิธิคุณหญิงพรพรรณชีน รื่นศิริ

ขอสนับสนุน วารสาร

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เพื่อการวิจัย และพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์



เพิ่มแสงไม่เพิ่มหลอด KING LIGHT LAMP HOLDER


โคมไฟ ช่วยประหยัดไฟทันที 50%

- ประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน • ติดตั้งง่าย
- ปรับทิศทางแสงได้ • ป้องกันฝุ่น • ปลอดภัย

รับประกันให้แสงเทียบเป็น 2 เท่าของหลอด
ฟลูออโรเรสเซนต์ทั่วไป

- ▼ ใช้กับขั้ว-ราง-บัลลาสต์ หลอดส่องสว่าง
ฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป
- ▼ ใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ของเดิมได้ทันที
ติดตั้งในอาคารออฟฟิศ
- ▼ บ้านที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาเก็ต
โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท พัฒนาการพลังงาน
(ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัท พัฒนาการพลังงาน (ประเทศไทย) จำกัด
ENERGY DEVELOPMENT THAILAND CO.,LTD.
โทร. 9197626, 5182610 โทรสาร 5182610



กฟผ.



ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า



มอก.23-2521



อุตสาหกรรม



ISO 9002


โปรแกรมบริการนำเข้ากับกรมศุลกากร ด้วยระบบ EDI

EDI KIT for Importer




โปรแกรมบริการส่งออกกับกรมศุลกากร ด้วยระบบ EDI

EDI KIT for Exporter



82B Kit Lite

โปรแกรมรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างคู่ค้าทั่วไป



Call
:201-3772-9

โปรแกรมโอนเงิน ผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์



REDI-to-Wear



1. EDI KIT for Importer
2. EDI KIT for Exporter
3. 82B KIT Lite
4. REDI-to-Wear
5. F-EDI

โปรแกรมรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างคู่ค้าด้านส่งออกและนำเข้า

<http://www.loxinfo.co.th>

LOXLEY INFORMATION COMPANY LIMITED

เลขที่ 475 ชั้น 11 อาคารสิริกัญญ์ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 201-3772-9 โทรสาร : 201-3770

LOXINFO



อภินันทนาการ จากบริษัท เวสโก้เคมี ประเทศไทย จำกัด

เลขที่ 9/40 หมู่ 7 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 5399003, 9324993-4 แฟกซ์ 5387603 E-Mail : wesco@loxinfo.co.th

ผู้ส่งนำเข้าและจัดจำหน่าย

โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต (MKP 0-52-34)

โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP 12-61-0)

โปแตสเซียมไนเตรท จี-เกรด (KNO_3 G-Grade 13.5-0-46.2)

ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดนี้ บริษัท เวสโก้เคมี ประเทศไทย จำกัด

เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ของ บริษัท ไฮฟา เคมีคอล จำกัด ประเทศอิสราเอล

ยูเรีย ไบยูเรตต่ำ และส่งนำเข้า (LOW BIURET UREA 46-0-0)

โปแตสเซียมซัลเฟตชนิดพ่นทางใบ (K_2SO_4 0-0-50) ช่วยให้อรสมหวานและเพิ่มน้ำหนัก

ขอเชิญ

“วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ด้วยความปรารถนาดี

จาก

GLOBAL SOLUTIONS (1997) CO., LTD.

Thailand Note Book Center
Sales & Service

สมควร สุขะการผดุง

Somkuan Sukhakarnphadoong

Managing Director

604/3 Room No. 408 - 409

Pantip Plaza Bldg.

Petchburi Rd. Rajatewee

Bangkok 10400 Thailand

604/3 ห้อง 408 - 409

อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า

ถ. เพชรบุรี ราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

Tel : 2550476-7, 2523416 (2501555-9, 2525885 Ext. 4408-9), Fax : 2553637

E-mail : somkuan@ksc.th.com



ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เทอร์มาฟлекс อินซูเลชั่น เอเชีย จำกัด

สำนักงานขาย กรุงเทพฯ

180 พรรณวดีเพลส ลาดพร้าว 62 (ช.เพ็งสุข) กรุงเทพฯ 10310

โทร. (02) 933-6370-3 FAX : (02) 539-6463

โรงงาน

10 หมู่ 2 หองปรีอ บางละมุง ชลบุรี 20260


โทร. (038) 734-431-3 FAX : (038) 734-420, 249-003

E-mail : tflexbkk@loxinfo.co.th

"เทอร์มาฟлекс" ผู้นำด้านฉนวน ที่ไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม


เทอร์มาฟлексเป็นฉนวนที่ผลิตจาก POLYETHYLENE ด้วยเทคโนโลยี การผลิตจากยุโรป ช่วยประหยัดพลังงานในงานระบบความร้อน/ความเย็น และรักษาสภาวะแวดล้อมจากระบบการผลิตที่ยกเลิกใช้สาร (H) CFC เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย

SAVING ENERGY MATERIALS CERAMIC FIBER




ISOLITE

INSULATING BRICK




CASTING CORDIERITE KILN FURNITURE
POT MILL, PORCELAIN BALL & LINING
[LOCAL MADE]





บริษัท เซรามิกส์ อาร์ อัส จำกัด
CERAMICS R US CORP., LTD.

54/455 หมู่ 5 ต.พัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel. (02) 321-9155-7 Fax. (02) 321-7390



EML

E.M.L. TRADING CO., LTD.



**185 Soi Ladprao 64 Ladprao Road
Wangthonglang Wangthonglang Bangkok 10310
TEL. 530-6784, 530-0340 FAX.(662) 530-1964
E-mail address: emltrade@yahoo.com**



มูมอินเทอร์เน็ต

ในยุค IT ปี 2000 ใครไม่รู้จักอินเทอร์เน็ต หรือไม่มี e-mail address

ดูจะกลายเป็นคนล้าสมัยไป



ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารสามารถทำได้รวดเร็วทันใจ เพียงขอแค่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็มและสายโทรศัพท์ หรือปัจจุบันโทรศัพท์มือถือบางรุ่นก็มีศักยภาพทัดเทียมเพียงพอ นอกจากอุปกรณ์ที่เราได้กล่าวมาข้างต้น เราจำเป็นต้องเป็นสมาชิกของศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISPs (Internet Service Providers) หรือ OSPs (Online Service Providers) ซึ่งเปรียบได้กับตัวกลางที่จะนำเราผ่านเข้าไปสู่โลกการสื่อสาร โดยเราหมุนโมเด็มต่อไปยังเบอร์ของศูนย์บริการ ยิ่งในปัจจุบันบ้านเรามีการแข่งขันระหว่างศูนย์บริการต่างๆ สูง ทำให้ศูนย์บริการมีการปรับลดค่าบริการให้ถูกลงกว่าเดิม เช่น บริษัท จัสมินอินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอยู่ระหว่างชั่วโมงละ 13-18 บาท โดยสามารถสอบถามที่โทร. 502-3700 หรือเข้าไปที่ www.ji-net.com, บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด เสนอราคาอยู่ระหว่างชั่วโมงละ 17-

27 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.inet.co.th, หรือบริษัท cs internet เสนอราคาอยู่ระหว่างชั่วโมงละ 12-20 บาท ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.cscoms.com, เป็นต้น

ในครั้งนี้อาจจะกล่าวถึง e-mail ก่อน โดยปกติแล้วถ้ากล่าวถึงบริการการรับ-ส่ง e-mail บริการในส่วนนี้จะมียูสสองลักษณะ คือ

1. Free e-mail คือ บริการที่สามารถเรียกดูรับ-ส่ง e-mail ได้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดว่าต้องเป็นสมาชิกของศูนย์บริการรายใดรายหนึ่งตลอด เปรียบเสมือนเป็น e-mail address ถาวร โดยผู้ใช้งานจะต้องมี browser เช่น Netscape หรือ Internet Explorer เพื่อใช้ในการเช็ค รับ-ส่ง e-mail ตัวอย่างของ Free e-mail service เช่น Hotmail, Yahoo หรือ Rocket Mail เป็นต้น

2. E-mail ที่ได้มาเมื่อสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์บริการ ซึ่ง e-mail

address ประเภทนี้จะหมดอายุเมื่อเลิกเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตามในบางบริษัทจะมีให้เลือกที่ไม่ประสงค์จะได้ในส่วนนี้เพื่อลดอัตราการขอใช้บริการ โดยผู้ใช้งานต้องมีโปรแกรมเรียกดูรับ-ส่ง e-mail เช่น Eudora หรือ Outlook Express รวมไปถึงใช้ browser ในการตรวจรับ-ส่งก็ได้

ศักยภาพของอินเทอร์เน็ตสามารถย่อโลกให้แคบเข้า โดยเราสามารถสืบค้นข้อมูล ได้รับความรู้ ชื่อ-ขายสินค้าที่เรียกว่า e-commerce (electronic commerce) หรือแม้กระทั่งสร้างมิตรภาพใหม่ ทั้งในรูปแบบของเพื่อน คนรัก รวมไปถึงศัตรูได้โดยที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน อย่างไรก็ตามสังคมนี้เปรียบได้กับดาบสองคม นอกจากให้คุณแล้วก็ยังให้โทษได้เช่นกัน บ่อยครั้งที่เราได้ยินข่าวการนำภาพดารามาตัดต่อ การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล การขโมยข่าวสาร การสอนวิธีประกอบอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ การล่อลวงเด็ก หรือแม้แต่การเกิดโรคจิตอินเทอร์เน็ตในหมู่ของเด็กวัยรุ่น

ในครั้งต่อไปเราจะนำเสนอถึงชนิดของ Protocol (กฎเกณฑ์พิเศษสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม) และการสืบค้นข้อมูล ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

อลิสรา จินดาวัฒนะ



ฟรี ! แผนที่โลก

ที่ความละเอียด

500 เมตร

บนอินเทอร์เน็ต

ณ วันที่บริษัท ATDI ได้นำเสนอ
บริการอินเทอร์เน็ตชนิดใหม่ที่สามารถ
เข้าสู่เว็บไซต์ของ ATDI (www.atdi.com)
สำหรับผู้ส่งกระจายเสียงวิทยุ โดยที่ผู้ส่งกระจายเสียงวิทยุ
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนที่ได้ทั่วทุกมุมโลกโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นแผนที่
หรือโมเดลแผนที่ดิจิทัล 3 มิติได้ฟรี
จากเว็บไซต์ดังกล่าว

ปัจจุบันนี้ อุปกรณ์สำหรับวาง
แผนเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สาย
ทั้งหลายจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภูมิประเทศ ดังนั้น การสร้างแบบ
จำลองของที่ดินในเชิง 3 มิติ จะทำให้
ได้ข้อมูลใกล้เคียงกับความจริงมาก
ที่สุดและเพื่อให้การจำลองแบบมีคุณ
ภาพสูงสุด

จากประสบการณ์ในการทำงาน
ในด้านนี้พบว่ามีความหลากหลายใน
เรื่องของความละเอียดของแผนที่ ซึ่ง
ความต้องการความละเอียดอยู่ใน
ระหว่าง 1 ถึง 500 เมตร ด้วยเหตุ
ผลสำคัญ 2 ประการคือ

1. เทคโนโลยีบางอย่างต้องการ
ความแม่นยำมากกว่าเทคโนโลยีอื่น
เทคนิคในการส่งสัญญาณจากเครือ
ข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งรวมถึง
พื้นที่ที่การส่งสัญญาณครอบคลุม
ตลอดจนจำนวนข้อมูลที่ส่งต่อมีความ
แตกต่างกันอย่างมาก และการจำลอง

แบบเครือข่ายก็แสดงให้เห็นว่าต้องการ
ความถูกต้องในการทำแผนที่ไม่มากนัก
น้อย

2. การที่จะได้ข้อมูลที่มีความ
ละเอียดสูงจะเสียค่าใช้จ่ายมากและ
สำหรับผู้ส่งกระจายเสียงวิทยุในเรื่อง
ของการลงทุนดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
ณ สภาวะทางเศรษฐกิจเช่นใน
ปัจจุบันนี้ ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งกระจาย
เสียงวิทยุในท้องถิ่นก็ไม่มีกำลังพอที่
จะลงทุนในสิ่งที่จำเป็นได้ และผู้ส่ง
กระจายเสียงวิทยุรายใหญ่ก็ไม่สามารถ
ที่จะซื้อวิธีการทำแผนที่
สำหรับโครงการทั้งหมดได้ทั่วโลก



ด้วยเหตุนี้ผู้ส่งกระจายเสียงวิทยุ
ส่วนใหญ่ จึงเลือกใช้ความละเอียดใน
ระดับ 500 เมตร เพื่อนำมาใช้ในการ
ศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากความละเอียด
ในระดับนี้มีหมดทั่วโลก อีกทั้งราคา
ก็ไม่สูงจนเกินไป แต่จนกระทั่งทุกวันนี้
ข้อมูลการทำแผนที่ดังกล่าวยังไม่ได้
อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
และยังมีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

นับเป็นครั้งแรกที่บริษัท ATDI
เสนอให้ดาวน์โหลดข้อมูลภูมิศาสตร์
ฟรี โมเดลดิจิทัลที่มีความละเอียด
500 เมตร รวมทั้งแผนที่ไม่ว่าจะเป็น
ที่ใดในโลกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวใน
มาตราส่วน 1/1,000,000 โดยผ่าน
อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีแบบ
จำลองของแผนที่ระบบ 3 มิติ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความ

ละเอียดในระดับ 100 เมตร และ
แผนที่ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองดัง
กล่าวในมาตราส่วน 1/500,000 ให้
ดาวน์โหลดกันด้วย

คงไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการเข้าสู่
การบริการดังกล่าวนี้อีกแล้ว เพียง
แต่เข้าไปในเว็บไซต์ของ ATDI จากนั้น
ใส่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามองศา
ลิบดาและฟิลิปดาของเส้นรุ้งแวงของ
สถานที่ที่คุณต้องการค้นหาลงไป
ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งของสถานีส่ง
สัญญาณ เป็นต้น อุปกรณ์ที่สร้างด้วย
ซอฟต์แวร์ ICS Map Server ซึ่งเป็น
โปรแกรมการจัดการด้านแผนที่ทาง
ภูมิศาสตร์จะค้นหาตำแหน่งดังกล่าว
แล้วนำไปสู่ตำแหน่งนั้นและ
บริเวณที่อยู่ในรัศมี 100 กิโลเมตร
ณ เวลาจริงขณะนั้นในฐานข้อมูล
ทางแผนที่ทั่วโลก จากนั้นโปรแกรม
จะเสนอให้ผู้ใช้อัปโหลดข้อมูลเก็บ
เอาไว้

ที่นอกเหนือไปจากฐานข้อมูล
ภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า 1
แสนล้านไบต์ แล้ว บริษัท ATDI ยัง
เสนอให้ผู้ส่งกระจายเสียงวิทยุได้
ดาวน์โหลดใช้ซอฟต์แวร์ของ Hertz
Mapper planning tool ได้ฟรี ซึ่ง
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถอ่านและ
ใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เหล่านี้ในการ
วิเคราะห์ต่อไป อีกทั้งยังสามารถทำ
การคำนวณพื้นฐานต่างๆ จากแผนที่
ที่เราดาวน์โหลดมาได้ เช่น ความ
สามารถในการมองเห็นแผนที่ใน
ตำแหน่งต่างๆ ความสามารถในการ
มองเห็นระหว่างจุด 2 จุด การค้นหา
ตำแหน่งของสถานีส่งกระจายเสียง
การคำนวณการเชื่อมต่อจุดต่อจุด
การแสดงผลบริเวณที่การส่งกระจาย
เสียงครอบคลุมถึงที่คำนวณได้บน
แผนที่



ผลการคำนวณดังกล่าวสามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้โดยตรงหรืออาจจะนำส่งออกไปในรูปแบบมาตรฐานสำหรับใช้ในโปรแกรมออฟฟิศ อาทิเช่น ไมโครซอฟต์ ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งกระจายเสียงวิทยุสามารถมองเห็นแผนที่เหมือนจริง ที่เครือข่ายการส่งกระจายเสียงครอบคลุมถึงได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะทำงานอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม ทั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย

แผนที่ทางภูมิศาสตร์ที่เสนอให้นี้สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นของบริษัท ATDI ได้เต็มที่ และในปัจจุบันลูกค้าของบริษัทสามารถใช้ฟังก์ชันของเครื่องมือเหล่านี้ทุกฟังก์ชันได้ทันที

เมื่อได้ขยายเครือข่ายไปสู่ระดับสากล ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลแผนที่ทางภูมิศาสตร์จะสามารถหาใช้ได้ง่ายและทันที่ และเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูลที่มีความละเอียดสูงขึ้นไปอีก แผนกแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของบริษัทก็พร้อมที่จะสร้างหรือแปลงข้อมูลทุกชนิดให้

หากท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการทดสอบการใช้บริการดังกล่าว สามารถหาได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.atdi.com

สำนักงานชาวเทคโนโลยีฝรั่งเศส
November 22, 1999

สัมผัสรสชาติแห่งดินแดนเทือกเขาพิเรนีส

www.saveurs-des-montagnes.com

บริษัท LSW โดยการดำเนินงานของ Frédéric Walton และ Catherine Le Saux อดีตเจ้าของภัตตาคารในเขตพีเรนีสตอนบน ได้เปิดตัวเว็บไซต์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากดินแดนพีเรนีส

เว็บไซต์ดังกล่าวนี้คือ www.saveurs-des-montagnes.com ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่ท่องเว็บไซต์ได้พบกับผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่มาจากทั้งแหล่งต้นกำเนิดและที่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นดับบด เนยแข็งจากแพะน้ำผึ้งจากต้นเฮเธอร์ ปลาเทร้าที่รมควัน และแฮมดำจาก Bigorre บริษัทได้ตัดสินใจนำเกษตรกรชาวพีเรนีสทั้งชาวนา ชาวนม และคนขายเนื้อสดมาเปิดตัวบนอินเทอร์เน็ต โดยเกษตรกรเหล่านี้เป็นบุคคลที่ยึดประเพณีและกระบวนการดั้งเดิมใน

การผลิต แต่ต้องการสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าในอนาคต บริษัทได้ใช้ความพยายามทุกรูปแบบ เพื่อสร้างเว็บไซต์นี้ให้เป็นจริงขึ้นมา กล่าวคือ

- ให้ความรับรองในการต่อเข้าไปในอินเทอร์เน็ต โดยผ่าน Telecommerce โดยใช้ระบบการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท France Télécom

- ระบบการจัดส่งที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงของ Colissimo (La Poste) และ Chronopost สองบริษัทจัดส่งพัสดุที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

- การติดต่อสื่อสารถาวรกับหน่วยงานด้านศุลกากรและมาตรฐานการค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งลูกค้า และหน่วยงานทางราชการ

- สามารถดูกฎระเบียบและเงื่อนไขการขายได้อย่างละเอียดด้วยวิธีการง่ายๆ

- การจัดการคุณภาพ เลือกสรรและตรวจสอบเป็นประจำทั้งในด้านรสชาติและความสะอาด การบรรจุหีบห่อ และจัดส่งตามใบสั่งโดยบริษัท LSW เพื่อความมั่นใจในการส่งสินค้าที่รวดเร็วและสมบูรณ์ที่สุด

- บริการเว็บไซต์พิเศษสำหรับบุคคลในวงการอาหาร

- เมนูพิเศษและคำแนะนำการทำอาหารด้วยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

- ในแต่ละเดือนจะมีโปรโมชันพิเศษ เช่น “Discovery Special”, “Party” หรือ “Rustic” ที่จะนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างไปตามแต่ละหัวข้อ

วันนี้ที่เว็บไซต์ www.saveurs-des-montagnes.com ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้นักชิมและผู้หลงใหลในรสชาติอาหารจากทั่วโลกเข้าสัมผัสและรู้จักผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดกว่า 45 ชนิดจากดินแดนพีเรนีสเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้สั่งซื้อโดยตรงบนอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

นักท่องเที่ยวจะได้เดินทางสัมผัสอาหารรสเลิศนานาชนิดประจำท้องถิ่น จากยอดเขาสูงสู่หุบเขาเบื้องล่าง จากฟาร์มปศุสัตว์เรื่อยไปถึงหมู่บ้านเล็กๆ และอีกมากมาย

ที่พักรู Pic de Pan คุณจะได้ลิ้มลอง

- ดับเบิ้ลบัตเตอร์รสด้วยเกลือ Guérande ขนาดบรรจุ 180 กรัม 300 กรัม และ 450 กรัม

- เบ็ดเตล็ดสำเร็จรูป ที่ผ่านกรรมวิธีอุ่นในไขมันเปิดอย่างช้าๆ เพื่อให้ได้เนื้อที่นุ่มและรสชาติที่ดีเยี่ยม



(มีให้เลือกทั้ง
น้อง อก และ
ปิก)

- เปิดหั่นเป็นชั้นปรุงสำเร็จและบรรจุในภาชนะตามประเพณีดั้งเดิมที่ดีที่สุดในดินแดนตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เช่น เปิดบดสำเร็จ ตับเปิดบดในโหลดินเผา (ขนาด 180 กรัม และ 300 กรัม) เปิดแช่เหล้ากระเพาะเปิดและส่วนอื่นๆ ปรุงสำเร็จเป็นต้น

ที่ร้านขายเนื้อ Pierre Sajous

คุณจะได้พบกับ

- แฮมทำจากเนื้อหมูดำ ปราดจากสารแต่งสีและสารถนอมอาหารบรรจุในภาชนะสุญญากาศ แบบเนื้อล้วนๆ หรือแบบติดกระดูก แฮมดำจากหมู Bigorre นั้นทั้งนุ่มทั้งหอมเพราะผลิตมาจากสุกรพันธุ์พื้นบ้านที่



ได้รับการดูแลรักษาสายพันธุ์มาอย่างยาวนาน

- ไส้กรอกจากหมูดำปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยตามกระบวนการดั้งเดิม

- แฮม Bayonne แบบเนื้อล้วนหรือติดกระดูกในส่วนผสม 1/4, 1/2 หรือทั้งหมด

ที่ฟาร์ม Cascades ผลิตภัณฑ์น้ำ

เลวอกัก

- เนยแข็งพื้นบ้าน เช่น เนยแข็งจากดินแดนพีเรนีสที่ผลิตด้วยกรรมวิธีพื้นบ้านจากนมวัวหรือนมแกะ หรือเนยแข็งนมแพะแช่ในน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ปรุงรสด้วยสมุนไพรและพริกไทย



- ผลิตภัณฑ์ใหม่ “ฟองดูพีเรเนียน” ส่วนผสมอันลงตัวของนมวัวกับนมแพะที่ก่อให้เกิดเนยแข็งที่ทั้งนุ่มทั้งหอม สำหรับรับประทานเปล่าๆ หรือนำมาเป็นส่วนผสมในการทำอาหาร และทำเนยแข็ง นมแพะชนิดพิเศษสำหรับประกอบอาหารที่มีชื่อรู้จักกันทั่วไปในนามฟรอมโฮ

- อาหารจานเด็ด เนื้อลูกแกะแช่เหล้าบรันดี Armagnac, สตูว์เนื้อแพะแช่ไวน์ท้องถิ่น (Madiran) หรือเนื้อลูกแกะปรุงรสด้วยเห็ด เป็นต้น

- นอกจากนี้ยังมีเกสรดอกไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน และเกลือแร่เหมาะสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งแยมบลูเบอร์รี่และราสเบอร์รี่ในน้ำผึ้ง

ที่ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง Val d'Azun

มีผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งที่น่าสนใจ ได้แก่



- น้ำผึ้งจากเทือกเขาสูงเก็บจากรังผึ้งที่นำไปตั้งไว้ที่ระดับความสูงกว่า 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล น้ำผึ้งที่ได้มีรสชาติเข้มข้น หอมหวาน เพราะได้มาจากดอกไม้บนเนินดินแดนเขาสูงชันเช่น ดอกRhododendron, Helianthemum, Blue Thistle ที่บานสะพรั่งปกคลุมทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ปลายฤดูใบไม้ผลิจนถึงต้นฤดูร้อน (มีขายเป็นขวดขนาด 500 กรัมและ 1 กิโลกรัม)

- น้ำผึ้งจากดอกไม้บนยอดเขาเป็นน้ำผึ้งที่หวานหอมรสชาติละเอียดละไมจากรังผึ้งที่เลี้ยงไว้ในระดับความสูงระหว่าง 500-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล น้ำหวานที่ได้จะมาจากดอกไม้บนเนินสูงชันทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่แบ่งปันตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ

ไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วง (ขายเป็นขวดขนาด 500 กรัมและ 1 กิโลกรัม)

- น้ำผึ้งจากดอกเฮเธอร์ การที่จะได้น้ำผึ้งจากดอกไม้ชนิดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้เลี้ยงผึ้งต้องออกหาแหล่งที่มีต้นเฮเธอร์พันธุ์ Calluna น้ำผึ้งที่ได้มีรสจัดและเผ็ดเป็นที่ชื่นชอบของนักชิมและผู้ชื่นชอบเป็นอันมาก (ขายเป็นขวดขนาด 500 กรัม และ 1 กิโลกรัม)

ปลาเทราท์แห่งพีเรนีสจากฟาร์มปลา



ผลิตภัณฑ์ชั้นยอดจากปลาเทราท์ที่ปรุงด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมได้ถูกรวมไว้ที่นี่ย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น

- Fillet ปลาเทราท์ที่ไม่มีก้างผสมถั่ว Tarbes ปรุงตามสูตรดั้งเดิมเพื่อรักษารสชาติท้องถิ่นอันเกิดจากการผสมผสานระหว่างรสชาติสดจืดจากดินแดนแห่งเทือกเขาพีเรนีสและรสชาติละมุนของเนื้อปลาเทราท์

- สเต็กปลาเทราท์ราดซอสพีเรเนียน ปลาเทราท์ชั้นดีปรุงด้วยน้ำมันมะกอก พริกไทย มะเขือเทศและหอมหัวใหญ่

- ปลาเทราท์รมควันอบเนยแช่เย็นในน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์

- ปลาเทราท์บดสำเร็จ ปลาเทราท์รมควันและมูสปลาเทราท์ผสมกับพืชสมุนไพร เหมาะสำหรับรับประทานเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหรือในระหว่างไปปิกนิก

สำนักงานข่าวเทคโนโลยีฝรั่งเศส

November 23, 1999





WAP

(Wireless Application Protocol)

พงษ์ศักดิ์ สุสัมพันธ์ไพบูลย์

Advanced Info Service Pl. 212/51 หมู่ 9 ถนนงามวงศ์วาน นนทบุรี 11000

ทุกวันนี้ เครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายถูกใช้สำหรับให้บริการสื่อสารของเสียงเป็นหลักโดยที่มีบริการ voice mail เป็นบริการเสริมพิเศษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อย่างไรก็ตามในระยะเวลาหลังนี้ ก็ได้มีแนวความคิดใหม่เกิดขึ้นที่เรียกว่า WAP (Wireless Application Protocol) ซึ่งจะเพิ่มบริการข้อมูลแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ประมาณ 2 ปีที่แล้ว (คือเมื่อปี 1997) จากการริเริ่มของ Ericsson ทำให้เกิดการจัดตั้งสมาคม WAP Forum ขึ้น ที่ประกอบด้วย Motorola, Nokia และ Unwired Planet เพื่อทำการกำหนดโปรโตคอลแบบใหม่ให้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้สามารถบริการสื่อสารข้อมูลไร้สายแบบใหม่ๆ ที่ไม่


เคยมีมาก่อน ให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น บริการต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต และ applications อื่นๆ อีกมากมายที่จะเพิ่มเข้ามา

แต่ก่อนหน้านั้นหลายปี ได้มีโปรโตคอลจำนวนหลายโปรโตคอลที่ถูกกำหนดโดยบริษัทต่างๆ สำหรับใช้กับ application ที่แตกต่างกันออกไป Unwired Planet ได้กำหนดโปรโตคอลสำหรับการติดต่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ชื่อว่า HDML (Handheld Device Markup Language) เพื่อนำมาใช้บนเครือข่าย CDPD (Cellular Digital Packet Data) ขณะที่ทาง Nokia ได้ทำการเปิดตัวโปรโตคอลแบบใหม่ขึ้นที่งาน CeBIT 1997 โดยมีชื่อว่า TTML (Tagged Text Markup Language) โปรโตคอลนี้มีความคล้ายกันในบางเรื่องกับ HDML แต่ไม่สามารถ

ใช้งานด้วยกันได้ ส่วนทาง Ericsson ได้ทำการกำหนดโปรโตคอลที่เน้นหนักในเรื่องของ call handling และ call control โดยใช้ชื่อว่า ITTP (Intelligent Terminal Transfer Protocol) ทั้ง 3 โปรโตคอลที่กล่าวมา เป็นโปรโตคอลที่มีความแตกต่างกันและมีใช้งานกันอยู่ในท้องตลาด

การแบ่งแยกกันหรือความแตกต่างกันของโปรโตคอลที่กล่าวมา ได้กีดกันโอกาสของตลาดที่จะทำการพัฒนา applications แบบใหม่ๆ ขึ้นมาสำหรับใช้กับการสื่อสารไร้สาย และยังทำให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตแต่ละรายมีการใช้งานอยู่ในวงจำกัดอีกด้วย ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นมาของทาง Ericsson, Motorola, Nokia และ Unwired Planet เพื่อทำการกำหนดโปรโตคอลที่สามารถใช้งานสำหรับ call control, call handling, messaging และ internet access โปรโตคอลที่ว่านี้จะไม่ขึ้นอยู่กับ air-link bearer ถึงแม้ว่าเริ่มแรกนั้นจะถูกออกแบบสำหรับใช้งานบนเครือข่าย GSM ก็ตาม แต่ application ควรสามารถใช้งานได้บนเครือข่าย D-AMPS, CDMA และ PDC ด้วยเช่นกัน รวมทั้งระบบ non-voice อื่นๆ เช่น ระบบ Mobitex และ paging ต่างๆ


เมื่อเดือนธันวาคม 1997 ทั้ง 4 บริษัทที่ว่านี้ ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท WAP Forum Ltd. ขึ้น ซึ่งจะดำเนิน



การพัฒนา wireless application protocol ที่เรียกย่อๆ ว่า WAP นี้ และในช่วงต้นปี 1998 ทาง WAP Forum ก็ได้เปิดประตูในการรับสมัครใหม่ขึ้น และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 1998 ข้อกำหนดทางเทคนิคเวอร์ชันแรกของ WAP v1.0 ก็ได้ถูกประกาศออกมา

(ซึ่งข้อกำหนดนี้ยังคงไม่เสร็จสมบูรณ์ในบางส่วน) หากนับจนถึงเดือนพฤศจิกายน 1998 ทาง WAP Forum Ltd. ได้มีสมาชิกถึงมากกว่า 70 ราย ที่ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาข้อกำหนดให้มีความสมบูรณ์ และเสนอ


แนวความคิดใหม่ที่จะทำการพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วย ส่วนในเรื่องของจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ WAP นั้น คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงประมาณ 800 ล้านรายในปี 2003 (รูปที่ 1)



รูปที่ 1 การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ WAP ที่ประมาณการไว้ในช่วง 5 ปีถัดไป

WAP เป็นโปรโตคอลที่มีรูปแบบที่ลดทอนมาจากโปรโตคอลของอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพราะว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่มีข้อจำกัดหลายอย่างเมื่อเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป เช่น มีแบนด์วิดท์การส่งที่แคบ, จอแสดงผลที่มีขนาดเล็ก, มีหน่วยความจำ (ROM & RAM) ที่จำกัด, ใช้ CPU ที่มีความสามารถน้อยกว่า, กำลังไฟที่ใช้มีจำกัด และการอินพุตก็จำกัดอยู่บน keypad ของเครื่องโทรศัพท์เท่านั้น WAP Forum จึงต้องทำการพัฒนา markup language และ transport protocol ของ WAP ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานแบบไร้สายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบสถาปัตยกรรมของเทคโนโลยี WAP จะอิงแนวความคิดมาจากของอินเทอร์เน็ต (TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol) และแบบจำลอง

WWW (World-Wide Web) รูปที่ 2 ได้แสดงเปรียบเทียบระหว่าง WAP stack กับโปรโตคอลของอินเทอร์เน็ต ถ้าหากพิจารณาแบบจำลองของ WAP ตามรูปที่ 3 จะพบว่า ส่วนของ WAP Microbrowser นั้นจะลดรูปมาจาก Internet browser (เช่น Netscape Navigator หรือ Microsoft Internet Explorer) ขณะเดียวกัน WML (Wireless Markup Language) ที่ทาง WAP ใช้ ก็ถูกออกแบบและพัฒนามาจาก HTML (Hyper Text Markup Language) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานแบบไร้สายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในทำนองเดียวกันส่วนของ WML Script ก็จะคล้ายกับ Java Script ของอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังมีส่วนของ WAP Gateway ที่ช่วยเพิ่มอัตราเร็วในการส่งข้อมูลโดยทำหน้าที่ในการเข้ารหัส/ถอดรหัสข้อมูล



รูปที่ 2 ได้แสดงเปรียบเทียบระหว่าง WAP stack กับโปรโตคอลของอินเทอร์เน็ต


ตัวอย่างของ WAP Network

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างของ WAP Network ในตัวอย่างนี้ WAP client จะติดต่อสื่อสารกับ 2 servers ที่อยู่ในเครือข่ายไร้สาย WAP proxy จะทำหน้าที่อยู่ 2 อย่างคือ 1) เป็น Protocol Gateway ที่จะทำการแปลง requests จาก WAP protocol stack (WSP, WTP, WTLS และ WDP) ไปยัง WWW protocol stack (HTTP และ TCP/IP) ทำให้ WAP client สามารถส่ง requests ไปยัง web server ได้ และ 2) เป็น Content Encoders และ Decoders ซึ่งจะทำการเข้ารหัส Content ที่ response มาจาก


web server ให้อยู่ในฟอร์แมตที่กะทัดรัดเพื่อลดขนาดของข้อมูลที่ส่งภายในเครือข่ายไร้สาย

ถ้า web server ส่ง content ให้ client ด้วย WML ส่วนของ WAP proxy ก็สามารถรับข้อมูลได้โดยตรงจาก web server แต่ถ้าหาก web server ส่ง content มาในรูปของ HTML จำเป็นจะต้องใช้ filter ช่วยในการแปลง content จาก HTML มาเป็น WML ซึ่งในรูปที่ 4 จะใช้ HTML Filter ทำหน้าที่ดังกล่าวนี้

Wireless Telephony Application (WTA) server เป็น server ที่จะ response การ request จาก WAP client ได้โดยตรง server นี้มีหน้าที่ในการรองรับการให้บริการของโทรศัพท์



รูปที่ 3 แบบจำลองของ WAP



รูปที่ 4 ตัวอย่างของ WAP Network

ประโยชน์จากการใช้ WAP (WAP applications)

ตัวอย่างประโยชน์จากการใช้งานของ WAP ได้แก่

- * การดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยการใช้ WAP Microbrowser ที่อยู่บนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
- * การเช็ครายการสิ่งของหรือสินค้าที่เก็บไว้ (Inventory) เช่น อะไหล่สำรองต่างๆ ว่ามีอยู่เพียงพอหรือจำเป็นต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม
- * การแจ้งหรือบอกกล่าวผู้ใช้บริการ (Notification applications) เช่น การแจ้งว่ามี e-mail หรือ voice-mail

messages ส่งมาหา และผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะดูข้อมูลทางหน้าจอเครื่องโทรศัพท์หรือส่งพิมพ์ออกมาทางเครื่องแฟกซ์ก็ได้ นอกจากนี้ ยังอาจจะคอยแจ้งว่า ราคาหุ้นที่สนใจได้เปลี่ยนแปลงผ่านระดับราคาที่ใช้ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ และถามว่าต้องการที่จะทำการซื้อขายหรือไม่

- * ให้บริการ Mobile electronic commerce อย่างเช่น บริการสอบถามยอดเงินหรือโอนเงินระหว่างบัญชีกับธนาคาร หรือ การสั่งซื้อสินค้าต่างๆ เป็นต้น
- * ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์



โรคพยาธิที่พบในประเทศไทย


จรรย์ คัมทรัพย์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กลุ่มคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยรังสิต ถ. พหลโยธิน จ. ปทุมธานี 12120

อาหารเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงชีพ จึงควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ หมู่ที่ 1 ได้แก่ จำพวกนม ไข่ เนื้อสัตว์ หมู่ที่ 2 จำพวก ข้าว แป้ง ผัก ผลไม้ น้ำตาล หมู่ที่ 3 จำพวก พืชผักต่างๆ หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ และ หมู่ที่ 5 จำพวกไขมันและน้ำมัน ซึ่งทั้ง 5 หมู่นี้ควรรับประทานในสัดส่วนที่พอเหมาะ ให้มีสุขภาพดี นอกจากนี้ อาหารบางชนิดอาจมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ซึ่งทำให้เกิดโรคเนื่องจากการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัยของอาหารและคนขาย (Pariyanonda 1999 : Artsantea 1996) ส่วนอาหารที่มีการนำโรคพยาธิให้กับผู้บริโภค มักมาจากเนื้อสัตว์โดยตรงหรือปนเปื้อนมากับน้ำดื่มและผักสด ซึ่งนอกจากจะทำอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังมีผลกระทบต่อสัตว์เศรษฐกิจ เช่น มาตรการทำลายหรือห้ามขาย ผลเสียทางอ้อม อาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำมาหากินได้ตามปกติ

เราอาจแบ่งที่มาจากอาหารตามแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

1. การได้รับเชื้อพยาธิจากการรับประทานเนื้อสัตว์ (Meatborne Helminths infection)
2. การได้รับเชื้อพยาธิจากการรับประทานปลาและสัตว์ชั้นต่ำ (Fish and invertebrate-borne Helminths)
3. การได้รับเชื้อพยาธิโปรโตซัวจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่ม (Foodborne and waterborne Zoonotic Protozoa)



Taenia saginata แสดงพยาธิทั้งตัว

ซึ่งทั้งหมดนี้จะชอกล่าวถึงโรคพยาธิที่พบมากในประเทศไทยเป็นสำคัญ

1. การได้รับเชื้อพยาธิจากการรับประทานเนื้อสัตว์ อันได้แก่

โรคพยาธิตัวตืด (Taeniasis) เกิดจากพยาธิตัวตืด (Taeniasis saginata) และตืดหมู (*T. solium*) ตัวตืดพบได้ทั่วไปในประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นิยมรับประทานอาหารปรุงด้วยเนื้อดิบๆสุกๆ ส่วนตืดหมูนั้นจริงจะพบผู้ป่วย การแพร่กระจายโดยการรับประทานเนื้อหมู/วัวดิบๆสุกๆซึ่งมีตัวอ่อนพยาธิตัวตืด ซึ่งจะมีอาการสำคัญคือ อาการท้องอืด อืดอืดปวดท้องในเวลาเช้า โดยเฉพาะผู้ที่รับประทานเนื้อหมูจะรำคาญขณะท้องปล้องของตัวตืดหลุดออกมาจากกัน (Pawlowski 1982) โรคตัวอ่อนตืดหมูตัวตืด (Cysticercosis) พยาธิตัวอ่อนตืดวัว (*Cysticercus bovis*) พบได้ทั่วไป และมักพบในโรงฆ่าสัตว์ ส่วนพยาธิตัวอ่อนตืดหมู ในปัจจุบันไม่ค่อยพบเพราะส่วนใหญ่เลี้ยงหมูใน

ฟาร์ม ที่พบมักเป็นหมูที่เลี้ยงตามบ้านตามพื้นดินหรือในโรงฆ่าสัตว์เถื่อนโรคที่เกิดมักมีอาการตามที่พยาธิไปอยู่ โดยเฉพาะในระบบประสาท (Neurocysticercosis) ทำให้เกิดอาการคล้ายลมบ้าหมู เวียนศีรษะปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน การผ่าตัดเป็นวิธีหนึ่ง หรืออาจใช้ Steroid และยา Praziquantel การตรวจอาการอาจใช้ Computerized Tomography (CT Scan) หรือตรวจทางซีรัมวิทยา (Serology)

โรคพยาธิเนื้อหมูป่า หมูบ้าน (Trichinellosis) พบโรคพยาธิชนิดนี้มากทางภาคเหนือ รายแรกที่อำเภอแม่สะเรียง (Boonthanom and Nawarat 1963) มีทั้งคนป่วยและคนตาย เนื่องจากการกินลาบหรือแหนมดิบซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน การแพร่กระจายโดยตัวอ่อนในเนื้อหมูชาวเขา ซึ่งหมูเลี้ยงของชาวบ้านมีพยาธินี้น้อยกว่า (Khamboonruang et al. 1978) ผู้ที่ติดเชื้อจะมีการปวดท้อง ท้องเดิน ในระยะที่พยาธิฝังตัวอยู่ผิวลำไส้ (Mucosa) ส่วนอาการที่กล้ามเนื้อมีในระยะ 1-4 อาทิตย์

หลังจากรับประทานเนื้อที่มีพยาธิ ซึ่งจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ หายใจลำบาก บวม ตบวัดเม็ดเลือดขาว พบ Eosinophil สูง

2. การได้รับเชื้อพยาธิจากการกินปลา หอย ปู และพืชผัก

2.1 โรคพยาธิเกิดจากการกินปลา (Fishborne infection)


โรคพยาธิแคปปิลารีย (Capillaria philippinensis) พบได้ทั่วไปในประเทศไทย มีรายงานของผู้ป่วยทางภาคอีสานจากการกินเนื้อปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้ เช่น ก้อย ปลา ทำให้เกิดอาการท้องเดิน (Bhaibulaya et al. 1979)

โรคพยาธิตัวจิ๊ด (Gnathostomiasis) พบตัวแก่ของพยาธิในสุนัข แมว และเสือ มีรายงานพบผู้ป่วยทั่วประเทศที่ติดโรคพยาธิชนิดนี้โดยการกินเนื้อปลาน้ำจืด ปลาไหล และกบที่ไม่สุกเพียงพอ พยาธิที่สำคัญคือ *Gnathostoma spinigerum* ส่วนสายพันธุ์อื่น เช่น *G. hispidum*, *G. doloresi* และ *G. nipponicum* มีรายงานโดย Tanaguchi et al. (1991) ตัวอ่อนระยะที่ 3 พบในผู้ป่วยซึ่งมีอาการบวมเคลื่อนที่ตามผิวหนัง เหงือก ลูกตา ระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาท ทำให้ถึงตายได้ (Daensvang 1980)

โรคพยาธิปลาน้ำเค็ม (Anisakiasis) เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยกินปลาทะเลดิบ ซึ่งมีตัวอ่อนพยาธิตัวกลม *Anisakis simplex* หรือ *Pseudoterranova decipiens* มีการแพร่กระจายซึ่งเกี่ยวข้องกับประเพณีการกินปลาดิบ หลังจากการกินได้ 2-3 ชั่วโมงจะมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาการยาวนานเป็นอาทิตย์ ถ้าตัวพยาธิไชทะลุลำไส้ จะมีอาการคล้ายโรคกระเพาะ มีเลือดปนออกมา กับอุจจาระ

(Sakanari et al. 1989)

โรคพยาธิตัวอ่อนตัวตืด (Sparganosis) พบได้ในผู้ป่วยทั่วไป ตัวตืดในสุนัข และแมวคือ *Spirometra mansoni* มีวงจรชีวิตผ่านไร่น้ำ (copepod) งู ปลา และกบ ในผู้ป่วยพบพยาธินี้ในลูกตา หรืออาจพบในช่องท้อง คนได้รับเชื้อพยาธิโดยการกินน้ำที่มีตัวไร่น้ำ ที่มีตัวอ่อนตัวตืดระยะ Proceroid หรือกินปลา กบ ดิบๆ สุกๆ ในระยะ Sparganum (Jenchitu et al. 1989)



Opisthorchis viverrini ตัวเต็มวัย

Opisthorchis viverrini ไข่

โรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchiasis) พบมากในภาคตะวันออก เชียงเหนือ และพบในกลุ่มผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เนื่องจากความเคยชินในการบริโภคก้อยปลา หรือปลาร้าดิบๆ ส่วนในภาคเหนือพบจากการกินปลา ส้ม ลาบปลา ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง แน่นท้อง เบื่ออาหาร ท้องอืด ตับโต ถุงน้ำดีโต มะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ฯลฯ (Sonakul et al. 1978)

โรคพยาธิใบไม้ลำไส้ (Heterophyiasis) พบในภาคตะวันออก เชียงเหนือ มีพยาธิใบไม้ *Haplorchis taichui*, *H. yokogawai*, *H. pumilio* (Radomyos et al. 1984) จากการกินกลุ่มปลาตะเพียนดิบๆ สุกๆ ทำให้มีอาการปวดท้อง ท้องเดิน อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ อาเจียน

2.2 โรคพยาธิเกิดจากกินหอยน้ำจืด (Molluscan Borne Helminthiasis)

โรคพยาธิตัวกลมจากหอย

(Angiostrongyliasis) พบมากภาคอีสาน ในผู้ชายมีอัตราของโรคนี้สูง เนื่องจากการกินหอยโข่ง หอยปิง (Pila snail) เป็นกับแกล้ม ก่อให้เกิดโรคสมองอักเสบ (Eosinophilic meningitis) จากการกินหอยน้ำจืดดิบๆ ระยะแรกมีอาการในระบบทางเดินอาหาร จากนั้นจะเคลื่อนไปที่สมอง มีอาการชัก ใบหน้าตายไปหนึ่งซีก อาจหลุดเข้าไปทำอันตรายในลูกตา (Punyagupta et al. 1970) และใน


ภาคอีสานยังพบ *A. malayisensis* (Pongmutsaya 1994)

โรคพยาธิใบไม้ลำไส้ (Echinostomiasis) พบทั่วไปในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอีสาน โรคนี้แพร่โดยการกินหอยโข่ง (Pariyanonda et al. 1990) ลูกสาว (ลูกอ่อนกบ) ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง/ท้องเดิน เบื่ออาหาร

โรคพยาธิใบไม้ลำไส้ (Plagiorchiasis) เกิดจากพยาธิ *Plagiorchis siamensis* มีหนูเป็นรังเก็บวงจรชีวิต (Yamachita 1967) การกินหอยน้ำจืด เป็นการรับเชื้อพยาธิชนิดนี้ แต่ผู้ป่วยจะไม่มีอาการใดๆ

2.3 โรคพยาธิเกิดจากการกินปู หรือแมลง (Arthropod - Borne Helminthiasis)

โรคพยาธิใบไม้ในปอด (Paragon



หอยโข่ง *Pila scutata*


imiasis) ที่พบมีหลายชนิดแต่ที่สำคัญคือ *Paragonimus westermani* และ *P.heterotremus* ซึ่งจะพบในผู้ป่วยที่มีปูเป็นพาหะ ในแถบภาคกลาง แถวจังหวัดนครนายก และสระบุรี (Vajarasthira et al. 1968) ทางภาคเหนือพบแถวจังหวัดเชียงราย พะเยา (Khamboonruang unpublished data) และพบผู้ป่วยแถว จังหวัดพิษณุโลก (Phanarunothai et al. 1988) (Pariyanonda et al. 1991) โดยการกินปูไฟ ปูแดง *Potamon* sp. ตามลำธาร เข่งเขา

โรคพยาธิใบไม้ลำไส้ชนิดเล็ก (Lecithodendriasis) เกิดจากพยาธิ *Phanerocephalus bonnei* และ *Prosthodendrium molenkampii* (Manning et al. 1971) พบในผู้ป่วยจากภาคอีสานซึ่งกินแมงระงำ (maiads) ปูนา อาจเป็นตัวนำโรค โรคนี้ไม่ทำให้เกิดอาการ การตรวจพบเป็นผลพลอยได้ในการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ

โรคพยาธิหัวหนาม (Acanthocephala infection) มีรายงานว่าพยาธิ *Macracanthorhynchus hirudineus* พบในผู้ป่วยภาคอีสาน มีอาการปวดท้อง คาดว่าแมลงปีกแข็ง (Beetle) เรียกว่าแมงกินหนูน แมงกุดจี เป็นตัวนำโรคพยาธิชนิดนี้ (Tesna et al. 1982)


2.4 โรคพยาธิเกิดจากกินพืชน้ำ

โรคพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดใหญ่




หอยขม *Filopaludina* (*Siamopaludina*) *Javanica*


(Fasciolopsiasis) เกิดจากพยาธิ *Fasciolopsis buski* พบมากบริเวณภาคกลางของประเทศ มีหมูปเป็นรังเก็บโรค พืชน้ำที่มีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้คือแห้ว กระเจ็บ สายบัว ผักบุ้ง ผักตบชวา ผู้ป่วยจะมีอาการท้องเดิน อุจจาระหยาบมีกลิ่นเหม็น ถ้ามีพยาธิจำนวนมาก จะทำให้ลำไส้ไม่ดูดซึมอาหาร ของเสียของพยาธิอาจทำให้ตายได้ (Mangalasmaya 1941)




กระเจ็บ



แห้วจีน



ผักบุ้ง



หอยขม *Filopaludina* (*Siamopaludina*) *martensi*

โรคพยาธิใบไม้ตับ (Fascioliasis) พบในผู้ป่วยแถบภาคอีสาน เช่น จังหวัดชัยภูมิ (Pariyanonda 1990) มีวัว ควาย เป็นรังเก็บโรค ตัวอ่อนพยาธิอาศัยหอยคัน *Lymnaea* (Charoenchai 1995) พืชน้ำที่สันนิษฐานว่านำโรคพยาธิ คือสายบัว ผักแว่น ผักคั่นจอง ผักตะโตว้า ผักตบชวา โดยการกินแกล้มกับส้มตำ ปลาร้า ลาบ ก้อย ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการตับโต อุจจาระมีกลิ่นเหม็น มีไข้หนาวสั่น กดเจ็บชายโครงขวา อาจตรวจพบที่ตับโดยวิธี Ultrasonography หากตรวจอุจจาระจะพบไข่คล้ายไข่พยาธิ *Echinostoma* และ *Fasciolopsis buski*


3. การได้รับเชื้อพยาธิโปรโตซัวจากการกินอาหารและน้ำดื่ม

โรคบิดมีตัวมีบา (Amoebiasis) เกิดจากโปรโตซัว *Entamoeba histolytica* จะมีอาการท้องเดิน อุจจาระมีเลือดปน อาจพบพยาธิทำอันตรายลำไส้และตับ พยาธิชนิดนี้แพร่กระจายสู่คนโดยกินถุง Cyst ปนไปกับอาหารและน้ำดื่ม


โรคท้องเดิน (*Balantidium coli*) หมูปเป็นตัวเก็บวงจรชีวิต แพร่กระจายสู่คนเหมือนบิดมีบา ผู้ป่วยจะมีอาการท้องเดิน อุจจาระมีมูกปน ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยน้อยลงมาก อาจเนื่องจากการทำฟาร์มหมูถูกหลักอนามัยมากขึ้น



ผู้ป่วยโรคฝิบิตในตับ



แสดงตับโตและวิธีเจาะหนองจากตับ



หนองจากฝิบิตในตับคน

โรคท้องเดินเรื้อรัง (Giardiasis) เกิดจากโปรโตซัว *Giardia lamblia* ทำให้เกิดอาการท้องเดินเรื้อรัง การติดต่อแพร่กระจายมาสู่คนเหมือนกับกล่าวมา มีรายงานผู้ป่วยส่วนมากเป็นผู้มีพยาธิแต่ไม่มีอาการ (Carrier)

โรคท้องเดิน (Cryptosporidiosis) เมื่อก่อนไม่มีรายงานมากนัก แต่จากการระบาดของโรคเอดส์ ทำให้พบผู้ป่วยด้วยอาการท้องเดิน ซึ่งเป็นอาการหนึ่งของผู้ป่วยเอดส์ การติดต่อโดยการกินถุง Oocyst (Morakot et al. 1990)

โรคซาโคซิสติส (Sarcocystis) เกิดจากโปรโตซัว *Sarcocystis hominis* พบผู้มีพยาธิชนิดนี้ในภาคกลาง ภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศ จากการวิจัยพบว่าโรคนี้เกิดจากอุปนิสัยการกินเนื้อวัว เนื้อหมูดิบๆสุกๆ (Bunyaratvej 1982) ซึ่งมีถุง Cyst อยู่ตามกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยจะมีอาการเวียนศีรษะ ปวดท้อง ท้องเดิน หายใจไม่สะดวกและชีพจรเต้นแรง ฯลฯ

โรคท็อกโซพลาสมา (Toxoplasmosis) เกิดจากโปรโตซัวของแมว ติดต่อมายังคนโดยเชื้อ *Toxoplasma gondii* พบมากทางภาคเหนือด้วยอุปนิสัยความเคยชินในการกินแหนมดิบจากเนื้อหมู เนื้อวัวหรือกินถุง Oocyst ที่ปนมากับอุจจาระแมว เนื่องจากเชื้อโปรโตซัวสามารถไปตามอวัยวะต่างๆ ผู้ป่วยมีอาการคล้ายหวัดหรือมีอาการสมองลำไส้ดับ กล้ามเนื้อหัวใจ ปอดอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ และโลหิตจาง ถ้ามารดาได้รับเชื้อนี้อาจแพร่ไปสู่ทารกในครรภ์ได้ ซึ่งมีผลร้ายต่อเด็กที่คลอดออกมา

ในประเทศลาวซึ่งมีพรมแดนใกล้ชิดกับประเทศไทย มีโรคพยาธิที่คล้ายกับประเทศไทยคือ กลุ่มโปรโตซัว ได้แก่ *Sarcocystis hominis* , กลุ่มพยาธิใบไม้ ได้แก่ *Fasciolopsis buski* , *Opisthochis viverrini* , *Haplorchis taichui* , *Paragonimus heterotremus* , กลุ่มพยาธิตัวตืด ได้แก่ *Taenia sp.* ,

กลุ่มพยาธิตัวกลม ได้แก่ *Gnathostoma spinigerum* , *Trichinella spiralis* , *Angiostrongylus cantonensis* (Segal et al. 1968) การไปมาหาสู่ระหว่างคนทั้ง 2 ประเทศมีอยู่เสมอ รวมทั้งแรงงานที่มาจากประเทศลาว ทำให้การป้องกันควบคุมโรคที่ติดต่อกับอาหารหมดไปได้ยาก นอกจากจะทำการบำบัดรักษาผู้ที่เข้ามาในประเทศไทย

จะเห็นว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะส่งผลต่อร่างกายเสมอ พุดง่าย ๆ ก็คือ

“อาหารทำให้เกิดโรคได้” ฉะนั้นเราควรป้องกันโดยการรับประทานอาหาร / น้ำที่สุกและสะอาด รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ดี กำจัดขยะและของเสียให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ป้องกันไม่ให้อุจจาระปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำ อีกทั้งผู้ปรุงอาหารควรได้รับการตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิและตรวจร่างกายประจำปีอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

- Artsantea, J., Pariyanonda, A. and Luksamijarulkul, P. Bacterial contamination of "samtam" in some areas of Bangkok.
- Boonthanom, P. and Nawarat, A. 1963. The outbreak of trichinosis at Mae Sarieng. *Bull Public Health (Thailand)* 33:301-8.
- Bunyaratvej, S., Bunyawongwiroj, P. and Nitiyanant, P. 1982. Human intestinal sarcosporidiosis: Report of six cases. *Am J. Trop Med Hyg* 31:36-41.
- Charonchai, A., Tesana, S. and Pholpark, M. 1995. Natural Infection of Trematodes in *Lymnaea (Radix) aricularia rubiginosa* in water reservoirs in Amphoe Muang, Khon Kaen Province. Abstract. Seameo Tropmed Network, 2 seminar on Food-Borne Parasitic Zoonosis, Dec. 6-9, 1995:151.
- Daensavang, S. 1980. A monograph on the genus *Gnathostoma* and *Gnathostomiasis* in Thailand. Tokyo:SEAMIC 1980.
- Daensavang, S. and Mangalasma, M. 1941. A record of some cases of human infestation with *Fasciolopsis buski*. *Ann Trop Med Parasitol*. 35-43.
- Ektaeng, U., Bhaibulaya, M., Suwankul, S., Koewmanee, S. and Bhandhupras, P. Incidence of intestinal parasitic infections in some provinces in the northeast, central and north of Thailand. (Thai with Eng abstr). *J Parasit Trop Med Assoc Thai* 10:15-27.
- Jenchitu, W., Chaijookool, S. and Ying-Yuad, P. 1989. Ocular sparganosis in lampang. *Thai J. Ophth* 3(1):21-5.
- Khamboonruang, C., Thitasut, P. and Pan In S. 1976. The role of pig and rat in transmission of trichinosis. Proc of the fourth Intconf on Trichinellosis 1976:Univ Press. 545-50.
- Manning, GS., Lertprasert, P. and Watanasermkit 1971. A description of newly-discovered intestinal parasites. *J Med Assoc Thai* 467-74.
- Morakot, N., Juntraprasert, J., Srikaew, S. and Wongsawasdi, L. 1990. *Cryptosporidium* and *Giardia* infections among orphans in the home for boys. *Chiang Mai Med Bull* :29:41-4.
- Pariyanonda, S., Maleewong, W. and Chanarong, A. 1991. Scanning electron microscopy of the adults *Paragonimus heterotremus* in Phitsanulok, THAILAND *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 22(1):99-101.
- Pariyanonda, A. et al. 1999. Knowledge attitude and opinion on practice about food hygiene of samtam. *Thai J Epidemiol* 7(1):22-29.
- Pariyanonda, S. and Tesana S. 1990. Edible mollusc, the intermediate host of helminths. *Srinagarind Hosp Med J* 5(3):159-172.
- Phanarunothai, S., Sukmuong, U. and Tilokkert, M. 1988. Endemic area of Paragonimiasis. Region 6 Med J. (Ministry of Public Health Thailand) 2:1-8.
- Pawlowski, S. 1982. Clinical expression to *Taenia saginata* infection in man. *Proc First Inter Sympo Human Taeniasis* 138:20-24
- Pongmutsaya, P. 1994. Survey of *Angiostrongylus* sp. in snail and rat. M.Sc. Thesis Khon Kaen Uni.
- Punyagupta, S. et al. 1970. Eosinophilic meningitis in Thailand. *Am J Trop Med Hyg* 19:950-8.
- Radomyos, P., Bunnag, D. and Harinasuta, T. 1984. Worms recorded in stool following praziquantel treatment. *Arzheim/Forch Drug Res* 34:1215.
- Sakanari, J. A. and Mckerrow, J. H. 1989. Anisakiasis. *Clin Microbio Rev.* 2:278-284.
- Segal, D. B., Humphery, J. M. and Edwards, S. E. 1968. Parasites of man and domestic animals in Vietnam, Laos and Cambodia. *Exp Parasitol* 23:412-64.
- Sonakul, S. et al. 1978. Hepatic carcinoma with opisthorchiasis. *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 9:2215-9.
- Tesana, S., Mittrachai, J. and Chunsuttawat, S. 1982. Acute abdominal pain due to *M. hirudinaceus* infection: A case report. *Southeast Asian Trop Med Public Health* 13:262-4.
- Vanijanonta, S., Radomyos, P., Bunnag, D. and Harinasuta, T. 1981. Pulmonary paragonimiasis with expectoration of worm: A case report. *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 12:104-6.
- Vajarasthira, S., Harinasuta, C. and Maiphoom, C. 1958. Study on helminthic infection in Thailand: The incidence of paragonimiasis. *Jpn J Exp Med* 29:159-66.
- Yamachita, J. 1967. On Plagiorchis Found in Thailand. *Jpn J Parasit* 16:597.





บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
RESOURCES ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

ขอบข่ายการให้บริการของบริษัทฯ

- ◎ PROJECT PLANNING
- ◎ RECONNAISSANCE INVESTIGATION
- ◎ FEASIBILITY REPORTS
- ◎ ENVIRONMENTAL IMPACT STUDIES
- ◎ DETAILED DESIGNS
- ◎ SPECIFICATIONS AND CONTRACT DOCUMENTS
- ◎ COST ESTIMATES AND QUANTITY
- ◎ BID EVALUATION
- ◎ CONSTRUCTION SUPERVISION
- ◎ OPERATION AND MAINTENANCE
- ◎ FINAL REPORTS

สาขาการให้บริการของบริษัทฯ

- ◎ ENVIRONMENTAL ENGINEERING
- ◎ WATER RESOURCES DEVELOPMENT
- ◎ IRRIGATION
- ◎ HYDRO POWER
- ◎ WASTEWATER & DRAINAGE
- ◎ PORT & DOCK
- ◎ AIRPORT
- ◎ ROAD & BRIDGE
- ◎ BUILDING
- ◎ CONSTRUCTION MANAGEMENT

1518/7 PRACHARAJ 1 RD. BANGSUE BANGKOK 10800

TEL. 585-3534, 587-4198, 587-4403, 587-4937, 587-6409, 587-9398 Fax (662) 586-0948

E-mail : recfec@asiaaccess.net.th Web-site : <http://www.rec.u4l.com>

ดารณี ประภาสโนบล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900


ควนหลงจาก

Year **2000** Kilobyte

ปี ค.ศ. 2000 เป็นปีที่ทั่วโลกได้เฝ้ารอการมาถึงอย่างใจจดใจจ่อ เพราะเป็นปีสุดท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ 20 และยังเป็นปีที่ครบรอบสหัสวรรษ คือ 1,000 ปี พร้อมกับความตื่นเต้นั้น ก็นำมาซึ่งความหวั่นวิตกในอนาคตของโลกใบนี้ของเรา สาเหตุก็คือทุกคนได้รับรู้ปัญหาที่จะเกิดกับคอมพิวเตอร์ในปี ค.ศ. 2000 หรือที่เรียกว่าปัญหา Y2K เมื่อถึงปัจจุบันนี้ คำว่า “ปัญหา Y2K” ย่อมเป็นที่รับรู้กันในผู้คนทุกระดับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่เมื่อย้อนกลับไป 2-3 ปีก่อน ประเทศไทยของเรายังมีความเข้าใจถึงปัญหา Y2K น้อยมาก กระแสของปัญหา Y2K ในประเทศไทยทวีความเข้มข้นขึ้นในปี ค.ศ. 1998 ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้ระดมทรัพยากรเท่าที่จะหาได้ในภาวะ IMF มาแก้ไขปัญหา Y2K ดังนั้นเมื่อได้ข้ามเข้าสู่ปี ค.ศ. 2000 แล้วจึงใคร่นำผลที่ได้เกิดขึ้นจริงของปัญหา Y2K มานำเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบ

พร้อมกับการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปี ค.ศ. 2000 ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1999 ทุกประเทศในโลกได้เตรียมพร้อมรับมือปัญหา Y2K ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รัฐบาลตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อรับแจ้งเหตุและแก้ไขปัญหา ทุกหน่วยงานต้องจัดพนักงานประจำจำนวนหนึ่งเพื่อคอยรายงานสถานการณ์ ท่ามกลางความใจหายใจคว้าวุ่นระทึก และอดตาหลับ

ซัปตานอนของคนนับหมื่นนับแสนคนในแต่ละประเทศ การผ่านเข้าสู่ปี ค.ศ. 2000 ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่



ก็เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างที่นึกกลัวไว้ เช่น ซิปนาวุธนิวเคลียร์ถูกสั่งให้เริ่มทำงาน (activate) เนื่องจากนาฬิกาที่ใช้ควบคุมทำงานผิดพลาด เป็นต้น

การที่ไม่มีเหตุร้ายแรงนั้นเป็นเพราะมนุษย์ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Web Site CNN.Com เมื่อวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2000 รายงานไว้ว่า ภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้จ่ายเงินไป 8 ล้านล้านบาท (หรือ US \$200 billion) ในการป้องกันความหายนะอันอาจเกิดจากปัญหา Y2K John Koskinen ซึ่งเป็น Y2K Chief ของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้แถลงข่าวว่าสหรัฐอเมริกาใช้จ่ายเงินไป 4 ล้านล้านบาท (หรือ US \$100 billion) ตั้งแต่เริ่มแก้ไขปัญหาในปี ค.ศ. 1995 และส่วนที่เหลืออีก 4 ล้านล้านบาท (หรือ US \$100 billion)

เป็นค่าใช้จ่ายของทุกประเทศในโลกรวมกัน รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาใช้เงินไป 3.4 แสนล้านบาท (หรือ US \$8.5 billion) ในการเตรียมพร้อมหน่วยงานต่างๆ สำหรับการข้ามสู่ (rollover) ปี 2000 ดังนั้นการที่ได้มีข่าวว่าการแก้ไขปัญหา Y2K นั้นเป็นเรื่องที่ถูกฝรั่งหลอกเอาเงิน ถ้าหากดูจากค่าใช้จ่ายแล้ว จะเห็นว่าฝรั่งก็ใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อแก้ไขปัญหา Y2K เหมือนกัน

สำหรับประเทศไทยได้ใช้เงินในการแก้ปัญหา Y2K ในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ 1.4 พันล้านบาท และภาคเอกชน 2 หมื่นล้านบาท

รองนายกรัฐมนตรีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ได้แถลงที่ศูนย์บัญชาการ Y2K แห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะว่า ศูนย์บัญชาการฯ ไม่ได้รับการรายงานปัญหา Y2K ที่ร้ายแรงเลย จากจำนวนโทรศัพท์ทั้งหมด 1,693 ครั้ง ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม ถึง 4 มกราคม โทรศัพท์ส่วนใหญ่สอบถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหา Y2K และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟดับ น้ำประปาไม่ไหล และโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ลูกค้าบางคนของธนาคารพบว่าไม่สามารถเบิกเงินจากบัตร ATM ได้ แต่สาเหตุเนื่องมาจากบัตร ATM ที่ใช้หมดอายุไป ไม่ได้เกิดจากปัญหา Y2K

สำหรับปัญหา Y2K ที่เกิดในประเทศอื่น ๆ ก็มีเช่นในประเทศญี่ปุ่น เกิดปัญหาคอมพิวเตอร์ที่โรงงานไฟฟ้าปรมาณู 3 แห่ง ปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 8.58 น. ในวันที่ 1 มกราคม ที่โรงไฟฟ้าปรมาณู Fukushima Number 2 ของ Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) ระบบที่แสดงตำแหน่งของแท่งควบคุมในแกนเครื่องปฏิกรณ์หยุดการทำงาน ทำให้ผู้ควบคุมไม่สามารถวัดตำแหน่งแท่งควบคุมได้ เจ้าหน้าที่บริษัท TEPCO กล่าวว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของโรงไฟฟ้า ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบตำแหน่งของแท่งควบคุมได้ จนกระทั่งได้ค้นพบสาเหตุของปัญหา

วิศวกรของโรงไฟฟ้ายืนยันว่าแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า (power supply) และหน่วยประมวลผลกลางของระบบทำงานปกติ การตรวจสอบดำเนินไปจนกระทั่งเวลา 11.15 น. จึงได้พบว่าปัญหาเกิดจากนาฬิกาที่ใช้ในแผงวงจรที่ควบคุมจอแสดงผลได้ถูกตั้งเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2036 และหลังจากที่ได้ตั้งนาฬิกาใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 ระบบคอมพิวเตอร์ก็กลับสู่ภาวะปกติเมื่อเวลา 14.12 น. นอกจากนี้ก็เป็นปัญหาเล็กน้อย เช่น เกิดจากระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล


สำหรับชิปนาฬิกานิวเคลียร์นั้นรัสเซีย และสหรัฐอเมริกาได้ตั้งศูนย์บัญชาการร่วมที่ฐานทัพอากาศปีเตอร์สัน ที่โคโรลาโดสปริงส์ รัฐโคโรลาโด โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางทหารร่วมกันตรวจติดตาม (monitor) และแก้ไขปัญหอันอาจเกิดจากปัญหา Y2K ของชิปนาฬิกานิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ในศูนย์บัญชาการพากันหายใจสะดวกขึ้น หลังจากทีเครื่องหนึ่งของโลกผ่านเข้าสู่ปี ค.ศ. 2000 โดยไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกับระบบควบคุมชิปนาฬิกานิวเคลียร์

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งอาจเกิดปัญหา Y2K กับระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นอีก และเพิ่งจะผ่านไปเพียง 1 วันเมื่อเขียนบทความนี้ ปี ค.ศ. 2000 ถือว่าเป็นปีอธิกสุรทิน คือเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน โดยที่ปีใดก็ตามที่หารด้วย 4 ลงตัว จะนับเป็นปีอธิกสุรทิน แต่ปีที่ลงท้ายด้วยเลข 0 2 ตัว เช่น 2000 จะต้องหารด้วย 400 ลงตัว จึงจะนับว่าเป็นปีอธิกสุรทิน จากรายงานข่าว ประเทศที่พบปัญหา Y2K ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ก็คือญี่ปุ่นอีกตามเคย หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่ามีเครื่องบินตรวจติดตามภาคพื้นดิน จำนวน 43 เครื่อง จากจำนวน 1,300 เครื่อง ทำงานผิดพลาด นอกจากนี้เครื่อง ATM จำนวน 1,200 เครื่อง จากที่ทำกร

ไปรษณีย์ทั่วประเทศได้หยุดการทำงานชั่วคราว แต่ก็ได้รับการแก้ไขให้กลับมาทำงานได้ในเวลาบ่ายวันเดียวกัน สำหรับประเทศไทย ปัญหา Y2K เกิดขึ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นซอฟต์แวร์วินโดวส์ที่ใช้ในกระทรวงยุติธรรม แสดงวันที่เป็น 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1990 ส่วนคอมพิวเตอร์ประเภทเมนเฟรมของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่มีปัญหา Y2K เกิดขึ้น

ปัญหา Y2K เป็นปัญหาของคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 20 ซึ่งเกิดจากวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ที่เริ่มต้นจากคอมพิวเตอร์เครื่องแรก “ENIAC” ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1946 และพัฒนาอย่างช้า ๆ จนเข้าสู่ยุคไมโครคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์เป็นไปอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในระยะปี ค.ศ. 1998-1999 จนเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ต และ global network ในขณะที่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ยังเป็นของเดิมอยู่ เช่น โปรแกรมที่ใช้ในระบบธนาคาร ระบบการค้าปลีก การคำนวณใบเสร็จที่ส่วนใหญ่ใช้ปี ค.ศ. เป็นเลข 2 หลักจากปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นไป ทุกคนคงต้องเตรียมตัวเข้าสู่ยุคที่มีคอมพิวเตอร์เป็นตัวจักรสำคัญในการดำรงชีวิต เช่น E-Commerce, E-Banking และก็คงจะต้องมีปัญหาคู่ใหม่เกิดขึ้นเช่นกัน





ขอสนับสนุน
วารสาร "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เพื่อการวิจัย และพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์

สำนักงานใหญ่ 160 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 โทร. 036-341200, 341256, 341298 Fax 341425

สำนักงานศูนย์อำนวยการกลาง อ.ส.ค. กรุงเทพฯ 103 ถ.กำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-2792014-5, 2700719, 6184834 Fax 6184837

โรงงานนมมวกเหล็ก 160 ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

โทร. 036-341200, 341256, 341298 Fax 036-341425

โรงงานนมปรานบุรี 174 ถ.เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปรานบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทร. 032-621628-9 Fax 032-621837

โรงงานนมห้วยแก้ว 122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-223200 Fax 222474

โรงงานนมท่าพระ 343 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260

โทร. 043-346784-8, 261830 Fax 043-346-787

โรงงานนมสุโขทัย 198 หมู่ที่ 3 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร. 055-652284-9 Fax 055-652289



โรงเรียนบูรารักษ์


53/2 ม.4 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3


เปิดทำการสอน ว่ายน้ำ, คอมพิวเตอร์, พิมพ์ดีดไฟฟ้า

และสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ

โทร. 394-1109, 753-8723




เก้าอี้รถเข็น VS 3016



VS 3002

เครื่องช่วยฝึกเดิน



VS 1006

VS 1008

ไม้เท้าอลูมิเนียม ปรับสูงต่ำได้

แบบสามขา



บริษัท วี เอส เอ็นจิเนียริง จำกัด

V. S. ENGINEERING CO., LTD.

7, 9 จรัญฯ 83/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กทม. 10700


โทรเลขย่อ วีเซ่น กรุงเทพฯ

7, 9 Soi 83/1 Charunsanitwong Rd., Bangkok. Thailand

CABLE : VESEN BANGKOK

TEL. 435-7659, 885-3467 FAX : 885-3468

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์พื้นฟู และเครื่องช่วยคนพิการ




เครื่องฝึกยืน ปรับสูงต่ำด้วยไฟฟ้าและปรับมุมสองระบบ (ไฟฟ้าและมือหมุน)

Adjustable with Double Function Tilttable

เครื่องมือรักษาด้วยกระแสน้ำวน (แบบเคลื่อนที่)

Mobile Whirlpool

(Arm, Leg, Hip Whirlpool VS.8002 H)



ถังน้ำวนแบบแช่แขน ขา สะโพก ทำด้วยสแตนเลส ความหนา 1.5 มม. ขนาดกว้าง 20 นิ้ว ยาว 48 นิ้ว ลึก 28 นิ้ว ความสูงรวมล้อ 37 นิ้ว ความจุ 98 แกลลอน เครื่องพ่นน้ำจำนวน 1 ชุด ใช้มอเตอร์หมุน 2,750 รอบ/นาที ใช้ไฟ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ มี Electric Pump สำหรับถ่ายน้ำทิ้ง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบทำน้ำอุ่น Heating Element สามารถควบคุมน้ำในอ่างให้คงที่ระหว่างใช้งาน มีปุ่มปรับอุณหภูมิระหว่าง 30-60 องศาเซลเซียส ข้างถังมีเครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดขับเคลื่อนด้วยปรอท พร้อมหน้าปัดแสดงอุณหภูมิขนาด 4 นิ้ว

อ ก น ท น า ก า ร

จาก

โรงพิมพ์ ฟันนี้ พิมพ์ลิขซึ่ง

* ดั ว ห จิ* ฬั ห ฬั ฎ ฬั ด *

549/1 ซ.เสนานิคม 1 ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900

โทร. 579-3352, 579-1933, 579-7885

แ ฟ ก ษ์ . 5 6 1 - 1 9 3 3



บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
LIFE & ENVIRONMENT CO., LTD.

การจัดนำโครงการ เพื่อสู่มาตรฐานสากล

- ให้คำปรึกษาการทำมาตรฐานคุณภาพ และการประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบติดตามภาวะสิ่งแวดล้อมในโครงการ ISO 14000
- มีผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบบริหารงาน ISO 18000
- จัดทำโครงการ OSHA MEDICAL SURVEILLANCE PROGRAM
- จัดทำโครงการผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจและวิเคราะห์ ด้านคุณภาพน้ำ ดิน และภาคตะกอน

การตรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งตามวิธีมาตรฐาน AWWA ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ทิตเรส (TDS), ความเค็ม (Salinity), สารแขวนลอย (SS), โลหะหนัก (ปรอท, เซเลเนียม, แคดเมียม, ตะกั่ว, อาเซนิก, โครเมียม, บาริเยียม, นิเกิล, ทองแดง, สังกะสี, แมงกานีส), ซัลไฟด์, โซยาไนต์, ฟอสฟอรัส, ฟีนอล, คลอรีนอิสระ, เพสตีไซด์, ซี, กลิ่น, อุณหภูมิ, น้ำมันและไขมัน, บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), ทีเคเอ็น (TKN) นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์คุณภาพดินและภาคตะกอนด้วยวิธีการสกัด Leachate extraction procedure เพื่อวิเคราะห์โลหะหนักต่างๆ ได้แก่ อาเซนิก, บาริเยียม, เบนซีน, แคดเมียม, ตะกั่ว, ปรอท, เซเลเนียม, เจิน และอื่นๆ

การตรวจสภาพแวดล้อม ในบรรยากาศ

ให้บริการตรวจและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในบรรยากาศทางด้านกายภาพ เช่น เสียง แสง สั่นสะเทือน ทัศนทิวและความเร็วลม และการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมี ได้แก่ ประเภฝุ่น ไอระเหย และแก๊สต่างๆ เช่น ฝุ่น, ตะกั่ว, SO_x , NO_x , CO, Hydrocarbon และอื่นๆ



การตรวจคุณภาพอากาศ จากแหล่งกำเนิด (ปล่อยโรงงาน)

ให้บริการตรวจและวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องของโรงงานตามมาตรฐานทางวิชาการ (Environmental Protection Agency) โดยดำเนินการตรวจวัดทุกพารามิเตอร์ที่มีระบุไว้ในกฎหมาย เช่น ฝุ่น ฝุ่นของโลหะ (Sb, As, Cu, Pb, Hg) และก๊าซต่างๆ (Cl_2 , HCl, CO, H_2S , H_2SO_4 , SO_x , NO_x , Xylene)

ศูนย์บริการ :

- ตรวจสอบสุขภาพ และเวชศาสตร์อุตสาหกรรม
- ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการ
- ตรวจคุณภาพอากาศภายในบรรยากาศ
- ตรวจคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด
- ตรวจและวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาอุตสาหกรรม
- ตรวจและวิเคราะห์ด้านคุณภาพน้ำ ดิน และภาคตะกอน
- การจัดทำโครงการเพื่อสู่มาตรฐานสากล

โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเฉพาะสาขา
เชิญติดต่อรายละเอียดและขอรับบริการได้ที่
โทร: 320-0277-8, 320-0294
แฟกซ์ : 320-0293

ขอสนับสนุน
วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วท.

ด้วยอภิธานนาการ

จาก



แดง มั่งชู

DAENG MANGCHOO

บริษัท ศิริพร เมคคานิค จำกัด

SIRIPORN MECHANICS

100 790 หมู่ 6 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

หจก. ศิริพรการช่าง

เลขที่ 253 หมู่ 1 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. 7027717, 7026265, 3950722, 3954684, 3950910 FAX : 7026265 มือถือ 01-4843115

บ้าน 3880716 FAX : 3880716

ผู้ผลิตและติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ (STEAMBOILER) รับล้างหม้อน้ำอุตสาหกรรม
ติดตั้งหัวฉีดพ่นไฟ ระบบอัตโนมัติ สร้างเครื่องผลิตปลาป่นถังน้ำมัน
และเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

สารบัญแหล่งน้ำจืดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : 2. การแพร่กระจาย

อารัตน์ มหาชนธ์ . วรณชสุตา เณลิสมศิริ , วัชร กัลยาลัง , มยุรี ตั้งธนาคุณวัฒน์
และ วิลลภา อรุณไพโรจน์


ศูนย์จุลินทรีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900

บทคัดย่อ

ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างสาหร่ายจากแหล่งน้ำจืดในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) รวม 6 จังหวัด 23 เขต/อำเภอ จำนวน 300 ตัวอย่าง พบสกุลของสาหร่ายที่มีการแพร่กระจายอยู่น้อยในพื้นที่ (1-5 แห่งจาก 300 แห่ง หรือร้อยละ 0.3-1.7) ถึงร้อยละ 50 ของสกุลทั้งหมดที่พบ ส่วนสาหร่ายที่มีการแพร่กระจายสูงกว่าร้อยละ 20 มี 4 สกุล คือ *Chlorella*, *Phormidium*, *Scenedesmus* และ *Oscillatoria* (>25 แห่งจาก 300 แห่ง) พบเพียง 12 สกุล สกุลของสาหร่ายที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง ที่พบว่าการแพร่กระจายสูง มีการแพร่กระจายอยู่ร้อยละ 34.7, 25.0, 23.7 และ 22.7 ตามลำดับ

ABSTRACT

Study on distribution of microalgae in freshwater sources in Bangkok metropolitan area and the vicinity was investigated. Three hundred freshwater samples were collected from 23 districts in 6 provinces. (Bangkok, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan and Samut Sakhon). Approximately 50% of the genera were found in low distribution in 1 to 5 samples (0.3-1.7% distribution). Only 12 genera were found in high distribution (> 25 samples). From the algae found, more than 20% distribution were in the genera with high capability of adaptation of *Chlorella* 34.7%, *Phormidium* 25.0%, *Scenedesmus* 23.7% and *Oscillatoria* 22.7%.



แผนภาพที่ 1. กลุ่มของสาหร่ายในดิวิชัน Chlorophyta ที่สำรวจพบ

1. *Pediastrum duplex* var. *duplex* (x400)
2. *P. duplex* var. *gracillimum* (x400)
3. *P. simplex* (x400)
4. *Quadrigula sabulosa* (x400)
5. *Radiococcus bavaricus* (x400)
6. *Scenedesmus acuminatus* var. *acuminatus* (x400)
7. *S. acutiformis* (x400)
- 8.- 9. *S. acutus* (x400)
10. *S. armatus* (x400)
11. *S. armatus* var. *bicaudatus* (x400)
12. *S. bernardii* (x400)
13. *S. bicaudatus* (x400)
14. *S. bijiga* (x400)
15. *S. obliquus* (x400)

1. บทนำ

รายงานเรื่องสาหร่ายในแหล่งน้ำ
จัดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
: 2. การแพร่กระจาย เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานวิจัยเรื่องการสำรวจและเก็บ
รวบรวมสาหร่ายน้ำจืดจากแหล่ง
ต่างๆ ในธรรมชาติ:สาหร่ายในแหล่ง
น้ำจืดเขตกรุงเทพมหานครและปริม
ณฑล (BRT139040) ซึ่งดำเนิน
การโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)
โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษ
นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย (โครงการ BRT) มี
วัตถุประสงค์เพื่อทำการสำรวจและ

เก็บรวบรวมสาหร่ายน้ำจืดสาหร่ายจาก
แหล่งน้ำจืดที่สะอาดในพื้นที่กรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล อันได้แก่
จังหวัดนครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทร
ปราการ, นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่ง
พื้นที่ที่ทำการสำรวจนี้กำลังประสบ
ปัญหา ความเสื่อมโทรมของนิเวศ
วิทยาแหล่งน้ำอย่างรุนแรงและรวดเร็ว

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ


วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย ดังได้
กล่าวมาแล้ว (มหาชนธ์ และคณะ
2543) โดยทำการสำรวจและเก็บตัว
อย่างสาหร่ายจากแหล่งน้ำจืดที่สะอาด
300 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนมิถุนายน
2540 - มกราคม 2541 ในพื้นที่

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี,
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) รวม
6 จังหวัด 23 เขต/อำเภอ

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์

3.1 การแพร่กระจายของสาหร่าย ในแหล่งน้ำที่สำรวจ

ระดับความถี่ของการแพร่กระจาย
ของสาหร่ายในแต่ละสกุลจาก
ตัวอย่างที่เก็บ 300 แห่ง ได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 1 โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ คือ
การแพร่กระจายในพื้นที่สำรวจ 1-5
แห่ง, 6-10 แห่ง, 11-15 แห่ง, 16-
20 แห่ง, 21-25 แห่ง และมากกว่า
25 แห่ง ขึ้นไป การสำรวจแหล่งน้ำ



แผนภาพที่ 2. กลุ่มของสาหร่ายในดิวิชัน Chlorophyta และ Euglenophyta ที่สำรวจพบ

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Scenedesmus producto-capitatus</i> (x400) | 2.-3. <i>S. quadicauda</i> (x400) |
| 4. <i>S. spinosus</i> (x400) | 5. <i>Tetraedron minutissimum</i> (x400) |
| 6. <i>T. trigonum</i> (x400) | 7. <i>Tetrastrum glabrum</i> (x400) |
| 8. <i>Pandorina</i> sp. (x400) | 9. <i>Euglena gaumei</i> (x400) |
| 10. <i>Eudorina</i> sp. (x400) | |

จัดที่สะอาด 300 แห่ง ครั้งนี้พบว่า สกุลของสาหร่ายที่สำรวจพบจาก แหล่งน้ำในปริมาณน้อย คือ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 แห่ง จาก 300 แห่ง มี ปริมาณมากถึง 45 สกุล หรือ ประมาณครึ่งหนึ่งของสกุลที่สำรวจ พบทั้งหมด (91 สกุล) และจะเห็น ได้ว่าความถี่ของการแพร่กระจายที่สูง ขึ้น จำนวนสกุลของสาหร่ายที่สำรวจ พบจะมีน้อยลง ในขณะเดียวกันสกุล ของสาหร่ายที่สำรวจพบว่ามีค่าความถี่ มากกว่า 30 ตัวอย่างขึ้นไป จะเป็น สาหร่ายสีเขียว (Scenedesmus และ Chlorella) และสีน้ำเงินแกมเขียว (Oscillatoria และ Phormidium) ที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงต่อ ความเข้มข้นของสารอาหารในช่วง กว้าง และมีแนวโน้มว่าจะเป็นสกุล

ที่เป็นสาเหตุของการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วของสาหร่าย (algal bloom) ในแหล่งน้ำ ในขณะเดียวกัน ข้อมูลนี้ยังชี้ให้เห็นว่าหากคุณภาพน้ำ เปลี่ยนไปในทางที่เลวลง ความหลากหลายของสาหร่ายจะลดลง เนื่องจาก ไม่สามารถแข่งขันกับสาหร่ายสกุลที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง ซึ่ง มีความถี่ในการแพร่กระจายสูง อัน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สาหร่ายที่มี การแพร่กระจายต่ำสูญพันธุ์ได้ ทั้งนี้ อาจไม่นับสกุล Calothrix ซึ่งเป็น สาหร่ายหนาดิน (benthic algae) ที่ มีรายงานว่าเป็นสกุลที่มีการแพร่ กระจายสูงสุดจากการสำรวจและเก็บ ตัวอย่างดินนาทั่วประเทศ (วัลลิสุต 2531) ดังนั้นหากต้องการรักษา ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมี

ชีวิตในกลุ่มนี้ไว้จำเป็นต้องมีการ อนุรักษ์แหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีหรือ ทำการแยก (isolate) สายพันธุ์ สาหร่าย เหล่านั้น เพื่อทำการอนุรักษ์ นอกถิ่นกำเนิด (ex situ conservation) อย่างไรก็ตามแม้จะไม่เป็นการยาก นักในการแยกสายพันธุ์สาหร่ายที่ ต้องการเหล่านั้น แต่การเก็บรักษาให้ คงความมีชีวิตต้องมีการศึกษาสภาพ ที่เหมาะสมทั้งในแง่สูตรอาหารและ สภาพทางกายภาพ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ค่อนข้างสูง ดังนั้นผลประโยชน์ที่จะ ได้รับจากการเก็บรักษาสายพันธุ์นอก ถิ่นกำเนิด หรือในคลังเก็บรักษาสาย พันธุ์สาหร่ายจึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาด้วย

ตารางที่ 1. ระดับความถี่ของการแพร่กระจายของสาหร่ายที่สำรวจพบ

ความถี่ของการแพร่กระจาย (แห่ง จาก 300 แห่ง)	สกุลของสาหร่าย (จำนวน)
1-5	Agmenellum (1), Chrysosphaera (1), Cladophara (1), Coccomonas (1), Cyanodictyon (1), Cymbella (1), Dermocarpa (1), Dicellula (1), Eudorina (1), Franceia (1), Gomphonema (1), Gyrosigma (1), Hyaloraphidium (1), Pandorina (1), Pectodictyon (1), Pleurosigma (1), Schroederia (1), Sphaerocystis (1), Spirogyra (1), Stichococcus (1), Arthrospira (2), Calothrix (2), Coenocystis (2), Crucigenia (2), Gloeotheca (2), Golenkinopsis (2), Gomposphaeria (2), Hydrurus (2), Phacus (2), Protococcus (2), Quadrigula (2), Radiococcus (2), Stephanodiscus (2), Tetrastrum (2), Tolyphthrix (2), Microcoleus (3), Oedogonium (3), Oocystis (3), Pinnularia (3), Stigonema (3), Diatoma (4), Anacystis (5), Scytonema (5), Surirella (5), Tetrachlorella (5) รวม 45 สกุล
6-10	Aphanothece (6), Closterium (6), Euglena (6), Fischerella (6), Golenkinia (6), Kirchneriella (6), Tetraedron (6), Anabaenopsis (7), Botryococcus (7), Tabellaria (7), Cyclotella (8), Synedra (9) รวม 12 สกุล
11-15	Dictyosphaerium (11), Gloeocapsa (11), Gloeocystis (11), Ankistrodesmus (12), Chlorogloea (12), Nostoc (12), Anabaena (13), Tetrademus (13), Spirulina (14) รวม 9 สกุล
16-20	Chlamydomonas (16), Hapalosiphon (16), Microcystis (17), Pediatrum (17), Didymocystis (18), Fragilaria (19), Haematococcus (20), Nitzschia (20) รวม 8 สกุล
21-25	Plectonema (21), Coelastrum (22), Merismopedia (22), Achnanthes (23), Myxosarcina (24) รวม 5 สกุล
>25	Aphanocapsa (34), Monoraphidium (35), Chroococcus (43), Lyngbya (44), Navicula (44), Chlorococcum (48), Synechococcus (50), Synechocystis (53), Oscillatoria (68), Scenedesmus (71), Phormidium (75), Chlorella (104) รวม 12 สกุล


ตารางที่ 2 แสดงความถี่ในการแพร่กระจายของสาหร่ายที่สำรวจพบในระดับสกุลและชนิด ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีสาหร่ายที่มีความถี่ในการแพร่กระจายสูงกว่าร้อยละ 20 (6 แห่งจาก 300 แห่ง) จำนวน 4 สกุล คือ สาหร่ายในสกุล *Chlorella* มีการแพร่กระจายในตัวอย่างที่สำรวจมากที่สุด ถึง 104 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงไปได้แก่สกุล *Phormidium* จำนวน 75 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25 สกุล *Scenedesmus* จำนวน 71 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 23.7 สกุล *Oscillatoria* จำนวน 68 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 22.7 ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้สาหร่ายใน 4 สกุลดังกล่าวจะมีปริมาณน้อยในแต่ละตัวอย่าง แต่เป็นสาหร่ายที่มีการปรับตัวได้ดี และเนื่องจากมีการแพร่กระจายสูงในแหล่งน้ำต่าง ๆ จึงมักพบว่าสาหร่ายทั้ง 4 สกุล เป็นสาเหตุของการเจริญเติบโต

ได้อย่างรวดเร็วในน้ำเสีย โดยเฉพาะน้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน

ส่วนชนิดของสาหร่ายที่สามารถจัดจำแนกได้ที่สำรวจพบตั้งแต่ร้อยละ 5 ของตัวอย่าง เรียงตามลำดับมากไปน้อยได้แก่ *Synechocystis aquatilis* ร้อยละ 11.7, *Chlorococcum humicola* ร้อยละ 9.7, *Scenedesmus acutus* ร้อยละ 9.3, *Achnanthes exigua* และ *Chroococcus turgidus* ร้อยละ 6.7, *Chlorococcum infusionum* ร้อยละ 6.3, *Myxosarcina burmensis* และ *Phormidium molle* ร้อยละ 5.7, *Chlorella vulgaris*, *Aphanocapsa delicatissima* และ *Phormidium mucicola* ร้อยละ 5.3

เป็นที่น่าสังเกตในการศึกษาครั้งนี้ว่าพบสาหร่ายสีเขียวในกลุ่มเดสมิดส์ (desmids) เพียง 1 สกุลเท่านั้น คือ *Closterium* และโดยที่สาหร่ายใน

กลุ่มนี้มักเจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มี pH ค่อนข้างเป็นกรด ที่มีปริมาณสารอาหารต่ำโดยเป็นดัชนีบ่งชี้ปริมาณสารอาหารในชั้น oligotrophic (Wetzel 1983) แต่ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในการศึกษาครั้งนี้พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว pH ของแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษา ค่อนข้างเป็นกลาง (7.28) และมีปริมาณสารอาหารสูง (มหาพันธ์และคณะ 2543) นอกจากนี้ Hamada (1999) ยังรายงานว่าสาหร่ายในกลุ่มนี้มีความอ่อนไหว (sensitive-ness) เป็นอย่างมากต่อสารซักล้างทุกชนิด (ผงซักฟอก สบู่ แชมพู ฯลฯ) ด้วยการขยายตัวของเมืองและการขาดระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชน ประกอบกับคุณภาพของแหล่งน้ำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น จึงมีความเป็นไปได้ว่าสาหร่ายในกลุ่มนี้อาจสูญไปจากแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษาในอนาคต



แผนภาพที่ 3. กลุ่มของสาหร่ายในดิวิชัน **Chlorophyta** ที่สำรวจพบ

1. *Nostoc calcicola* (x400)
2. *N. commune* (x400)
3. *Stigonema* sp. (x400)
4. *Tolypothrix* sp. (x200)
5. *Arthrospira platensis* (x200)
6. *Lyngbya* (x400)
7. *L. hieronymusii* (x400)
8. *L. porphyrosiphonis* เกี่ยวพันบนเส้นสายของ *Oscillatoria* sp. (x400)
9. *L. shackletoni* "hormogenia" (x400)

ตารางที่ 2. การแพร่กระจายของสาหร่ายที่สำรวจพบ

ดิวิชั่น	สกุล			ชนิด				
	ชื่อ	ตัวอย่างที่พบ	จำนวน	ชื่อ	ตัวอย่างที่พบ	จำนวน		
Chlorophyta	<i>Ankistrodesmus</i>	12	(4.0%)	<i>bernardii</i>	3	(1.0%)		
				<i>densus</i>	5	(1.7%)		
				<i>falcatus</i>	2	(0.7%)		
				<i>fusiformis</i>	1	(0.3%)		
				sp.	1	(0.3%)		
	<i>Botryococcus</i>	7	(2.3%)	<i>braunii</i>	6	(2.0%)		
				<i>calcareus</i>	1	(0.3%)		
				spp.	16	(5.3%)		
	<i>Chlamydomonas</i>	16	(5.3%)	<i>ellipsoidea</i>	8	(2.7%)		
	<i>Chlorella</i>	104	(34.7%)		<i>vulgaris</i>	16	(5.3%)	
					spp.	84	(28%)	
				<i>Chlorococcum</i>	48	(16.0%)	<i>humicola</i>	29
	<i>Cladophora</i>	1	(0.3%)	<i>infusium</i>	19	(6.3%)		
				sp.	1	(0.3%)		
				<i>Closterium</i>	6	(2.0%)	<i>acerosum</i>	2
	<i>Coccomonas</i>	1	(0.3%)	<i>leibleinii</i>	1	(0.3%)		
				<i>praelangum</i>	1	(0.3%)		
				<i>moniliferum</i>	2	(0.7%)		
				<i>orbicularis</i>	1	(0.3%)		
				<i>planctinica</i>	2	(0.7%)		
				<i>astroideum</i>	4	(1.3%)		
				<i>microsporum</i>	8	(2.7%)		
				<i>morus</i>	5	(1.7%)		
				<i>reticulatum</i>	7	(2.3%)		
				sp.	1	(0.3%)		
	<i>Crucigenia</i>	2	(0.7%)	<i>quadrata</i>	1	(0.3%)		
				sp.	1	(0.3%)		
				<i>planctonica</i>	1	(0.3%)		
	<i>Dicellula</i>	1	(0.3%)	<i>granulatum</i>	2	(0.7%)		
	<i>Dictyosphaerium</i>	11	(4.0%)		<i>pulchellum</i>	5	(1.7%)	
					sp.	4	(1.3%)	
				<i>Didymocystis</i>	18	(6.0%)	<i>bicellularis</i>	17
	<i>planctonica</i>	1	(0.3%)					
	sp.	1	(0.3%)					
	<i>javanica</i>	1	(0.3%)					
	<i>gigas</i>	3	(1.0%)					
	<i>Gloeocystis</i>	11	(3.7%)	<i>major</i>	9	(3.0%)		
				<i>paucispina</i>	2	(0.7%)		
				<i>radiata</i>	2	(0.7%)		
				spp.	2	(0.7%)		
<i>solitaria</i>				2	(0.7%)			
<i>Golenkinopsis</i>	2	(0.7%)	<i>lacustris</i>	7	(2.3%)			
			<i>pluvialis</i>	9	(3.0%)			
			sp.	6	(2.0%)			
<i>Haematococcus</i>	20	(6.7%)	sp.	1	(0.3%)			
<i>Hyaloraphidium</i>	1	(0.3%)	<i>contorta</i>	5	(1.7%)			
			<i>lunaris</i>	1	(0.3%)			
			<i>arcuatum</i>	1	(0.3%)			
			<i>Kirchneriella</i>	6	(2.0%)			
<i>Monoraphidium</i>	35	(11.7%)						

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ดิวิชัน	สกุล			ชนิด		
	ชื่อ	ตัวอย่างที่พบ	จำนวน	ชื่อ	ตัวอย่างที่พบ	จำนวน
Chlorophyta				<i>braunii</i>	8	(2.7%)
				<i>caribeum</i>	3	(1.0%)
				<i>circinale</i>	2	(0.7%)
				<i>contortum</i>	13	(4.3%)
				<i>dybowskii</i>	2	(0.7%)
				<i>griffithii</i>	7	(2.3%)
				<i>pusillum</i>	1	(0.3%)
				spp.	2	(0.7%)
				spp.	3	(1.0%)
				<i>solitaria</i>	1	(0.3%)
				spp.	2	(0.7%)
				sp.	1	(0.3%)
				sp.	1	(0.3%)
				<i>Pediastrum</i>	17	(5.7%)
				<i>boryanum</i>	5	(1.7%)
				<i>duplex</i>	7	(2.3%)
				<i>simplex</i>	4	(1.3%)
				spp.	2	(0.7%)
				<i>viridis</i>	2	(0.7%)
				<i>closteriodes</i>	1	(0.3%)
				<i>sabulosa</i>	1	(0.3%)
				<i>bavaricus</i>	1	(0.3%)
				<i>planktonicus</i>	1	(0.3%)
				<i>acuminatus</i>	10	(3.3%)
				<i>acutiformis</i>	7	(2.3%)
				<i>acutus</i>	28	(9.3%)
				<i>arucuatus</i>	1	(0.3%)
				<i>armatus</i>	18	(6.0%)
				<i>bernardii</i>	4	(1.3%)
				<i>bicaudatus</i>	2	(0.7%)
				<i>bijuga</i>	9	(3.0%)
				<i>faecatus</i>	1	(0.3%)
				<i>lefevrii</i>	1	(0.3%)
				<i>obliquus</i>	5	(1.7%)
				<i>ovalternus</i>	1	(0.3%)
				<i>praetervirus</i>	1	(0.3%)
				<i>producto-capitatus</i>	1	(0.3%)
Chlorophyta				<i>quadricauda</i>	13	(4.3%)
				<i>quadrispina</i>	1	(0.3%)
				<i>serratus</i>	2	(0.7%)
				<i>spinulatus</i>	1	(0.3%)
				<i>spinosus</i>	1	(0.3%)
				spp.	3	(1.0%)
				sp.	1	(1.0%)
				<i>schroeteri</i>	1	(1.0%)
				sp.	1	(0.3%)
				sp.	1	(0.3%)
Chlorophyta				<i>alternans</i>	2	(0.7%)
				<i>coronata</i>	2	(0.7%)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ดิวิชัน	สกุล			ชนิด		
	ชื่อ	ตัวอย่างที่พบ	จำนวน	ชื่อ	ตัวอย่างที่พบ	จำนวน
Chrysophyta				sp.	1	(0.3%)
	<i>Tetrademus</i>	13	(4.3%)	<i>cumbricus</i>	13	(4.3%)
	<i>Tetraedron</i>	6	(2.0%)	<i>arthrodesmiforme</i>	1	(0.3%)
				<i>caudatum</i>	1	(0.3%)
				<i>minutissimum</i>	1	(0.3%)
				<i>regulare</i>	1	(0.3%)
				<i>trigonum</i>	1	(0.3%)
				sp.	1	(0.3%)
	<i>Tetrastrum</i>	2	(0.7%)	<i>glabrum</i>	2	(0.7%)
	<i>Achnanthes</i>	23	(7.7%)	<i>conspicua</i>	1	(0.3%)
				<i>exigua</i>	20	(6.7%)
				<i>lanceolata</i>	1	(0.3%)
				<i>linearis</i>	1	(0.3%)
	<i>Chrysosphaera</i>	1	(0.3%)	<i>gallica</i>	1	(0.3%)
	<i>Cyclotella</i>	8	(2.7%)	<i>meneghiniana</i>	3	(1.0%)
				sp.	5	(1.7%)
	<i>Cymbella</i>	1	(0.3%)	sp.	1	(0.3%)
	<i>Diatoma</i>	4	(1.3%)	spp.	4	(1.3%)
	<i>Fragilaria</i>	19	(6.3%)	<i>capucina</i>	2	(0.7%)
Chrysophyta				<i>crotonensis</i>	1	(0.3%)
				<i>virescens</i>	1	(0.3%)
				spp.	15	(5.0%)
	<i>Gyrosigma</i>	1	(0.3%)	<i>obtusatum</i>	1	(0.3%)
	<i>Gomphonema</i>	1	(0.3%)	sp.	1	(0.3%)
	<i>Hydrusus</i>	2	(0.7%)	<i>foetidus</i>	2	(0.7%)
	<i>Navicula</i>	44	(14.7%)	<i>agustata</i>	1	(0.3%)
				<i>exigua</i>	3	(1.0%)
				<i>minima</i>	5	(1.7%)
				<i>muralis</i>	10	(3.3%)
				<i>petersenii</i>	1	(0.3%)
				spp.	24	(8.0%)
	<i>Nitzschia</i>	20	(6.7%)	<i>palea</i>	14	(4.7%)
				<i>radiosa</i>	1	(0.3%)
				spp.	5	(1.7%)
	<i>Pinnularia</i>	3	(1.0%)	<i>biceps</i>	1	(0.3%)
				<i>major</i>	1	(0.3%)
				sp.	1	(0.3%)
	<i>Pleurosigma</i>	1	(0.3%)	sp.	1	(0.3%)
Chrysophyta	<i>Stephanodiscus</i>	2	(0.7%)	sp.	2	(0.7%)
	<i>Surirella</i>	5	(1.7%)	<i>angustata</i>	3	(1.0%)
				<i>tenera</i>	1	(0.3%)
				sp.	1	(0.3%)
	<i>Synedra</i>	9	(3.0%)	<i>fascicula</i>	1	(0.3%)
				<i>minuscula</i>	1	(0.3%)
				<i>ulna</i>	4	(1.3%)
				spp.	3	(1.0%)
	<i>Tabellaria</i>	7	(2.3%)	<i>fenestrata</i>	4	(1.3%)
				sp.	3	(1.0%)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ดิวิชั่น	สกุล			ชนิด		
	ชื่อ	ตัวอย่างที่พบ	จำนวน	ชื่อ	ตัวอย่างที่พบ	จำนวน
Cyanophyta	<i>Agmenellum</i>	1	(0.3%)	sp.	1	(0.3%)
	<i>Anabaena</i>	13	(4.3%)	<i>fertilissima</i>	1	(0.3%)
				<i>lutea</i>	5	(1.7%)
Cyanophyta				<i>siamensis</i>	7	(2.3%)
	<i>Anabaenopsis</i>	7	(2.3%)	<i>arnoldii</i>	2	(0.7%)
				<i>circularis</i>	1	(0.3%)
				<i>elenkinii</i>	2	(0.7%)
				<i>reciborskii</i>	1	(0.3%)
				sp.	1	(0.3%)
	<i>Anacystis</i>	5	(1.7%)	<i>compacta</i>	4	(1.3%)
				sp.	1	(0.3%)
	<i>Aphanocapsa</i>	34	(11.3%)	<i>biformis</i>	8	(2.7%)
				<i>delicatissima</i>	16	(5.3%)
				<i>elachista</i>	2	(0.7%)
				<i>koordersi</i>	2	(0.7%)
				<i>montana</i>	1	(0.3%)
				<i>pulchra</i>	1	(0.3%)
				<i>roeseana</i>	1	(0.3%)
				spp.	3	(1.0%)
	<i>Aphanothece</i>	6	(2.0%)	<i>castagnei</i>	1	(0.3%)
				<i>microscopica</i>	2	(0.7%)
				<i>nidulans</i>	1	(0.3%)
				<i>saxicola</i>	1	(0.3%)
				<i>stagnina</i>	1	(0.3%)
	<i>Arthrospira</i>	2	(0.7%)	<i>platensis</i>	2	(0.7%)
	<i>Calothrix</i>	2	(0.7%)	sp.	2	(0.7%)
	<i>Chlorogloea</i>	12	(4.0%)	<i>fritschii</i>	10	(3.3%)
				<i>microcystoides</i>	2	(0.7%)
	<i>Chroococcus</i>	43	(14.3%)	<i>cohaerens</i>	1	(0.3%)
				<i>gomontii</i>	4	(1.3%)
				<i>hansgirgi</i>	2	(0.7%)
				<i>limneticus</i>	1	(0.3%)
				<i>minor</i>	6	(2.0%)
				<i>minutus</i>	7	(2.3%)
				<i>pallidus</i>	2	(0.7%)
				<i>turgidus</i>	20	(6.7%)
				spp.	2	(0.7%)
Cyanophyta	<i>Cyanodictyon</i>	1	(0.3%)	<i>reticulatum</i>	1	(0.3%)
	<i>Dermocarpa</i>	1	(0.3%)	<i>leibleiniae</i>	1	(0.3%)
	<i>Fischerella</i>	6	(2.0%)	spp.	6	(2.0%)
	<i>Gloeocapsa</i>	11	(3.7%)	<i>atrata</i>	1	(0.3%)
				<i>calcareae</i>	1	(0.3%)
				<i>compacta</i>	4	(1.3%)
				<i>crepidinum</i>	1	(0.3%)
				<i>livida</i>	2	(0.7%)
				<i>polydermatica</i>	3	(1.0%)
	<i>Gloeotheca</i>	2	(0.7%)	<i>palea</i>	1	(0.3%)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ดิวิชั่น	สกุล			ชนิด		
	ชื่อ	ตัวอย่างที่พบ	จำนวน	ชื่อ	ตัวอย่างที่พบ	จำนวน
Cyanophyta	<i>Gomphosphaeria</i>	2	(0.7%)	<i>samoensis</i>	1	(0.3%)
				<i>sp.</i>	2	(0.7%)
				<i>baronii</i>	1	(0.3%)
	<i>Hapalosiphon</i>	16	(5.3%)	<i>fontinalis</i>	3	(1.0%)
				<i>hibernicus</i>	1	(0.3%)
				<i>intricatus</i>	1	(0.3%)
	<i>Lyngbya</i>	44	(14.7%)	<i>welwitschii</i>	7	(2.3%)
				<i>spp.</i>	3	(1.0%)
				<i>baculum</i>	1	(0.3%)
				<i>birgei</i>	6	(2.0%)
				<i>contorta</i>	1	(0.3%)
				<i>cryptovaginata</i>	5	(1.7%)
				<i>hieronymusii</i>	2	(0.7%)
				<i>lachneri</i>	1	(0.3%)
				<i>lagerheimii</i>	1	(0.3%)
				<i>majuscula</i>	5	(1.7%)
				<i>nordgardhii</i>	1	(0.3%)
				<i>porphyrosiphonis</i>	2	(0.7%)
				<i>putealis</i>	2	(0.7%)
				<i>rivularianum</i>	1	(0.3%)
				<i>shackletoni</i>	4	(1.3%)
				<i>spiralis</i>	13	(4.3%)
				<i>spp.</i>	2	(0.7%)
	<i>Merismopedia</i>	22	(7.3%)	<i>aeruginea</i>	3	(1.0%)
				<i>elegans</i>	2	(0.7%)
				<i>punctata</i>	13	(4.3%)
				<i>minima</i>	1	(0.3%)
				<i>tenuissima</i>	1	(0.3%)
				<i>sp.</i>	2	(0.7%)
				<i>subtorulosus</i>	1	(0.3%)
				<i>spp.</i>	2	(0.7%)
	<i>Microcoleus</i>	3	(1.0%)	<i>aeruginosa</i>	11	(3.7%)
				<i>incerta</i>	1	(0.3%)
				<i>pulverea</i>	1	(0.3%)
				<i>robusta</i>	2	(0.7%)
	<i>Microcystis</i>	17	(5.7%)	<i>spp.</i>	2	(0.7%)
				<i>burmensis</i>	17	(5.7%)
				<i>spectabilis</i>	9	(3.0%)
				<i>calcicola</i>	1	(0.3%)
	<i>Myxosarcina</i>	24	(8.0%)	<i>coeruleum</i>	1	(0.3%)
				<i>paludosum</i>	3	(1.0%)
				<i>piscinale</i>	1	(0.3%)
				<i>punctiforme</i>	2	(0.7%)
	<i>Nostoc</i>	12	(4.0%)	<i>rivulare</i>	2	(0.7%)
				<i>spp.</i>	4	(1.3%)
				<i>acuminata</i>	2	(0.7%)
				<i>agardhii</i>	3	(1.0%)
	<i>Oscillatoria</i>	68	(22.7%)	<i>amoena</i>	14	(4.7%)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ดิวิชัน	สกุล			ชนิด						
	ชื่อ	ตัวอย่างที่พบ	จำนวน	ชื่อ	ตัวอย่างที่พบ	จำนวน				
Cyanophyta	Oscillatoria	75	(25.0%)	annae	4	(1.3%)				
				chlorina	2	(0.7%)				
				jasorvensis	8	(2.7%)				
				laete-virens	2	(0.7%)				
				lemmermannii	1	(0.3%)				
				limnetica	3	(1.0%)				
				limosa	5	(1.7%)				
				okeni	2	(0.7%)				
				splendida	2	(0.7%)				
				subbrevis	9	(3.0%)				
				subtilissima	5	(1.7%)				
				subuliformis	3	(1.0%)				
				spp.	15	(5.0%)				
				angustissimum	10	(3.3%)				
				calcicola	1	(0.3%)				
				foveolarum	2	(0.7%)				
				hieronymusii	1	(0.3%)				
				jenkelianum	5	(1.7%)				
				molle	17	(5.7%)				
				mucicola	16	(5.3%)				
				tenuis	14	(4.7%)				
				spp.	13	(4.3%)				
				Plectonema	21	(7.0%)	dangeardii	8	(2.7%)	
				gracillimum	3	(1.0%)				
				hansgirgi	3	(1.0%)				
				notatum	5	(1.7%)				
				puteale	2	(0.7%)				
				Scytonema	5	(1.7%)	bohneri	1	(0.3%)	
				chiastum	2	(0.7%)				
				hofmanni	1	(0.3%)				
				sp.	1	(0.3%)				
				Spirulina	14	(4.7%)	major	2	(0.7%)	
				maxima	5	(1.7%)				
				meneghiniana	2	(0.2%)				
				platensis	1	(0.3%)				
				subsulsa	4	(1.3%)				
				subtilissima	2	(0.7%)				
				Stigonema	3	(1.0%)	spp.	3	(1.0%)	
				Cyanophyta	Synechococcus	50	(16.7%)	aeruginosus	10	(3.3%)
								cedrorum	11	(3.7%)
								elongatus	19	(6.3%)
								spp.	16	(5.3%)
								aquaticus	35	(11.7%)
pevalekii	6	(2.0%)								
spp.	11	(3.7%)								
Tolypothrix	2	(0.7%)	tenuis					2	(0.7%)	
Euglenophyta	Euglena	6	(2.0%)					gaumei	2	(0.7%)
								spp.	4	(1.3%)
Euglenophyta	Phacus	2	(0.7%)	spp.	2	(0.7%)				

3.2 แนวทางการใช้สาหร่ายที่สำรวจพบเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ

ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติบางประการของสาหร่ายที่สำรวจพบบางสกุล/ชนิดที่มีรายงานในต่างประเทศ (Palmer 1977) เห็นได้ว่า

ตารางที่ 3 ครอบคลุมเพียงบางส่วน ของสาหร่ายที่สำรวจพบในการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น ยังมีส่วนที่เหลืออีกมาก เป็นสิ่งที่นักสาหร่ายวิทยาในประเทศไทยต้องทำการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นเช่นเดียว

กับที่พบในต่างประเทศหรือไม่ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ต่างประเทศใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ ทั้งนี้ นอกจากชนิดที่พบแล้ว ปริมาณของชนิดที่พบ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ประกอบในการจัดเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ

ตารางที่ 3. แสดงคุณสมบัติบางประการของสาหร่ายที่สำรวจพบบางสกุล/ชนิดที่มีรายงานในต่างประเทศ (Palmer 1977)

สาหร่าย	กลุ่ม ¹	คุณสมบัติ ²
<i>Agmenellum</i>	BG	E, SP, St
<i>Anabaena</i>	BG	E, SP, St, T
<i>Anabaenopsis</i>	BG	SP
<i>Anacystis</i>	BG	E, I, SP, St
<i>Ankistrodesmus</i> :	G	E, I, SP, St
<i>falcatus</i>		PF, PI, SP
<i>Botryococcus braunii</i>	G	PI
<i>Calothrix</i>	BG	E, SP
<i>Chlamydomonas</i>	FI	I, PE, SP, St, T
<i>Chlorella</i> :	G	I, E, SP, St
<i>ellipsoidea</i>		PI
<i>vulgaris</i>		PF
<i>Chlorococcum humicola</i>	G	PF, SP, St
<i>Cladophora</i>	G	A, E, SP, St
<i>Closterium</i> :	De	E, I, SP, St
<i>acerosum</i>		PF
<i>minoliferum</i>	F	
<i>Coelastrum microporum</i>	G	E, PF, PI, St
<i>Crucigenia quadrata</i>	G	PI, SP, St
<i>Cyclotella</i> :	D	E, I, SP, St
<i>meneghiniana</i>		F, PF
<i>Cymbella</i>	D	SP, St
<i>Dermocarpa</i>	BG	SP
<i>Diatoma</i>	D	E
<i>Dictyosphaerium</i> :	G	SP, St
<i>pulchellum</i>		F, PI
<i>Eudorina elegans</i>	FI	PI, PF, SP
<i>Euglena FI</i>		E, I, St, SP
<i>Fragilaria</i> :	D	E, SP
<i>apucina</i>		PI
<i>crotonensis</i>		E, PI, St, F
<i>Gloeocystis</i> :	G	E, SP
<i>gigas</i>		A
<i>Golenkinia radiata</i>	G	PI, SP, St
<i>Gomphonema</i>	D	I, SP, St
<i>Gyrosigma</i>	D	E
<i>Hydrurus</i>	YG	C
<i>Kirchneriella</i> :	G	SP
<i>lunaris</i>		PI
<i>Lyngbya</i> :	BG	E, SP
<i>lagerheimii</i>		A
<i>putealis</i>		A

ตารางที่ 3 (ต่อ)

สาหร่าย	กลุ่ม ¹	คุณสมบัติ ²
<i>Microcoleus subtorulosus</i>	BG	C, PE
<i>Navicula:</i>	D	E, I, PE, SP, St
<i>exigua</i>		C
<i>Nitzschia:</i>	D	E, I, SP, St
<i>palea</i>		A, I, PF, F
<i>Oedogonium</i>	G	A, I, SP
<i>Oocystis</i>	G	E, SP, St
<i>Oscillatoria:</i>	BG	E, I, SP, St
<i>agardhii</i>		PI
<i>chlorina</i>		PF
<i>limosa</i>		PF
<i>splendida</i>		F, PF
<i>Pandorina morum</i>	FI	E, I, PI, SP, T
<i>Pediastrum:</i>	F	E, SP, St
<i>boryanum</i>		PF, PI
<i>duplex</i>	PI	
<i>Phacus FI</i>		I, SP, St
<i>Phormidium</i>	BG	A, F, I, SP, St
<i>Pinnularia</i>	D	SP
<i>Pleurosigma</i>	D	PI
<i>Scenedesmus:</i>	G	E, I, SP, St
<i>bijuga</i>		PI
<i>obliquus</i>		PF
<i>quadricauda</i>		PF, PI
<i>Sphaerocystis schroeteri</i>	G	E, PI, SP
<i>Spirogyra</i>	G	A, E, SP
<i>Spirulina:</i>	BG	E, SP
<i>major</i>		A, PE
<i>subtilissima</i>		SP
<i>Stephanodiscus</i>	D	E
<i>Stichococcus</i>	G	SP
<i>Surirella:</i>	D	E, SP, St
<i>angustata</i>	PI	
<i>Synedra:</i>	D	E, I, SP, St, T
<i>ulna</i>		PF, T
<i>Tabellaria:</i>	D	E, F, St, T
<i>fenestrata</i>		F, T
<i>Tetrademus</i>	G	SP
<i>Tetraedron</i>	G	SP
<i>Tetrastrum</i>	G	SP
<i>Tolypothrix tenuis</i>	BG	A

หมายเหตุ¹กลุ่ม: D, ไดอะตอม; G, สาหร่ายสีเขียว; BG, สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว; FI, แฟล็กเจลเลต; De, เดลมิต


²คุณสมบัติ: A, ยึดเกาะ; C, น้ำสะอาด; E, น้ำที่มีปริมาณสารอาหารสูง(eutrophication); F, อุดตันเครื่องกรอง(filter clogging); I, ดัชนีชี้คุณภาพน้ำ; PF, น้ำจืดสกปรก; PI, แพลงก์ตอนพืชในทะเลสาบ; SP, ป่อน้ำทิ้ง; St, ลำธาร; T, เกิดกลิ่นและรส

3.3 แนวทางการใช้ประโยชน์

ตารางที่ 4 แสดงศักยภาพการนำสาหร่ายที่สำรวจพบมาใช้ประโยชน์ ที่แสดงเป็นเพียงศักยภาพ บางส่วนที่มีการศึกษาวิจัย แต่ใน

ความเป็นจริงแล้วสาหร่ายยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอื่น ๆ หรือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย ดังนั้นหากมีการเก็บรักษาสาหร่ายที่สำรวจพบไว้ โอกาสในการค้น

หาและคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในอนาคต ก็จะมีมากขึ้นตามลำดับ



แผนภาพที่ 4. กลุ่มของสาหร่ายในดิวิชัน Chlorophyta ที่สำรวจพบ

1. *Lyngbya spiralis* (x400)
2. *Oscillatoria annae* (x400)
3. *O. laete-virens* (x400)
4. *O. limnetica* (x400)
5. *O. limnetica* (x400)
6. *O. subbrevis* (x400)
7. *O. subtilissima* (x400)
8. *Oscillatoria* sp. (x400)
9. *Oscillatoria* sp. (x400)
10. *Phormidium* "bundle" (x400)
11. *Phormidium calcicola* (x400)
12. *P. molle* (x400)
13. *P. mucicola* (x400)

14. *P. mucicola* ในกลุ่มเซลล์ของ *Microcystis aeruginosa* (x400) 15. *Plectonema hansgiri* (x400) 16. *Spirulina subsalsa* (x400)

ตารางที่ 4. แสดงศักยภาพการนำสาหร่ายที่สำรวจพบมาใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์	สาหร่ายที่คัดเลือก
ด้านสิ่งแวดล้อม	
ผลิตพลังงานสะอาด (H_2)	Chlorophyta/ Cyanophyta ที่มีประสิทธิภาพในการผลิต แก๊สไฮโดรเจน เช่น <i>Chlamydomonas</i>
กำจัดมลพิษในอากาศ (NO_x , SO_x)	Chlorophyta ชนิดที่เจริญเติบโตได้ดีที่ pH ต่ำมาก เช่น <i>Chlorella</i> , <i>Scenedesmus</i>
กำจัดน้ำเสีย (อินทรีย์/ อนินทรีย์/ สารพิษ/ โลหะหนัก)	Chlorophyta เช่น <i>Chlorella</i> , <i>Scenedesmus</i> Cyanophyta เช่น <i>Aphanothece</i> , <i>Chroococcus</i> , <i>Oscillatoria</i> , <i>Phormidium</i>
ด้านการเกษตร	
ปุ๋ยชีวภาพ	Cyanophyta ในกลุ่มที่ตรึงไนโตรเจนได้ เช่น <i>Anabaena</i> , <i>Calothrix</i> , <i>Fischerella</i> , <i>Hapalosiphon</i> , <i>Nostoc</i> , <i>Scytonema</i> , <i>Stigonema</i> , <i>Tolypothrix</i>
สารปรับปรุงโครงสร้างดิน	Chlorophyta/ Cyanophyta ในกลุ่มที่สร้าง polysaccharide เช่น <i>Chlamydomonas</i> , <i>Nostoc</i>
สารกำจัดศัตรูพืช	Cyanophyta ในกลุ่มที่สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้านแมลง และโรคพืช เช่น <i>Fischerella</i> , <i>Hapalosiphon</i> , <i>Scytonema</i>
อาหารสัตว์	Chlorophyta เช่น <i>Chlorella</i> , <i>Haematococcus</i> , <i>Scenedesmus</i> Cyanophyta เช่น <i>Arthrospira</i> , <i>Spirulina</i>
อุตสาหกรรม	
อาหารเสริมสุขภาพ	Chlorophyta เช่น <i>Chlorella</i> Cyanophyta เช่น <i>Spirulina</i> , <i>Nostoc</i>
สารสี	Chlorophyta เช่น <i>Haematococcus</i> Cyanophyta เช่น <i>Anabaena</i> , <i>Spirulina</i> , <i>Haematococcus</i>
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (polyunsaturated fatty acid)	Cyanophyta เช่น <i>Spirulina</i>
เภสัชภัณฑ์	Cyanophyta ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ต้านจุลินทรีย์สาเหตุโรค, สารยับยั้งเอนไซม์, สารที่เป็นพิษต่อเซลล์ เช่น <i>Fischerella</i> , <i>Hapalosiphon</i> , <i>Scytonema</i>

4. สรุปผลการวิจัย

สำรวจและเก็บรวบรวมสาหร่ายพืชน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ย่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 300 ตัวอย่าง เพื่อศึกษาถึงการแพร่กระจายของสาหร่ายพืชน้ำในแหล่งน้ำ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ประมาณร้อยละ 50 ของสกุลของสาหร่ายที่สำรวจพบ (45 จาก 91 สกุล) มีการแพร่กระจายต่ำในพื้นที่ โดยสำรวจพบเพียง 1-5 แห่งจากแหล่งน้ำ 300 แห่ง สาหร่ายที่พบว่ามีอัตราการแพร่กระจายสูง (พบมากกว่า 25 แห่ง) มีเพียง 12 สกุล

2. สาหร่ายที่พบว่ามีอัตราการแพร่กระจายสูงกว่าร้อยละ 20 ของตัวอย่างที่

สำรวจเป็นสาหร่ายที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียว คือ *Chlorella* (ร้อยละ 34.7) และ *Scenedesmus* (ร้อยละ 23.7) และกลุ่มสีน้ำตาลแกมเขียว คือ *Phormidium* (ร้อยละ 25.0) และ *Oscillatoria* (ร้อยละ 22.7)


5. กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ (BRT 139040) และขอขอบคุณท่านที่ปรึกษา วท. น.ส. พูนสุข อัดทะสัมปณณะ ในการตรวจแก้ไขรายงานฉบับนี้


6. เอกสารอ้างอิง

- มหาพันธ์, อาภารัตน์; เฉลิมศิริ, วรณชสุตา; กัลยาธิง, วัชรวิ; ตั้งธนาวัฒน์, มยุรี; สัปปีนันท์, ทวี; สุชาการ, ชาตรี; เล็กรุ่งเรืองกิจ, จรัสรัตน์; บาลัน, รัฐพงษ์; พูนสวัสดิ์, ปฐมพร; ทิมกุล, สุชาติ และ อรุณไพโรจน์, วัลลภา. 2543. สาหร่ายในแหล่งน้ำจืด เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : 1. องค์ประกอบของชนิด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, หน้า 3-20.
- วัลลิสุต, สมถวิล. 2531. การศึกษาการแพร่กระจายและคัดเลือกสาหร่ายสีน้ำตาลแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนได้เพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- Hamada, J. 1999. Effect of detergent on *Closterium ehrenbergii*. The 23rd Annual Meeting of the Japanese Society of Phycology. March 27-30, 1999. Yamagata, Japan.
- Palmer, M.C. and Square, K. 1977. Algae and Water Pollution. U.S. Environmental Protecting Agency, Ohio, U.S.A.
- Wetzel, R.G. 1983. Limnology. Saunders College Publishing, Philadelphia, U.S.A.





ยำ!!!!!!



ฮิปโปเป็นญาติกับปลาวาฬ

จากการศึกษาทางพันธุกรรมพบว่าสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับปลาวาฬมากที่สุดคือฮิปโป ซึ่งค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์แห่ง Tokyo Institute of Technology โดยทำการพัฒนาวิธีใหม่ค้นหากลับไปยังประวัติศาสตร์การวิวัฒนาการของสัตว์ โดยใช้ DNA เมื่อล้านปีที่ผ่านมา


สัตว์ทุกๆ ชนิดจะสืบทอดสายพันธุ์ทาง DNA โดยเฉพาะในแต่ละ species ของมัน โดยลักษณะเฉพาะของบรรพบุรุษนี้จะปรากฏบน DNA เฉพาะที่ที่เราเรียกว่า genetic code หรือ genome จากการเปรียบเทียบ DNA ของสัตว์หลายๆชนิด นักวิจัยสามารถจะปรับปรุงแก้ไขการจำแนกและจัดประเภทของสัตว์ตามต้นตระกูลดั้งเดิมให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ผลจากการศึกษาดังกล่าวทำให้ทราบว่าปลาวาฬและปลาโลมามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ วัว อูฐ และหมู มากกว่า ม้า ช้าง และพะยูน นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าอูฐได้วิวัฒนาการในสายพันธุ์นานกว่าสัตว์ 4 ขา ที่กินหญ้าประเภทอื่นๆ

เมื่อ 100 ล้านปีมาแล้วได้มีการค้นพบว่าปลาวาฬมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางสายพันธุ์กับสัตว์ที่มีเท้าก็บ แต่นับตั้งแต่บัดนั้นมาจึงไม่มีการจัดให้ละเยียดลงไปกว่านั้นเนื่องจากส่วนหนึ่งของปัญหาคือการที่ปลาวาฬ

ได้เปลี่ยนหรือพัฒนาอวัยวะของมันไปสู่สภาพแวดล้อมทางน้ำ ขาหลังได้หายไปและขาหน้าได้เปลี่ยนเป็นครีบ ดังนั้นหากจะทำการสืบสายพันธุ์ปลาวาฬกับสัตว์เท้าก็บต้องทำการศึกษาด้วยวิธีอื่น

ฮิปโปและปลาวาฬมีความสามารถพิเศษในการพัฒนาในน้ำหลายอย่างคล้ายๆกัน รวมทั้งการหายใจของชนิดต่อมบางชนิด และการพูดติดต่อสื่อสารกันใต้น้ำ (จาก the Proceedings of the National Academy of Sciences โดย Marsato Nikaido) ลักษณะที่คล้ายคลึงกันเหล่านี้

สามารถนำมาประมวลถึงความสามารถในทำนองเดียวกันในการปรับและพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในน้ำพอที่ศาสตราจารย์ Nikaido ระบุว่าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้มาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ปลาวาฬปัจจุบันได้เคยถูกเชื่อว่าสืบสายโลหิตมาจากปลาวาฬดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วเมื่อ 50 ล้านปีก่อน แต่ต่อมาได้มีความเชื่อใหม่ว่าปลาวาฬปัจจุบันได้สืบทอดสายพันธุ์มาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ชื่อ mesonuychians จากการศึกษาของศาสตราจารย์ Nikaido รวมกับสมมติฐานต่างๆ ได้มีข้อคิดเห็นว่าจะมีส่วนเชื่อมโยงบางส่วนที่สูญหายไประหว่างปลาวาฬตัวแรกกับ mesonuychians ถ้ามันเกี่ยวพันกันจริงๆ ซึ่งหากมีการค้นพบก็จะเป็นที่ชื่นชมแก่บรรดานักชีววิทยาทั้งหลาย ซึ่งคงจะต้องรอฟังผลกันต่อไปในอนาคต



ที่มา : -BBC News, Tuesday, August 31, 1999.

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัทเซลส์, เบลเยียม



ย่...น

ช่องโหว่ของโอโซนในบรรยากาศโลก

จากการตรวจสอบของ The National Oceanic and Atmospheric Administration ที่ Boulder มลรัฐโคโลราโด พบว่าในปี 2542 ช่องโหว่ของโอโซนในบรรยากาศโลกเล็กกว่าที่บันทึกไว้ในปี 2541 สิ่งนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าบรรยากาศโลกมีความสามารถที่จะพลิกฟื้นตัวจากสภาพมลพิษอันเนื่องมาจากก๊าซเรือนกระจก

ช่องโหว่ของโอโซนเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ Stratosphere เหนือทวีปแอนตาร์กติกา (Antarctica) ในบริเวณขั้วโลกใต้เมื่อแสงอาทิตย์ซึ่งส่องมายังบริเวณนี้ไปกระตุ้นเร่งปฏิกิริยาเคมี

ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมี มลพิษจำพวกคลอรีนและโบรมีนอันทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction) อันนำไปสู่การทำลายก๊าซโอโซนในบรรยากาศในที่สุด

จากการตรวจวัดโดยใช้ดาวเทียมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 พบว่าช่องโหว่ของโอโซนเล็กกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย โดยครอบคลุมพื้นที่ 25 ล้านตารางกิโลเมตร เทียบกับพื้นที่ 27.2 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งตรวจพบในปีที่แล้ว และจากเครื่องมือตรวจวัดโดยดาวเทียมและบอลลูนแสดงจำนวนปริมาณก๊าซโอโซนเหนือ

Antarctica เพิ่มขึ้นจาก 90 Dobson Units ในต้นเดือนตุลาคม 2541 เป็น 92 Dobson Units ในเดือนตุลาคมปี 2542

ขณะเดียวกันนักวิจัยยังพบว่าปริมาณสารเคมีในบรรยากาศที่ทำลายชั้นโอโซนเริ่มคงที่ไม่สูงขึ้น ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการร่วมมือกันในระดับนานาชาติด้วยอนุสัญญาต่างๆ และคาดว่าจะใช้เวลาอีก 10 ปีหรือมากกว่านั้นก่อนที่จะช่องโหว่ของก๊าซโอโซนจะลดขนาดลงในขนาดที่เล็กกว่านี้


ที่มา : Science News, October 23, 1999)

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา

นมเย็นกับขนมปังหวาน

วิธีการที่ดีที่สุดในการรับประทานขนมปังหวานให้ได้รับรสชาติ มิใช่การรับประทานกับน้ำชาหรือกาแฟ หากแต่จะต้องรับประทานกับนมช็อกโกแลตเย็น นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Nottingham ประเทศอังกฤษพบว่า การดื่มนมเย็นจะช่วยทำให้ได้รสชาติของขนมปังหวานในปาก ในขณะที่เครื่องดื่มร้อนๆ จะล้างรสชาติเหล่านั้นก่อนที่ปากและจมูกจะมีโอกาสได้ลิ้มรส และดมกลิ่น

การศึกษากระทำโดย Dr. Len Fisher นักวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล สาขาวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการจุ่มขนมปังหวานลงไปในน้ำชา ซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ประกอบกับเขาได้สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อขนมปังหวานดูดซึมของเหลว



รวมทั้งการแนะนำเทคนิคในการจุ่มด้วย

การศึกษาใหม่นี้ใช้เครื่องมือการทดลองที่มีเทคโนโลยีสูงในการวัดกลิ่นและรสที่ถูกปล่อยออกมาจากจมูกและปาก โดยทดลองกับขนมปังหวานและเครื่องดื่มหลายๆ ชนิด การทดลองได้พยายามผสมผสานหลายๆ แบบ โดยใช้หลอดเล็กๆ ใส่เข้าไปในรูจมูก เพื่อสูดตัวอย่างของการหายใจและนำมาวิเคราะห์ในเครื่อง Nose Space machine จากเครื่องมือดังกล่าว ปริมาณอากาศจำนวนน้อยจากการหายใจแต่ละครั้งจะผ่านเข้าไปสู่

ช่องต่างๆ ที่สามารถวัดกลิ่นทางเคมีได้หลากหลาย และจะปรากฏผลทางจอคอมพิวเตอร์

ผลจากการค้นคว้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทขนมปังหวาน McVitie's ปรากฏออกมาว่า เครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับขนมปังหวาน มิใช่ชาหรือกาแฟ หากแต่เป็นนมเท่านั้น ซึ่งนมจะทำให้ได้รับรสชาติของขนมปังหวาน มากเป็น 11 เท่าของการรับประทานขนมปังหวานเพียงอย่างเดียว Dr. Fisher กล่าวว่า นมเป็นตัวที่ทำให้เกิดเม็ดไขมันแขวนลอยในน้ำที่จำเป็น ซึ่งเม็ดไขมันเหล่านั้นจะอยู่



ยานอวกาศ

ภายในบริเวณปาก และจะเป็นตัวจับกลืนและรสของขนมปังหวาน ทำให้ผู้บริโภคได้รับกลิ่นและรสผ่านเข้าสู่สมอง สำหรับช็อกโกแลตนั้น มีส่วนช่วยเนื่องจากมันมีไขมันภายในตัวของมันเอง (cocoa solids) ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดผลด้วยเช่นกัน

ภายหลังการค้นคว้า 2 เดือนจากการทดสอบขนมปังหวานและเครื่องดื่มมากกว่า 200 ชนิด ปรากฏผลออกมาว่า สารที่ช่วยในการย่อย

จะปล่อยรสชาติของขนมปังหวานออกมาดังนี้

- 11 เท่า เมื่อดื่มกับนมช็อกโกแลตเย็น

- 8 เท่า เมื่อดื่มกับนมร้อน

- 7 เท่า เมื่อดื่มกับน้ำส้ม

การรับประทานให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับทางเลือกสิ่งที่จะรับประทานร่วมกันโดยผลจากการทดลองนี้จะมีประโยชน์สำหรับธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด

ที่มา : BBC News Tuesday, November 9, 1999.

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรัสเซลส์, เบลเยียม

สิ่งซ่อนเร้นภายใต้ทะเลสาบ Antarctic

จากการประชุมของนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย Cambridge ได้ถกเถียงกันถึงการขุดเจาะทะเลสาบภายใต้มหาสมุทร Antarctic ถึงร่องรอยของการปรากฏว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่เหมือนดังเช่นบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี ทะเลสาบ Vostok นับเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ใต้มหาสมุทร Antarctic 4 กิโลเมตร และนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า มีรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ถูกค้นพบในทะเลสาบนี้ ทั้งยังเชื่อกันว่าภายใต้พื้นที่ 10,000 ตารางกิโลเมตรของทะเลสาบอาจจะมี sub-glacial oceans เหมือนที่มีบน Jovian moon บนดาว Europa

หากรูปแบบของชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้ทะเลสาบ Vostok นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ารูปแบบของชีวิตดังกล่าวจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นกันใน Europa แต่การขุดเจาะผ่านน้ำแข็งไปสู่ทะเลสาบได้ถูกระงับด้วยเกรงกันว่าอาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อลงสู่แหล่งน้ำได้

ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ 70 คนจาก 14 ประเทศได้ประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญทางวิทยาศาสตร์สำหรับก้าวต่อไปในการสำรวจ Dr.Cynan Ellis-Evans แห่ง British Antarctic Survey กล่าวว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับระดับชั้นความสำคัญของวิทยาการอวกาศ ซึ่งพวกเขามีข้อมูลมากเกี่ยวกับน้ำแข็งและชั้นหินรอบๆ พื้นที่ แต่ตัวทะเลสาบเองยังแฝงปัญหาอีกมหาศาลที่พวกเขายังไม่รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะรู้รูปแบบของชีวิตในทะเลสาบนั้น ทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบที่เก่าแก่มาก และหากมีรูปแบบของชีวิตอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และจะสร้างความผิดพลาดในการค้นหาไม่ได้

เมื่อยานอวกาศ Galileo ของ Nasa ผ่านดาว Europa ก็พบว่าดวงจันทร์ของดาว Europa มีสภาพเหมือน Antarctica โดยดวงจันทร์จะถูกปกคลุมโดยแผ่นน้ำแข็ง ซึ่งมีมหาสมุทรซ่อนอยู่ภายใต้

Frank Carfey แห่ง Nasa กล่าวว่า สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Europa คือน้ำ เพราะจากการคำนวณพบว่า Europa คือมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล ทะเลสาบ Vostok จะเป็นแหล่งสำหรับการทดสอบเทคโนโลยีที่ผิดไปกว่าที่อื่นๆ และเป็นที่ยกย่อง Nasa จะมีโอกาสประยุกต์ใช้ นักวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าหาสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่บนพื้นโลก ทะเลสาบนี้อยู่ภายใต้แผ่นน้ำแข็งของ Eastern Antarctica ในเขตของรัสเซียที่ชื่อว่า Russian Vostok Station จากการประมาณการอายุของทะเลสาบนี้อยู่ในช่วง 100,000-1,000,000 ปี

ที่มา : BBC News, Monday, September 27, 1999.

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรัสเซลส์, เบลเยียม



กาวจากถั่วเหลือง

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย Kansas State สหรัฐอเมริกา ได้ทำการทดลองผลิตกาวจากถั่วเหลืองที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น และกันน้ำได้ โดยที่กรรมวิธีการผลิตนั้นไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกับกาวที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งมีวิธีการค่อนข้างสร้างมลภาวะ การผลิตกาวจากถั่วเหลืองใช้วิธีดัดแปลงโปรตีนถั่วเหลืองในทางเคมี เพื่อให้เกิดการ



คล้ายตัวออก ทำให้เกิดพื้นที่ในส่วนที่
กันน้ำบนพื้นผิวของโมเลกุล ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญ จากการทดลอง พบว่า
เมื่อทากาวเพื่อประกบไม่ให้ติดกัน
กาวบริเวณรอยเชื่อมต่อมีความแข็ง
แรงทนทานกว่าบริเวณไม่เสียด้วยซ้ำ
แม้จะทำการทดลองแช่น้ำ และเป่า
แห้งเป็นเวลา 48 ชั่วโมงต่อครั้ง
บริเวณรอยเชื่อมต่อของกาวก็ยังคง
สนิทแน่นดี

ที่มา: Science Reporter, ฉบับ
January 1999
นฤมล รื่นไวย

ทำไมคนเราต้องแสดงท่า

ทางเวลาพูด

ภาษาท่าทาง (gesture) หรือการ
แสดงท่าทางเวลาพูดนั้น ถือเป็น
ภาษากายอย่างหนึ่งที่สื่อข้อมูลให้ผู้ฟัง
ในลักษณะของการแสดงอาการ
ประกอบเป็นข้อมูลเสริมคำพูด แต่
นักวิจัยก็สงสัยว่า ทำไมคนเราจึงต้อง
แสดงท่าทางเวลาพูดประกอบไปด้วย
ในเบื้องต้นได้มีการตั้งข้อสมมติฐานว่า
การออกท่าทางเวลาพูดของคนเรา ก็
คงเป็นพฤติกรรมเลียนแบบที่มอง
เห็นจากคนอื่น ๆ แต่จากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย Chicago พบว่า คน
ที่ตาบอดมาแต่กำเนิด ก็แสดงท่าทาง
เวลาพูดด้วยเช่นกัน ทั้งที่ไม่เคยเห็น
ภาษาท่าทางต่างๆ แม้สักนิด จาก

งานวิจัยสรุปว่า ทั้งคนตาบอดและคน
ตาดี ต่างแสดงภาษาท่าทางที่ไม่แตก
ต่างกันเท่าใดนัก และแสดงท่าอย่าง
เดียวกันเมื่อพูดถึงเรื่องเดียวกัน
นอกจากนั้นเมื่อคนตาบอดพูดกับคน
ตาบอดด้วยกัน ต่างคนก็แสดงท่าทาง
ด้วยกันทั้งคู่ ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า
การแสดงท่าทางประกอบคำพูด ไม่
ใช่การเลียนแบบพฤติกรรมซึ่งกันและ
กัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ในการพูดหรือการสื่อสาร ซึ่งเกิดจาก
สัญชาตญาณมนุษย์นั่นเอง

ที่มา: Science Reporter, ฉบับ
January 1999

นฤมล รื่นไวย

การคลอดโดยวิธีผ่าตัดช่วย

ลดอัตราการติดเชื้อ

AIDS จากมารดาได้

สตรีมีครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัส AIDS
สามารถลดอัตราการเสี่ยงที่จะแพร่
เชื้อไวรัส AIDS สู่บุตรของตนขณะ
คลอดได้ ถ้าหากเลือกวิธีผ่าตัด (Ce-
sarean section หรือ C-section)
แทนการคลอดแบบธรรมชาติ จาก
งานวิจัย ใน Boston พบว่า จากการ
วิเคราะห์การเกิดของทารก 8,533
ราย ของมารดาที่ได้รับเชื้อไวรัส AIDS
จะมีการติดต่อกันของเชื้อดังกล่าว
จากมารดาสู่ทารกถึงร้อยละ 20.

อย่างไรก็ตามจากการวิจัยราย
ย่อยหลายราย ก็ได้พบว่า ในกรณี
ที่มารดาติดเชื้อ AIDS และใช้วิธี C-
section ในการคลอด ทำให้อัตรา
เสี่ยงในการติดเชื้อของทารกลดลง
โดยสังเกตจากมารดาในกลุ่มที่ไม่ได้
รับการรักษาโรค AIDS ด้วยยา ส่วน
ในกลุ่มมารดาที่ทำการรักษาด้วยยา
AZT นั้น อัตราการเสี่ยงของการติด
เชื้อของทารกจะลดลงร้อยละ 2 ใน
กรณีที่เลือกการคลอดโดยวิธี C-sec-
tion ในขณะที่สตรีที่มีการคลอดโดย
วิธีธรรมชาติ หรือทำการ C-section
โดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อน
จะมีอัตราในการแพร่เชื้อสู่ทารกเพิ่ม
ขึ้นถึงร้อยละ 7.3

ที่มา: VATIS UPDATE : Biotech-
nology, Vol. 1, No. 36 Mar-Apr 1999

นฤมล รื่นไวย



"การใช้นิวเคลียร์เทคนิคพัฒนาภาคตะกอนไปเป็นทรัพยากรใหม่"



พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2542
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2542



โดย ดร. สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ และ นฤมล รื่นไวย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900


ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเป็น การวิจัยเกี่ยวกับด้านอะไรบ้าง

โครงการวิจัยที่ได้รับประกอบด้วย
โครงการย่อยทั้งหมด 30 กว่าโครงการ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่ได้รับรางวัล
มีผู้ร่วมโครงการ 20 กว่าคน ส่วนที่ 1
จะเป็นการศึกษาองค์ประกอบ พยาธิ
สภาพ และความเป็นพิษ ส่วนที่ 2
คือการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อโรคและ
พยาธิ และการใช้ปริมาณรังสีที่
เหมาะสมในการฆ่าเชื้อโรคและพยาธิ
ส่วนที่ 3 การนำกลับมาใช้ใหม่ คือ
การทดลองนำมาทำปุ๋ยในผักบึง พืชไร่
เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และ

พืชสวน แล้วก็การทดลองนำภาค
ตะกอนไปเลี้ยงสัตว์ คือเลี้ยงปลา
เลี้ยงหมู การเลี้ยงปลานิล เราได้
ทดลองขยายการเลี้ยงลงในบ่อดิน
เป็นเชิงการค้า ปรากฏว่ามีผลผลิต
เพิ่มขึ้นประมาณ 20% และมีผล
กำไรตอบแทนเพิ่มขึ้น ประมาณ
100% ส่วนการทดลองเลี้ยงสุกร
ด้วยอาหารสัตว์ผสมภาคตะกอน ได้
มีการผ่าซากสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อตรวจ
โลหะหนัก พยาธิสภาพทุกส่วนและ
ในอวัยวะต่างๆ ปรากฏว่า ตับหมูมี
การสะสมของตะกั่วเกินมาตรฐาน
กำหนดของกระทรวงสาธารณสุข จึง

ไม่แนะนำให้บริโภคส่วนที่เป็นตับ
แต่ขอเน้นว่า เฉพาะตับหมูที่ผ่านการ
เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมภาคตะกอน
เท่านั้นนะคะ แต่ปัจจุบัน ยังไม่ได้มี
การนำไปเลี้ยงกับหมูในท้องตลาด
ที่ต้องย้ำเพราะเวลาเราไปจัด
นิทรรศการแล้วคนมักจะตกใจ ดังนั้น
หมูในท้องตลาดยังคงรับประทานได้

นอกจากนั้น เรายังนำภาคตะกอน
ไปทดลองเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมโรค
พืชโดยชีววิธี คือเอาภาคตะกอนไป
เลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ทำให้เกิด
โรคโคนเน่าของมะเขือเทศ ผล
ปรากฏว่าป้องกันได้ และมะเขือเทศ



เจริญเติบโตได้ดี แล้วก็นำไปทดลองเพาะเห็ด เอาไปทอดแทนดินพื้ท เอามาเลี้ยงไรโซเบียมเพื่อตรึงไนโตรเจนจากอากาศ

ประวัติความเป็นมาของโครงการที่ได้รับรางวัลนี้เป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงคิดค้นทำโครงการนี้ขึ้นมา

ในฐานะที่ทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายนิเวศวิทยารังสี ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มงานในสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เราก็ต้องทำเรื่องเกี่ยวกับรังสีหรือนิวเคลียร์ ก็พยายามคิดว่าในแง่ของสิ่งแวดล้อมหรือนิวเคลียา รังสีหรือนิวเคลียร์จะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง คือโครงการเริ่มประมาณปี พ.ศ. 2524 เป็นงานการใช้รังสีในสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่หนักช่วงนั้นที่สื่อมวลชนและนักวิชาการพูดกันทั่วไปคือเรื่อง น้ำเสีย คือตอนนั้นประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาน้ำเสียมาก โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่มีความเจริญมากอย่างเช่น เขตกรุงเทพฯหรือในเขตอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่นคลองหลอด น้ำจะดำเน่า

เหม็นเป็นฟองก๊าซขึ้นมา คือแทนที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เสียทัศนียภาพไป เราก็มองว่ารังสีจะช่วยอะไรได้บ้าง โดยธรรมชาติของรังสีนี้จะมีความสามารถอยู่อย่างหนึ่งคือ ช่วยฆ่าเชื้อโรค ฆ่าพยาธิได้ ในขั้นตอนแรก เราก็มองว่ารังสีจะฆ่าเชื้อโรคและพยาธิได้ไหม ในมาตรฐานทางด้านน้ำทั่วไป อย่างในน้ำดื่ม มาตรฐานของ WHO จะกำหนดไว้ว่าน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานจะต้องมีเชื้อจุลินทรีย์ไม่เกิน 500 โคโลนีต่อกรัมหรือ มล. จะต้องมี MPN

(Most Probable Number) คือเป็นหน่วยของการตรวจวัด จะต้องมี MPN ของ โคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 ต่อ 100 มล.แล้วจะต้องตรวจไม่พบ *E. coli* มีเกณฑ์ 3 ตัวนี้ในการตรวจวัด เราคาดว่า มาตรฐานน้ำทั้งทางด้านอุตสาหกรรมไม่มีแบคทีเรีย แต่ในต่างประเทศจะมีข้อกำหนด อย่างมาตรฐานน้ำทั้งของสิงคโปร์หรือยุโรป มีกำหนดว่า น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะต้องมีโคลิฟอร์มไม่เกินเท่าไรต่อ 100 มล. ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ เราก็เลยมาดูว่ารังสีจะช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ตรงนี้ได้ไหม เราก็ไปเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงพยาบาล มาตรวจดู ค่าที่เราตรวจก็จะมี total count, MPN ของโคลิฟอร์ม และก็ *E. coli* หลังจากเราใช้รังสีระดับต่างๆ แล้ว ปริมาณจุลินทรีย์ก็ลดลงถึงขั้นที่ *E. coli* หหมด เพราะ *E. coli* นี้เป็นเชื้อโคลิฟอร์มที่บ่งชี้ความสกปรกของน้ำ ถ้ามี *E. coli* อยู่มันจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แล้วตัวนี้เองก็จะเป็นตัวบ่งชี้เนื่องจาก *E. coli* มีอยู่ในลำไส้ของสัตว์เลื้อยคลาน ก็แสดงว่าถ้าพบ *E. coli* ในตัวอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือน้ำ



แสดงว่ามีการปนเปื้อนอุจจาระของสัตว์เลื้อยคืบ เพราะฉะนั้นถ้าเราฉายรังสีเพื่อที่จะทำลาย *E. coli* ได้ หรือลดปริมาณโคลิฟอร์มลงให้เหลือน้อยตามมาตรฐานน้ำทิ้งได้ เราก็ถือว่ามันมีส่วนช่วยในแง่ของสิ่งแวดล้อมได้ ตอนนั้นเรายังไม่ได้มองในแง่ของทางเคมีหรือกายภาพ ก็ศึกษามานาน

หลังจากน้ำทิ้งก็เริ่มมามองในแง่ของภาคตะกอนที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ถ้าเราบำบัดน้ำเสียแล้วด้วยวิธีปกติที่เราใช้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น activated sludge, ไร้อากาศ หรือว่าเป็น facultative พวกนี้ มันเป็นเทคโนโลยีที่เราซื้อมาจากต่างประเทศ เราก็จะซื้อมาทั้งหมดเลย ระบบบำบัดน้ำเสียนี้มันก็กำเนิดมาจากยุโรปหรืออเมริกา เราก็ยังไม่สามารถพัฒนาระบบของเราเองได้ ก็ต้องเอาของเขามาแก้ปัญหา ในส่วนของระบบนั้น เราคงใช้รังสีไปทำอะไรไม่ได้ แต่เราจะดูตรงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ปกติหลังจากบำบัดน้ำแล้ว มันก็จะมีกากตะกอนหรือของแข็งไปตามอัตราส่วนต่างๆ กันในน้ำก่อนที่จะออกจากระบบบำบัดเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพราะฉะนั้นรังสีก็จะช่วยตรงนี้ ตอนนั้นก็ได้เผยแพร่ลงในวารสารต่างๆ เวลาที่มีการประชุมก็ไปเสนอผลงาน แล้วต่อมาก็มีการศึกษาทดลองใช้รังสีเพื่อฟอกสีน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม คือมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการร้องเรียนมายังสำนักงานรัฐมนตรี แล้วมีการส่งเรื่องมายังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ว่าบริษัทฟอกย้อมสีแห่งหนึ่งมีการปล่อยน้ำเสียสีต่างๆ เช่น สีฟ้า สีม่วง ออกมา ชาวสวนแถวนั้นก็ร้องเรียนว่าน้ำที่ไหลผ่านเข้าไปในสวนผลไม้มันไม่สามารถจะใช้ได้ เพราะมีสีเจือปน แล้วบางส่วนก็ทำให้ต้นไม้ของเขตายทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ก็มาเชิญสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อ



สันติ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านวิศวกรรมน้ำเสีย อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็มาประชุมร่วมกัน เราก็เอามาทดลองฉายรังสีเริ่มตั้งแต่ 1 กิโลเกรย์จนกระทั่งถึง 10 กิโลเกรย์ แล้วเราก็เอาผลของเราไปให้เขาดู ปรากฏว่าผลออกมาดีมาก จากน้ำสีฟ้าที่เราฉายรังสี 1 กิโลเกรย์ ผลปรากฏว่าเม็ดสีตกตะกอนออกมาเหมือนคริสตัล แล้วน้ำก็ใสเกือบเท่าน้ำกลั่นแต่ถ้าฉาย 2 กิโลเกรย์จะใสเหมือนน้ำกลั่น ปรากฏว่าคณะกรรมการฯ ก็พอใจมาก ทางที่ประชุมก็อยากจะให้ใช้รังสี เราก็บอกว่าการนำไปใช้ขณะนี้ยังใช้ไม่ได้ เพราะการใช้รังสีกับน้ำเสียที่เราทดลองนี้เราใช้โคบอลต์-60 เวลาฉายรังสีเราต้องไปติดตั้งเครื่อง ต้องมีโรงงานฉายรังสีซึ่งค่าใช้จ่ายแพงมาก คิดว่าโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละโรงคงไม่มีต้นทุนที่จะมาสร้างโรงงานฉายรังสีเพื่อบำบัดน้ำเสียได้ ยกเว้นแต่ว่าจะเป็น การนิคมที่มีโรงงานหลายๆ แห่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ปล่อยสีออกมาในน้ำเสียปริมาณมากๆ เหมือนกัน อย่างกรณีการตั้ง โรงงานฉายรังสีที่คลอง 5 ทางแคนาดามาช่วยลง

ทุนให้ประมาณ 100 ล้านเหรียญ เป็นค่าเครื่องจักรและเทคโนโลยีแล้ว ก็ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนรัฐบาลไทยจะออกในด้านที่เป็นสิ่งก่อสร้าง เขาก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาอบรมคนของเราเพื่อที่จะเป็นคนควบคุม คือคนที่ทำหน้าที่ในการฉายรังสีในโรงงานนั้น ต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร ต้นทุนทั้งหมด 100 ล้านเหรียญก็แพง ก็เลยสรุปได้ว่าเขาเห็นว่าเป็นวิธีที่ดีแต่แพงเกินไป

การใช้งานอีกประเภทหนึ่งได้แก่การฉายรังสีเพื่อทำลาย pesticides หรือยาฆ่าแมลง จากผลงานของอินเดียฉายรังสีประมาณ 2 กิโลเกรย์สามารถทำลาย DDT ได้หมดเลย แต่จะมีปัญหาว่า DDT จะเปลี่ยนรูปไปเป็นฟอร์มอื่น เรียกว่าได้ผลในการทำลาย ส่วน pesticides บางประเภทก็ลดปริมาณลง ส่วนการนำไปใช้อาจจะยาก เพราะยาฆ่าแมลงที่เกษตรกรจะใช้ฉีดตามสวน ท้องร่อง ท้องนา ก็จะอยู่ในลักษณะมลพิษที่กระจัดกระจายไป (diffuse pollution) ไม่อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง ก็ยากแก่การบำบัด



ส่วนการศึกษาเรื่องกากตะกอนก็เริ่มในช่วงปลายๆ ของการศึกษาเรื่องน้ำทิ้ง เพื่อจะดูเรื่องเชื้อโรคและพยาธิ ก็ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบเชื้อโรคอยู่ 72.59% จากตัวอย่างกากตะกอนทั่วประเทศที่ นำมาตรวจทั้งหมด 135 ตัวอย่าง เราก็สำรวจเก็บตัวอย่างกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3 แหล่ง คือ ระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงพยาบาล ทั่วประเทศก็ตรวจพบเชื้อโรค ที่เราตรวจตัวเดียวคือ Samonella เพราะเชื่อนี้จะก่อให้เกิดโรคท้องร่วง เกิดอาหารเป็นพิษ และทำให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น บิด ไทฟอยด์ ก็ตรวจพบถึง 72.59% แล้วก็มาตรวจพยาธิ 100 กว่าตัวอย่างเหมือนกัน พบว่ามีพยาธิอยู่ 55.55% ตอนนี้อยากเห็นว่ากากตะกอนก็มีอันตราย ตอนนั้นก็มีการเขาไปทดลองเอง เช่นกากตะกอนจากระบบบำบัด น้ำเสียของการเคหะ เขาเอาไปผสมดินทำปุ๋ยปลูกพืช ก็เป็นเฉพาะที่ แต่ถ้าต่อไปมีการนำมาใช้กันมากแพร่หลาย เช่น ปุ๋ยที่มาจากขยะของ กทม. มันก็จะกลายเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรค

และพยาธิไปในสิ่งแวดล้อม มันก็ไม่ได้ เราจึงมาดูว่าจะนำรังสีมาช่วยตรงนี้ได้อย่างไร ก็นำมาทดลองฉายรังสีแบบต่างๆ กัน ฉายรังสีฆ่าเชื้อโรคและพยาธิ แต่เราใช้เกณฑ์มาตรฐาน เพราะเชื้อโรคนี้ระดับต้านทานรังสีไม่สูง ส่วนการฆ่าพยาธินี้เราก็ทดลองออกมาว่าใช้การฉายรังสีประมาณ 3.32 กิโลเกรย์ จะสามารถฆ่าไข่พยาธิของพยาธิไส้เดือนกลม ซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็กรด ต่าง ความร้อน เราก็เลยใช้ตัวนี้เป็นตัวแทนของพยาธิ และเนื่องจากพยาธินี้จะไม่ใช่ หรือซิสต์นี้ปกติจะทนทานกว่าที่เป็นเซลล์ ก็เลยใช้ไข่พยาธิไส้เดือนกลมจากหมู เพราะโดยสรีระหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทางชีววิทยาจะเหมือนกันหมด ก็สรุปว่ารังสีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค นี้หมายความว่าเฉพาะพลาโตเจนนะ คือ เชื้อโรค ไม่ใช่เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด อันนี้เป็น pasturisation จากนั้นเราก็มาดูด้านพืช ด้านโลหะหนัก ที่พูดกันมาก ก็ปรากฏว่ามี ตะกั่ว พรอท อาร์เซนิก และแคดเมียม อยู่ปริมาณหนึ่งเหมือนกันหลังจากนั้นก็ดูว่าประโยชน์มีอะไรบ้าง คือดูส่วนประกอบ เราก็ตรวจ

N-P-K (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) คือ ตอนแรกเรามุ่งจะนำมาทำปุ๋ยจึงเน้นเฉพาะ N-P-K และพวกธาตุอาหารรองต่างๆ พวกทองแดง เหล็ก แมงกานีส แมกนีเซียมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับพืช ในการสำรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ โดยวิธี Kjeldahl method พบว่ามีปริมาณแตกต่างกัน คือ โรงงานผลิตเบียร์ 5.88%, โรงนม 5.96%, ชุมชน 5.00%, โรงงานผลิตเครื่องปรุงรส 1.92% เมื่อคำนวณเป็นค่าปริมาณโปรตีนทั้งหมด (crude protein) โดยใช้ factor 6.25 คูณ (AOAC 1990, หน้า 70) เช่นปริมาณ crude protein ของกากตะกอนจากโรงงานผลิตเบียร์มีค่าเท่ากับ $5.88\% \times 6.25 = 36.75\%$ เป็นต้น กากตะกอนที่จะมีค่าไนโตรเจนหรือโปรตีนมากเพียงพอสำหรับใช้เป็นอาหารพืชหรือสัตว์นั้นต้องมาจากกระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับสารอินทรีย์ หากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารอินทรีย์ เช่น โรงงานถลุงเหล็กหรือทำแบตเตอรี่ ไม่มีโปรตีนอยู่ในกากตะกอน

จากการวิจัย ก็พบว่ามีไนโตรเจน สูงสุดในกากตะกอนจากโรงงาน อุตสาหกรรมอาหารประเภทนม คือ สูงถึง 5.96% ไนโตรเจนทั้งหมดที่เราวิเคราะห์ได้โดยวิธีการแบบ Kjeldahl method ถ้าคูณด้วย 6.25 จะออกมาเป็น crude protein ประมาณ 37% กว่า เราก็มองเห็นว่ามันสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ ก็ได้เรียนปรึกษากับศ.ดร.เวียง เชื้อ โพธิ์หัก ท่านเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์บอกว่าอาหารปลานี้ต้องการ โปรตีนเพียง 20% เราก็รู้แล้วว่ามันน่าจะใช้เลี้ยง ปลาได้ แต่ตอนนั้นเรายังไม่ทราบว่า มันจะมีปัญหาเรื่องความเป็นพิษ เราก็เลยเรียนเชิญท่านมาร่วมโครงการ ให้อาจารย์ทดลองเลี้ยงปลานิล ซึ่งเลี้ยงง่ายที่สุด ชั้นแรกเราศึกษาความเป็นไปได้ก่อน เพราะยังหาเอกสารเรื่องนี้ไม่ได้เลย ก็เลยทดลองเลี้ยง ปลานิลในถังไฟเบอร์กลาส ก็ vary doses เริ่มจากกว้างๆ ก่อน ไม่ใส่

กากตะกอนเป็นตัวควบคุม แล้วก็ 20, 40, 60 จนถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ผสม ในอาหารสัตว์ ซึ่งต้องผสมธาตุ อาหารทุกอย่างตาม standard formula ของอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงปลาจะต้องมี เกลือแร่ น้ำมัน ต่างๆครบทาง fiber ของเขา แต่ว่ากากตะกอนของเราจะเป็นส่วนผสมทดแทนในส่วน ของโปรตีน ส่วนพวก เกลือแร่ ไวตามินก็ ต้องคงเดิม เพื่อที่จะให้เปรียบเทียบ กันได้ ผลสรุปปรากฏว่า ในผลงาน แรกที่ทำวิจัย ปลานิลเจริญเติบโตได้ดี ในสูตรที่เราใส่กากตะกอนไป 60% กากตะกอนนี้เราเอามาจากโรงเบียร์ เวลาเราทำการศึกษาเราจะนำกาก ตะกอนมาจากหลายแหล่ง แต่พอจะ ศึกษาด้านการนำไปใช้ ในแง่ของ การใช้ประโยชน์ เราจะต้องใช้ใน ปริมาณมากถึง 10 ตัน เอามาฉายรังสี แล้วอบแห้ง เพราะส่วนประกอบที่นำ มาทดแทนโปรตีนของอาหารสัตว์ เราจะต้องทำให้แห้งเพื่อให้ย่อยต่อ การผสมกับส่วนผสมอื่นๆ อย่างใส่ ไวตามิน เราใส่เป็น มิลลิกรัมชนิดเดียว

ใส่ในกากตะกอนเหลวซึ่งมาจากโรง เบียร์ ที่นี้เมื่อเราบีบน้ำออก เรียกว่า filter press มันก็จะแห้งๆหมาดๆ เหมือนดินสีดำๆ ส่วนที่เป็นน้ำมีถึง 80% ถ้ามาผสมกับส่วนแห้งในการ คำนวณก็จะยากแต่ก็คำนวณได้ แต่ใน ส่วนผสมกากตะกอนจำนวนมหาศาล แล้วเราใส่เกลือแร่ชนิดเดียว มันจะ ผสมไม่ทั่ว เพราะฉะนั้นจึงต้องทำ เป็นผง

การฉายรังสีนี้ใช้เวลาเท่าใด ปริมาณเท่าใด

เราก็ฉายที่ 3.32 กิโลเกรย์ ฉาย ที่โรงงานฉายรังสีที่คลอง 5 การฉายที่ 3.32 นี้จะเป็นการคำนวณจากความ แรงของรังสี จะมีตัวที่แตกต่างกันคือ ถ้าหากใช้โคบอลต์-60 ที่มีความแรง สูงจะใช้เวลาในการฉายสั้น ถ้ามีความ แรงต่ำจะต้องฉายนานขึ้น โคบอลต์ ธรรมชาติคือโคบอลต์ที่มี valency 59 เวลาเราซื้ออาจจะมีค่าความแรงสูง แต่ พอใช้นานๆมันจะมี half life ของ โคบอลต์คือ 5.8 ปี เมื่อถึง 5.8 ปี



ปริมาณจะลดลงไปครึ่งหนึ่ง พอลดไปนานๆ ความแรงของรังสีก็จะลดลง เวลาที่เราต้องการในการฉาย 3.32 กิโลเกรย์ก็จะต้องฉายนานขึ้น

อาหารที่ฉายรังสีจะมีผลกระทบ ต่อผู้บริโภคหรือไม่ ผลงานวิจัย ด้านนี้เป็นอย่างไร

ในเมืองไทยเราเองก็เคยทดลองหะคะ เอาแฮมให้กับแพทย์หญิงตระหนัก จิต หรือสุด ภาควิชาเวชศาสตร์ เขตร่อน มหาวิทยาลัยมหิดล ไป ศึกษาด้านความเป็นพิษ (toxicity) ทดสอบความปลอดภัยของแฮม ฉายรังสี ใช้หนูเป็นสัตว์ทดลอง ใน หลายรุ่นก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ ไม่ว่าจะในด้าน biochemistry, physiology หรืออื่นๆ ก็ สรุปว่า ปลอดภัย เป็นผลงานวิจัยที่เมืองไทย ทำโดยแพทย์และทีมงานทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

การใช้เทคโนโลยีนี้แพร่หลาย อย่งไร

ตอนนี้ก็มีแฮมฉายรังสีวางขาย แพร่หลายในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง และคนนิยมรับประทานเพราะว่า แฮมนี่ทำมาจากเนื้อหมู ซึ่งเนื้อหมู หรือในผลิตภัณฑ์หมูนี้ โดยธรรมชาติ จะมีการปนเปื้อนของ Samonella จำนวนมาก เพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็จะ ช่วยป้องกันการติดเชื้อและพยาธิใน เนื้อหมู เป็นตัวที่อันตรายและใน อเมริกาหรือยุโรปจะมีพยาธิตัวนี้ ทานแล้วเป็นอันตรายและทำลายได้ ยาก ก็ทดลองฉายรังสีปริมาณ 1 กิโลเกรย์กว่าๆ ก็สามารถทำลายได้ ทำให้คนไทยสามารถรับประทาน แฮมได้ทันที เพราะส่วนใหญ่คนไทย นิยมรับประทานแฮมที่ไม่มีการไปปรุงอีก เดิมที่เราทำเป็นผลิตภัณฑ์ ทดลองของสำนักงาน แล้ววางขาย



ก็ได้รับความนิยมมาก ตอนหลังก็ ถ่ายทอดให้ภาคเอกชน อย่างตอนนี้ แฮมดอนเมือง ผู้ประกอบการก็ทำ เองแล้วก็นำไปขายเอง แล้วก็จ่ายค่า บริการให้กับสำนักงาน ประมาณ ท่อนละหนึ่งสลึง ซึ่งผู้บริโภคที่คำนึงถึง เรื่องความปลอดภัยก็จะเห็นชอบกับ วิธีนี้

ตอนนี้ก็มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น คือ การฉายรังสีมะขามหวาน เพื่อยืด อายุการเก็บและป้องกันเชื้อรา เพราะ มะขามหวานจะมีเชื้อราเยอะในฝัก และเสี้ง่าย ตอนนี้ก็วางตลาดอยู่ และในพ.ร.บ.ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการผลิต และการดูแลรักษาทุกอย่าง และใน พ.ร.บ. มาตรา 103 จะว่าเกี่ยวกับเรื่อง อาหารฉายรังสีทั้งหมด อาหาร ประเภทใดบ้างที่อนุญาตให้ฉายรังสี ในปริมาณรังสีเท่าใด และควรจะ ควบคุมอย่างไร จะมีกฎระเบียบ ควบคุมอยู่ นี่คือนโยบายที่เป็นประโยชน์ นะคะ

ส่วนประโยชน์ด้านอื่นก็เช่น การ ผลิตสารไอโซโทปหลายชนิดไป บริการกับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องบำบัด

รักษาด้วยรังสี และเราก็ต้องไป ควบคุมว่าเรามีการจัดการที่ถูกต้อง อย่งไร

ถ้าเราฉายรังสีนานเกินไปหรือ แรงเกินไปจะมีผลอย่างไรต่อ ผลิตภัณฑ์หรือไม่

ในการฉายรังสีสูงเท่าใด จะมี กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.อาหารมาตรา 103 เช่นถ้าเราฉายรังสีเนื้อหมู ผลิตภัณฑ์ไก่ ก็จะมีกำหนดเอาไว้ หรือฉายรังสีผลไม้ไม่ควรจะใช้รังสีเท่าใด แต่ในกรณีที่เขาฉายเกินไป เช่น การ ฉายเกินกว่า 10 กิโลเกรย์ กับเนื้อ สัตว์หรือ อาหารทะเล จะมีกลิ่นที่เรา เรียกว่ากลิ่นของรังสี หรือ radiation odor เป็นกลิ่นที่ทำให้ไม่น่ารับ ประทาน ซึ่งคนที่ทดสอบอาหาร ฉายรังสีบ่อยๆจะรู้ได้ หรือเป็นคน sensitive ดี แต่บางคนก็อาจจะไม่รู้

มีข้อกำหนดในการฉายรังสี อาหารเพื่อควบคุมความปลอดภัย หรือไม่

มีค่ะ มีองค์ระหว่างประเทศ 3 หน่วย คือ WHO, FAO แล้วก็ IAEA (International Atomic Energy Agency)

คือทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 3 หน่วยนี้ได้ตั้ง expert committee ศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 ศึกษาการฉายรังสีอาหารประเภทต่างๆ ในปริมาณต่างๆ และได้ลงมติ สรุปว่าอาหารใดๆ ที่ฉายรังสีไม่เกิน 10 กิโลเกรย์ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยไม่จำเป็นต้องทดสอบความเป็นพิษแต่อย่างใด เรียกว่าการทดสอบความเป็นพิษ แต่ถ้าเกิน 10 กิโลเกรย์ก็ไม่สมควรบริโภค

เคยมีการใช้รังสีเพื่อทำลายพวก toxin บ้างหรือไม่



เคยศึกษานะคะ การฉายรังสี ถั่วลิสง ช่วงที่มีชาวอะฟลาท็อกซินในถั่วลิสงดังมากในเมืองไทย ก็ได้มีโอกาสร่วมประชุมได้ทราบว่อะฟลาท็อกซินเกิดจาก *A. flavus* (*Aspergillus flavus*) เพนนิซิลีียมหลายๆ ตัว และเชื้อราในผลิตภัณฑ์หลายๆ อย่าง โดยเฉพาะพวกธัญพืช และในเนื้อสัตว์ ซึ่งบริโภคอาหารที่เป็นธัญพืชต่างๆ เช่นในตับไก่ ที่ถูกทำลายด้วยอะฟลาท็อกซิน จะมีลักษณะและๆ เหลือๆ ก็จะเป็นอันตราย พอเราทานเข้าไปมันจะไปสะสมที่ตับและทำให้เกิดมะเร็ง เราก็เลยมาทดลองดูว่ารังสีนี้ทำลายได้ไหม ผลปรากฏว่ารังสีไม่สามารถทำลาย toxin ได้ เพราะการทำลายอะฟลาท็อกซินต้องใช้ความร้อนสูงมาก เป็นหลายร้อยองศาเซลเซียสขึ้นไป แต่กับรังสีไม่มีผล เราก็เลยมาคิดว่า ถ้าวรังสีทำลายอะฟลาท็อกซินไม่ได้ แต่สามารถทำลายตัวการที่ทำให้เกิดอะฟลาท็อกซินได้ เช่นพวกเชื้อต่างๆ เราก็เลยทดสอบโดยใช้สปอร์ของ *A. flavus* มาเลี้ยงในถั่วลิสง ก็ปรากฏว่าทำลายได้ ต่อจากนั้นจึงนำ *A. flavus* ใส่ลงไปในถั่วลิสง แล้วเอามาศึกษาฉายรังสีที่ปริมาณต่างๆ กัน สรุปได้ว่า

ฉายรังสีที่ปริมาณ 6.8 กิโลเกรย์สามารถทำลายสปอร์ของ *A. flavus* ได้ที่ 10^6 สปอร์ต่อ มล. แสดงว่ารังสีสามารถทำลายต้นตอของการเกิดอะฟลาท็อกซินได้ เราก็มาดูอีกว่าควรจะเริ่มทำลายตรงจุดไหน เพราะมีเอกสารรายงานว่า อย่างถั่วหรือข้าวโพดนี้ *A. flavus* สามารถเกิดได้แม้กระทั่งบนต้นกับฝักที่แห้ง และปล่อยอะฟลาท็อกซินออกมาเราก็มาศึกษาดูว่าถ้าสมมุติในกรณีที่จะอะฟลาท็อกซินมันตกลงไปในถั่วหรือธัญพืชพวกนี้แล้ว ก็วันจึงจะผลิตอะฟลาท็อกซินออกมา 0-1 วันจะไม่มีการ ผลิตอะฟลาท็อกซิน แต่หลังจากเจ็ดวันแล้วจะมีการผลิตอะฟลาท็อกซินเกิดขึ้น ตามลำดับ ดังนั้น ถ้าเราสามารถฉายรังสีในช่วงก่อน 7 วัน ก่อนที่ *A. flavus* จะขึ้นในผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว จะสามารถป้องกัน *A. flavus* ได้ ถ้าเราฉายที่ 6.4 กิโลเกรย์ ก็จะสามารถทำลายตัวการที่ทำให้เกิดอะฟลาท็อกซินได้ ถ้าเราจะฉายรังสีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการสร้าง *A. flavus* เราจะต้องฉายรังสีผลิตภัณฑ์นั้นตั้งแต่อู่บนต้น ให้เร็วที่สุด หรือถ้าเราเก็บเกี่ยวมาแล้วเราต้องรีบอบให้แห้ง จะช่วยป้องกันการเจริญของเชื้อราด้วย แล้วรับนำมาฉายรังสีไม่เกิน 7 วัน หลังการเก็บเกี่ยว เหมือนกับอาหารฉายรังสีโดย

ทั่วไป เช่นอาหารทะเล หรือเนื้อสัตว์ ถ้าเกิดว่ามีเชื้อโรคเกินมาตรฐานหรือมีพยาธิขึ้นแล้ว แต่เนื้อยังไม่เน่าเราฉายได้ แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้จนเน่าแล้วเรานำมาฉายรังสีเพื่อทำลายเชื้อโรค พยาธิ และทำให้ผลิตภัณฑ์สดนั้นทำไม่ได้แล้ว

การใช้ประโยชน์จากรังสีจะมีแนวโน้มอื่นอีกหรือไม่ นอกจากที่ได้กล่าวมา

ในปัจจุบันก็มีการนำรังสีไปใช้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม หรือด้านการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อย่างงานวิจัยที่ทำอยู่นี้จะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการใช้ก็อาจจะเป็นด้านทางการแพทย์ที่มีการใช้ที่แตกต่างไป เช่น การถนอมอาหารด้วยรังสี การทดสอบด้านปุ๋ยและดิน ทางกรมวิชาการเกษตรกำลังศึกษาอยู่ นอกจากนี้ก็มีด้านการแพทย์ เช่นการฝังแร่เรเดียม การฉายรังสีมะเร็งในผู้ป่วย การใช้ไอโอดีน 131 และสารกัมมันตรังสีหลายอย่างในการตรวจรักษาผู้ป่วย ด้านอุตสาหกรรมก็มีการฉายรังสีพวกยาง ปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น แล้วก็มีการใช้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทำฉนวน ทำให้ทนทานต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้น ฉายรังสีด้าน



การพิมพ์ ฉายรังสีกระดาด ทำให้มีความหนาสม่ำเสมอ ก็ใช้รังสีควบคุมให้รัศมีกระดาดได้บางที่สุด แม้กระทั่งธนบัตรของไทยที่ปัจจุบันมีช่องใส่อยู่ อันนั้นก็เป็นการใช้ nuclear technique เข้ามาช่วย แล้วมีการใช้ทดสอบความแตกร้าวของโลหะ เช่น เครื่องบินใช้รังสีแกมมาฉาย หรืออุปกรณ์โลหะในโรงงานน้ำมันที่ใช้ความดันสูง ความร้อนสูง เป็นการตรวจประเภท non-destructive testing นี่คือการนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย คือรังสีมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษ คนก็เลยกลัว และบางครั้งความไม่รู้ ก็ทำให้เกิดอันตรายได้ แต่สำหรับคนที่รู้ก็สามารถนำรังสีมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา สิ่งแวดล้อม หรือคนอื่นๆ ได้

สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ก็มีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้ความรู้ การนำเข้าสารกัมมันตรังสีก็ต้องมีการขออนุญาตจากสำนักงานฯ เราต้องคอยดูว่าเขาจะนำสารนั้นไปใช้ประโยชน์อะไร เหมาะสมหรือเปล่า ในการใช้ของเขา ก็จะต้องมีพนักงานที่มีความรู้ด้านนี้ เราถึงจะอนุญาตให้มีในครอบครองได้ นอกจากนั้น ก็จะมีการตรวจสอบสถานที่ว่าการเก็บปลอดภัยหรือไม่ อย่างเช่น เครื่องฉายรังสีในโรงพยาบาล ปลอดภัยต่อผู้รับบริการหรือผู้ใช้หรือเปล่า

โคบอลต์-60 มีโลหะหรือวัสดุอะไรบ้างที่สามารถป้องกันการทะลุทะลวงได้

ปกติก็จะใช้ตะกั่ว มีประสิทธิภาพสูงสุด ความหนาที่ใช้ก็จะมีค่ากำหนดอยู่ ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ช่วยกรุณาแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

บรรยากาศการทำงานวิจัยในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไร


จากประสบการณ์ในการทำงานวิจัยนี้ จำเป็นจะต้องมี 3 ปัจจัยที่สำคัญ คือ 1. มีบุคลากร 2. มีอุปกรณ์ และ 3. มีงบประมาณที่เพียงพอ ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่สามารถทำได้ ปัจจุบันงบประมาณที่ได้จากรัฐน้อยมาก ทั้งที่การวิจัยนี้ช่วยแก้ปัญหาให้ประเทศได้ เพราะช่วยสร้างเทคโนโลยีให้ประเทศ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเทคโนโลยี ดังนั้น สำหรับศาสตร์ทุกสาขา แม้ด้านสังคมศาสตร์ เราต้องสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศของเรา เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แล้วยังทำให้ประเทศแข็งแกร่ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ปัจจัยด้านบุคลากรของไทยเราในปัจจุบันคิดว่ามีความสามารถเพียงพอได้ระดับ จะขาดก็แต่การสนับสนุนของประเทศ และนโยบายที่ชัดเจน ถ้ารัฐจัดสรรงบให้เพียงพอหรือเท่าเทียมกับต่างประเทศ คิดว่าในเบื้องปลายก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวม เรื่องการวิจัย อยากให้รัฐกำหนดเป็นนโยบายของชาติ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นกับประชาชน อย่างเช่นปัญหามันสำปะหลัง หรือผลผลิตที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ประชาชน สิ่งเหล่านี้ รัฐบาลควรนำมาจัดลำดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา แล้วดึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำ

งานในเรื่องต่างๆ เรื่องศักยภาพของคนน่าจะทำได้ เพื่อให้ได้ผลในภาพรวม นอกจากนั้นการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ส่วนหนึ่งเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ การต่อเชื่อมระหว่างนักวิจัยกับผู้ใช้ สื่อมวลชนจะสืบทบาทสำคัญ ในการเป็นจุดเชื่อมโยงเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในหมู่ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง รัฐควรส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่นำเทคโนโลยีในประเทศไปใช้ เช่น ลดภาษี คือตอนนี้เปรียบเหมือนว่า นักวิจัยก็คือ ฝีมือพร้อมที่จะจำเต็มที่แล้วแต่รัฐคือนายท้ายหรือกัปตันจะต้องบอกว่าจะให้คิดไปทางไหน ถ้าทำงานประสานกันได้ดีเต็มที่ แน่แน่นอนว่านักวิจัยจะสามารถช่วยสร้างประเทศได้อย่างแน่นอน

อีกนิดหนึ่งที่ยอยากจะฝากไว้คือในการทำงานวิจัยโดยทั่วไปแล้ว นักวิจัยมักจะต้องพบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งจะต้องแก้ไขฝ่าฟันไปให้ลุล่วง จึงอยากจะฝากบอกนักวิจัยท่านอื่นๆว่า ในการทำงานนั้นการนั่งสมาธิจะช่วยได้มาก ในกรณีที่ผจญกับปัญหา เพราะจะช่วยทำให้สมองปลอดโปร่ง เกิดสติ ปัญญา สามารถมองเห็นทางแก้ปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม




ชาวเทศบาลโยย สำหรับชาวชนบท



ฉบับที่ 74 พฤษภาคม 2543 โดย สายสวาท กุลวัฒนาพร ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย

การทำไวน์สับปะรด



ไวน์ (wine) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักองุ่นหรือผลไม้ชนิดอื่นๆ ไวน์มีหลายชนิด ไวน์แดงทำจากองุ่นแดง ไวน์ขาวทำจากองุ่นเขียว หรือแยกตามความแตกต่างที่ปริมาณความหวาน ได้แก่ ไวน์หวาน (sweet wine) มีน้ำตาลเหลืออยู่ 7-10% หรือไวน์ที่ไม่มีความหวานเลย (dry wine) มีน้ำตาลเหลืออยู่ 0.2% ส่วนแชมเปญ (champagne) เป็นไวน์ประเภท สปาร์คกลิง ไวน์ (sparkling wine) ซึ่งผลิตจากแคว้นแชมเปญ (Champagne) ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส และแตกต่างจากไวน์ทั่วไป เพราะในแชมเปญจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากการหมักสองครั้ง ครั้งแรกเพื่อให้เกิดกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ จากนั้นนำมาหมักต่อในขวดแก้วที่มีรูปแบบพิเศษโดยมีการเติมยีสต์และน้ำองุ่นเข้มข้นในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเกิดแอลกอฮอล์หรือการหมักเกิดจากกิจกรรมของยีสต์พวก แซคคาโรไมซีส (*Saccharomyces cerevisiae*) ในการเปลี่ยนน้ำตาลไปเพื่อเป็นอาหารและได้ผลผลิตเป็นแอลกอฮอล์ ผลไม้เกือบทุกชนิดสามารถนำมาหมักเป็นไวน์ผลไม้ได้ แต่กลิ่น รส และคุณภาพย่อมแตกต่างกันไปตามชนิดของผลไม้ ในบ้านเราสับปะรดเป็นผลไม้ที่มีตลอดปีและมีราคาถูก การนำมาผลิตเป็นไวน์จึงมีต้นทุนต่ำ สับปะรดมีความเป็นกรดที่พอเหมาะ ไม่จำเป็นต้องปรับค่าความเป็นกรดต่าง และมีปริมาณน้ำตาลอยู่มากพอสมควร เมื่อหมักออกมาแล้วให้กลิ่นรสดี มีสีเหลืองสวยงาม นำรับประทาน

วัตถุดิบและอุปกรณ์

1. สับปะรด แก่จัด 15 ลูก
2. น้ำตาลทราย
3. ขวดแก้วขนาดหนึ่งลิตร 2 ขวด มีปากกว้างพอสมควร อาจจะใช้ขวดน้ำอัดลมตัดปากขวดให้ได้ปากขวดกว้าง $1\frac{1}{2}$ นิ้วก็ได้
4. ขวดใส่น้ำดื่มโพลาริส 20 ลิตร 2 ขวด (ควรเป็นขวดแก้ว)
5. น้ำกลั่น หรือน้ำกรองต้มที่ไม่มีคลอรีน
6. เชื้อยีสต์แซคคาโรไมซีส (*Saccharomyces cerevisiae*) สายพันธุ์ที่ใช้ทำไวน์
7. หม้อแกงขนาดใหญ่
8. จุกสำลี (เตรียมทำเป็นจุกขนาดพอใส่อุดปากขวดโพลาริสพอดี ใส่ถุงพลาสติกนำไปแช่ 45 นาที)

ขั้นตอนการผลิต

การเตรียมหัวเชื้อ

นำสับปะรด 1 ลูกปอกเปลือก คั้นเอาแต่น้ำ เติมน้ำให้ได้ประมาณ 1 ลิตร เติมน้ำตาลลงไป 1 ช้อน หรือ 100 กรัม นำไปใส่ขวดขนาดหนึ่งลิตรให้ได้ครึ่งขวดแล้วอุดด้วยจุกสำลี นำเข้ารังถึงหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมง เสร็จแล้วนำมาตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วใส่เชื้อยีสต์ลงไปแล้วปิดจุกสำลี ตั้งทิ้งไว้ครึ่งวันแล้วเขย่า ทำการเลี้ยงเชื้อยีสต์ประมาณ 1 วัน ก่อนถึงเวลา 1 วัน ประมาณ 6-7 ชั่วโมงทำการเตรียมน้ำสับปะรดคั้นในขั้นตอนต่อไป

การเตรียมน้ำสับปะรดคั้น

ในการทำไวน์ขนาด 20 ลิตร ต้องใช้สับปะรด 15 ลูก นำมาปอกเปลือกออก เอาตาออก ใช้แต่เนื้อ ส่วนแกนไม่ใช่ คั้นเอาแต่น้ำใส่ในหม้อแกง นำไปต้มจนพอร้อน 10-15 นาที อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส ไม่ต้องไหมไฟให้เดือดจะทำให้ได้ไวน์กลิ่นรสไม่ดี เมื่อต้มเสร็จแล้วใส่น้ำตาล 1 กิโลกรัม คนให้ละลาย ปรับปริมาตรให้ได้

20 ลิตรด้วยน้ำต้มเดือด นำไปใส่ในขวดน้ำขนาด 20 ลิตร ที่ลวกน้ำร้อนไว้ก่อนแล้ว ขวดละ 10 ลิตร ปิดปากขวดด้วย จุกสำลี ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น

เมื่อน้ำสลับประตเย็น (ถ้ายังร้อนอยู่อาจทำให้เชื้อ ยีสต์ตายได้) ให้ใส่เชื้อยีสต์ที่เลี้ยงไว้ลงไปในถัง 1 ขวด ทำการเขย่า ปิดจุกสำลี ตั้งทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันจะสังเกตเห็นมีฟองเกิดขึ้นภายในขวดแสดงว่าเชื้อยีสต์เริ่มเจริญและ เกิดการหมักแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 2 วันหรือ 3 วันเขย่าดู ถ้าฟองก๊าซเริ่มน้อยให้เติมน้ำเชื่อมโดยใช้น้ำตาล 1 กิโล-กรัม ผสมน้ำ 2 ลิตร เมื่อทำน้ำเชื่อมเสร็จตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้ว

เทลงไปขวดๆ ละ 1 ลิตร เขย่าให้เข้ากัน เสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้ จนไม่มีฟองเกิดขึ้นมาอีก ใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์

ทำการชิมดูเมื่อสิ้นสุดการหมักจะได้รสหวานเล็กน้อย และได้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่พอเหมาะ การตกตะกอน อาจ ทำให้เชื้อยีสต์ตกตะกอนได้ในที่เย็นหรือเมื่อเห็นว่ายีสต์ ตกตะกอนไปที่ก้นขวดให้ทำการดูดส่วนใสถ่ายออกมาใส่ ขวด ขวดที่จะนำมาใส่ต้องลวกน้ำร้อนภายในขวดก่อนทุก ครั้ง เก็บไว้ในที่เย็นจะทำให้ได้ไวน์ที่มีกลิ่นรกรกลมกล่อม ยิ่งขึ้น

การทำไวน์จากสับประตนั้นจะเห็นว่าไม่ยากเลยเพราะสามารถทำเองได้แต่สิ่งสำคัญคือต้องไปหาซื้อเชื้อยีสต์มา หรือถ้าในต่างประเทศจะมีเชื้อยีสต์ขายในรูปที่เป็นผงสำหรับหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถนำมาใส่ ในน้ำผลไม้ได้เลยโดยไม่ต้องเตรียมเชื้อยีสต์เริ่มต้น หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์จุลินทรีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) โทร. 5791121 ต่อ 2304

ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด

เปลือกข้าวโพด เป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่มีอยู่ทุกภาคในประเทศไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือ การลดปัญหาขยะในพื้นที่ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ ครอบครัว อีกวิธีหนึ่ง



ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว เล็งเห็นประโยชน์ของเปลือกข้าวโพด จึงสาธิต ทดลอง และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีอาชีพเสริมจากการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาออกโรงเรียนในการพัฒนา และฟื้นฟูศักยภาพของแรงงานคืนถิ่นโดยการพึ่งพาตนเอง

ก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพดนั้น ดังที่ทราบกันแล้วว่า เปลือกข้าวโพดที่มีอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยมีอยู่หลากหลายชนิด แต่ข้าวโพดพันธุ์ ชูบเปอร์สวีท เป็นชนิดที่ดีที่สุดที่ใช้สำหรับงานที่ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด และมีการปลูกในจังหวัดสระแก้วเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม ก็มิได้จำกัดเฉพาะพันธุ์ดังกล่าว เราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทุกสายพันธุ์

การเตรียมเปลือกข้าวโพด

การเตรียมเปลือกข้าวโพด สามารถเตรียมได้

2 วิธีคือ

1. จากเปลือกสด นำเปลือกข้าวโพดสดชนิดที่มีสีเขียว โดยใช้เปลือกข้าวโพดชั้นที่ 2-4 มาผึ่งแดดให้แห้ง ประมาณ สองถึงสามแดด
2. จากเปลือกข้าวโพดที่แห้งแล้ว จะต้องคัดเลือกใบส่วนที่มี สีขาวสะอาดปราศจากเชื้อรา จะใช้ได้ในปีที่อยู่ด้านใน ประมาณ 2-3 ใบ

การฟอกเปลือกข้าวโพดที่แห้งแล้ว

อุปกรณ์ที่จะต้องใช้

- กะละมังเคลือบ
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- เตาถ่าน
- น้ำสะอาด

การฟอกเปลือกข้าวโพดเป็นกรรมวิธีที่ทำให้เปลือกข้าวโพดขาวสะอาด และเก็บได้นานนับ 10 ปีโดยปราศจากเชื้อรา ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเปลือกข้าวโพด การฟอกเปลือกข้าวโพดทำได้โดยนำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% 1 ส่วน:น้ำ 30 ส่วน ต้มเปลือกข้าวโพดในกะละมังเคลือบ ทิ้งให้เดือด ใช้ระยะเวลา 30 นาที แล้วนำมาล้างน้ำสะอาด 3-4 ครั้ง ตากให้แห้งในแดดจัด 2-3 แดด และเก็บไว้ในถุงพลาสติกที่แห้งสนิท การฟอกเปลือกข้าวโพดในแต่ละครั้งควรทำครั้งละมากๆ จะได้ประหยัดค่าน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพราะสามารถเก็บไว้ได้ระยะเวลานาน

เราสามารถประดิษฐ์ได้หลายชนิด คือ

1. ชนิดโบว์
2. ชนิดดอกผักกูด
3. ชนิดดอกกุหลาบ

ซึ่งแต่ละชนิดก็มีข้อเสียพร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือ

- กรรไกรตัดกระดาษ
- ด้ายสีขาว
- ฐาน
- เทียน
- กระดาษกาวเทปสีดำ

1. ดอกไม้จันทน์โบว์

ส่วนที่ 1 - นำเปลือกข้าวโพดที่ฟอกแล้ว ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 1" ยาว 8" จำนวน 3 ชิ้น นำมาพับทบเป็นรูปโบว์ทั้ง 3 ชิ้นโดยเว้นด้านปลายไว้ประมาณ 1 นิ้ว นำมามัดรวมกัน

ส่วนที่ 2 - ตัดเปลือกข้าวโพด กว้าง 1/2" ยาว 6" พับเป็นดอกกุหลาบ

ส่วนที่ 3 - ตัดเปลือกข้าวโพด กว้าง 1 ซม. ยาว 6" จำนวน 3 ชิ้น นำมามัดรวมกับฐานและเทียน แทนไม้จันทน์ โดยด้านปลายรูป-เทียนมัดด้วยกระดาษกาวเทปสีดำ

นำส่วนที่ 1, 2, 3 มามัดรวมกัน ด้วยด้ายสีขาว โดยนำดอกกุหลาบไว้ตรงกลางเป็นการบังเส้นด้ายที่มัดโบว์ไว้ให้เรียบร้อย ทำการตกแต่งให้สวยงามโดยตัดปลายโบว์ 2 ด้านเป็นแฉกปากปลาฉลามเป็นการตกแต่ง เราจะได้ดอกไม้จันทน์ชนิดโบว์ 1 ชิ้น

2. ดอกไม้จันทน์ดอกกุหลาบ

ส่วนที่ 1 - ตัดเปลือกข้าวโพดที่ฟอกแล้ว กว้าง 1" ยาว 6" 1 ชิ้น พับกุหลาบประมาณครึ่งดอกพักไว้

ส่วนที่ 2 - ตัดเปลือกข้าวโพด กว้าง 1 1/2" ยาว 2" จำนวน 6 ใบ เป็นกลีบกุหลาบทั้ง 6 ใบ พักไว้

ส่วนที่ 3 - ตัดเปลือกข้าวโพด กว้าง 1 ซม. ยาว 6" จำนวน 3 ชิ้น นำมามัดรวมกับฐานและเทียน แทนไม้จันทน์ โดยด้านปลายรูป-เทียนพันด้วยกระดาษกาวเทปสีดำ

ส่วนที่ 4 - นำส่วนที่ 1 มาเป็นดอกตูม และนำส่วนที่ 2 มาเข้าดอกสลับหว่างทั้ง 6 กลีบ มัดรวมกับส่วนที่ 3 โดยกะระยะห่างพอประมาณ แล้วใช้กระดาษกาวเทปสีดำพันทับด้าย ที่ผูกไว้อีกครั้ง เราจะได้ดอกไม้จันทน์ดอกกุหลาบ 1 ชิ้น

3. ดอกไม้จันทน์ดอกผักกูด

ส่วนที่ 1 - นำเปลือกข้าวโพดฟอกแล้ว ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 1/2" ยาว 2" จำนวน 6 กลีบ ตัดด้านบนให้มน ด้านล่างเล็ก

ส่วนที่ 2 - นำเปลือกข้าวโพด กว้าง 1/2 ซม. ยาว 2" จำนวน 6 ชิ้น มัดปลายด้านเดียวเพื่อทำเกสรเตรียมไว้

ส่วนที่ 3 - นำเปลือกข้าวโพดมาทำก้าน โดยมัดแบบ 6 ชิ้น เข้าด้วยกัน แล้วจึงนำเกสรและกลีบเข้ารวมกันทั้ง 6 กลีบ ทำจำนวน 2 ดอก นำกลีบดอก 6 กลีบมาเข้าดอก

ส่วนที่ 4 - นำเปลือกข้าวโพด กว้าง 1 ซม. ยาว 6" จำนวน 3 ชิ้น มัดรวมกับฐาน และเทียนแทนไม้จันทน์ โดยด้านปลายรูป-เทียนพันด้วยกระดาษกาวเทปสีดำนำส่วนที่ 3, 4 มารวมกันพันด้วยกระดาษกาวเทปสีดำอีกครั้ง ด้านบนเว้นระยะประมาณ 1 1/2"-2" เราจะได้ดอกไม้จันทน์ชนิดดอกผักกูดอีก 1 ชนิด

4. การทำข้อเชิญ

ชนิดโบว์ ใช้โบว์ใหญ่ทำลักษณะคล้ายกับชนิดโบว์เล็ก แต่ใช้ซ้อนกัน จำนวน 6 ชิ้น ใช้ดอกไม้จันทน์ ชนิดดอกกุหลาบไว้ตรงกลาง และใช้ขนาดของรูป-เทียน ให้ใหญ่ขึ้น ปล่อยชายโบว์ให้ยาวมากกว่าเดิม จำนวน 2 ชาย สำหรับชนิดกุหลาบและชนิดดอกผักกูดให้นำดอกไม้ประดิษฐ์แล้ว แต่ไม่ต้องใช้รูป-เทียนมามัดรวมกันระหว่าง 7-9 ดอก และเพิ่มเส้นเศษๆ ของเปลือกข้าวโพดให้มากขึ้น แทนไม้จันทน์ เราก็จะได้ข้อเชิญ จำหน่ายคู่กับชนิดของดอกไม้จันทน์แต่ละชนิดในราคาข้อละ 15-20 บาท

ต้นทุนการผลิต

- ฐาน ก่าละ 25 บาท มีประมาณ 150 ดอก ตัดแบ่งได้เป็นรูปดอกสั้นถึง 600 ดอก
- เทียน ห่อละ 8 บาท มี 50 แท่ง ตัดแบ่งได้ 100 แท่ง
- เปลือกข้าวโพด หาได้ทั่วไปในพื้นที่
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% ขนาด 1 ลิตร ขวดละประมาณ 150 บาท ฟอกเปลือกข้าวโพดได้ประมาณ ครั้งละ 5 กิโลกรัม (ตากแห้งแล้ว)
- กระดาษกาวเทปสีดำ 30 บาท จากร้านเครื่องเขียน

การผลิต

- แรงงานในครอบครัวทุกคน กำลังการผลิตวันละ 200-300 ชิ้น

ทุนเบื้องต้น

- ประมาณครอบครัวละ 500-1,000 บาท

ตลาด

- ขายในหมู่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน ขายส่งตามร้านค้าในเมือง

จุดที่น่าสนใจ

- วัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องไปซื้อจากแหล่งอื่น แรงงานในครัวเรือนสามารถทำได้ทุกวัน ต้นทุนต่ำ ผลกำไรประมาณ 80% ของราคาขาย

ท่านที่สนใจในเรื่องการผลิต หรือผู้จำหน่าย
ต้องการสนับสนุนกลุ่มสตรีในเรื่องดอกไม้จันทร์
จากเปลือกข้าวโพด ติดต่อได้ที่

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณ
ชายแดนจังหวัดสระแก้ว ต. ท่าเกษม อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000

โทร. (037) 241394-5 ในเวลาราชการ


ข้อมูลจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว

การทำขนมมะม่วง

มะม่วงเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกกันทั่วไปทั้งที่ปลูกรอบๆ บริเวณบ้านเพื่อให้ร่มเงา ทำให้บ้านเรือนร่มรื่นน่าอยู่อาศัย หรือปลูกเป็นสวนสามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาของผลผลิตที่มีมากจนล้นตลาด นับเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่นำผลผลิตมะม่วงออกสู่ตลาดพร้อมๆ กัน ทำให้มะม่วงราคาตกต่ำ จนอาจทำให้ขาดทุนได้

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการแปรรูปมะม่วงขึ้นมาหลายรูปแบบ เช่น มะม่วงตากแห้ง มะม่วงดอง มะม่วงกวน มะม่วงแผ่น แยมมะม่วง น้ำมะม่วง ฯลฯ เป็นต้น ในปัจจุบันการแปรรูปมะม่วงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมๆ นั่นคือการทำ “ซอสมะม่วง”

คุณกาญจนา เหล่าศรีเจริญกุล นักวิทยาศาสตร์ 7 กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้คิดค้น กรรมวิธีการแปรรูปมะม่วงสุกให้เป็นซอสมะม่วง ซึ่งสาเหตุที่คิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าสามารถแก้ไขปัญหาผลผลิตมะม่วงเมื่อยามล้นตลาดได้ทางหนึ่ง และยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในท้องตลาด ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกมากขึ้น นอกจากนี้ซอสมะม่วงยังมีคุณค่าทางอาหารใช้เป็นเครื่องจิ้มหรือน้ำจิ้มกับอาหารได้หลากหลายชนิด เพราะซอสมะม่วงจะไม่มียีสหรือสารเปรี้ยวของมะม่วงหลงเหลืออยู่ คงเหมือนกับซอสพริก และซอสมะเขือเทศ คือมีรสเปรี้ยว เผ็ด หวาน เนื้อเนียนขึ้น



ส่วนผสมของซอสมะม่วง 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย

1. เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียด	200	กรัม
2. พริกชี้ฟ้าแดงดอง	200	กรัม
3. น้ำตาลทราย	250	กรัม
4. เกลือ	50	กรัม
5. กระเทียมดอง	40	กรัม
6. น้ำส้มสายชูกลั่น 5%	260	กรัม

1. เตรียมเนื้อมะม่วงบดละเอียด โดยเลือกใช้มะม่วงแก้วหรือมะม่วงพันธุ์อะไรก็ได้ที่มีเนื้อมากและมีราคาถูก ใช้มะม่วงสุกเหลืองทั้งลูก ไม่มีตำหนิหรือรอยเน่าเสีย จากนั้นล้างมะม่วงให้สะอาด แล้วนำไปลวกในน้ำเดือด 10 นาที โดยไม่ต้องปอกเปลือก นำมะม่วงมาผ่าออกเป็นสองส่วน ใช้ช้อนตักเนื้อแยกออกจากเปลือกและเมล็ด แล้วนำเนื้อมะม่วงที่ได้ไปปั่นหรือบดด้วยเครื่องปั่นหรือบดอาหารจนละเอียดทั่วทั้งหมด นำเนื้อมะม่วงที่ปั่นละเอียดแล้วไปกรองด้วยตะแกรงขนาดช่องประมาณ 0.025 นิ้ว หรือกระชอนเล็กตาถี่ๆ หรือจะใช้ผ้าขาวบางแบบหยาบตาห่ากรองแล้วคั้นออกมา จะได้เนื้อมะม่วงบดละเอียด
2. เตรียมพริกชี้ฟ้าแดงดอง โดยใช้พริกชี้ฟ้าสุกแดงทั้งเม็ด ตัดก้านทิ้ง ล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำไปนึ่งในน้ำเดือด นาน 5 นาที แล้วดักพริกชี้ฟ้าใส่ลงในโหลหรือขวดปากกว้าง ใส่ น้ำส้มสายชูกลั่น 5% ลงไปพอท่วมพริก ปิดฝาให้สนิทตั้งทิ้งไว้ 20 วัน ขั้นตอนนี้จะทำให้พริกเนื้อนิ่ม ไม่มีเมือกเหนียว
3. เตรียมกระเทียมดอง ใช้กระเทียมปอกเปลือกเลือกเอาแต่กลีบที่สมบูรณ์ ล้างแล้วนึ่ง ก่อนจะนำไปดองไว้ 20 วันตามขั้นตอนเดียวกันกับการดองพริกชี้ฟ้า
4. เมื่อเตรียมวัตถุดิบครบทั้ง 3 อย่างก็เริ่มทำซอสมะม่วงได้โดยเริ่มจากการดักกระเทียมดอง พริกชี้ฟ้าแดงดอง เกลือ น้ำตาล และน้ำส้มสายชู ซึ่งให้ได้น้ำหนักและปริมาณตามส่วนผสม นำไปปั่นหรือบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดหรือเครื่องปั่นไฟฟ้า
5. นำส่วนผสมที่บดแล้วไปกรองแยกกากผ่านตะแกรงขนาดช่องประมาณ 0.025 นิ้ว หรือกระชอนตาถี่ๆ หรือจะใช้ผ้าขาวบางแบบหยาบตาห่ากรองเอาแต่น้ำชั้นๆ ของส่วนผสมทั้งหมด
6. ผสมเนื้อมะม่วงบดละเอียดที่เตรียมไว้ตอนแรก กับส่วนผสมที่กรองได้มาจากพริก กระเทียม เกลือ น้ำตาลและน้ำส้มสายชู คนให้ส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียว แล้วนำไปต้มที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ใช้ช้อนคอยคนตลอดเวลา เพื่อฆ่าเชื้อและทำให้ซอสข้นขึ้น
7. เมื่อต้มครบ 15 นาที ตักซอสที่ได้บรรจุในขวดแก้วที่ผ่านการลวกฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อน ปิดฝาให้สนิท ตั้งเก็บทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง ก็จะได้ซอสมะม่วงพร้อมบริโภค หรือจัดจำหน่าย โดยสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ นาน 6 เดือนขึ้นไป หากแช่เย็นจะเก็บได้นานยิ่งขึ้น



ซอสมะม่วงที่ได้จะมีสีแดงปนส้มเล็กน้อย สีของซอสขึ้นอยู่กับชนิดพริกที่ใช้ หากใช้พริกแดงซอสก็จะมีสีแดง หากใช้พริกเหลืองซอสก็จะมีสีเหลือง นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มความเผ็ดของซอสได้ โดยการเพิ่มพริกที่เผ็ดเข้าไปแทนเล็กน้อยในอัตราส่วนเท่าเดิม ซอสมะม่วงที่ดีเนื้อซอสต้องมีความละเอียด เนื้อเนียนแน่น มีความคงตัวดีไม่เหนียวหรือข้นเกินไป ไม่มีกลิ่นเฉพาะตัวของมะม่วง สีสดใสเป็นธรรมชาติ ไม่มีกลิ่นไหม้หรือกลิ่นแปลกปลอมอื่น

ต้นทุนการผลิตซอสมะม่วง 1 กิโลกรัม แบ่งเป็น ค่ำมะม่วง 3-5 บาท มะม่วงสุก 1 กก. เมื่อนำมาทำเป็นเนื้อมะม่วงบดละเอียด จะได้เนื้อมะม่วงครึ่งกิโลกรัม พริกชี้ฟ้าแดง 4-5 บาท น้ำตาลทราย 3-4 บาท เกลือ 1 บาท กระเทียม 1-2 บาท น้ำส้มสายชู 5-8 บาท รวมค่าน้ำค่าไฟจะใช้ต้นทุนประมาณ 25-30 บาท ต่อซอสมะม่วง 1 กก. บรรจุใส่ขวดๆ ละ 220 กรัม ได้ประมาณ 4-5 ขวด ราคาขวดละ 15 บาท จะมีรายได้ 60-75 บาท หักต้นทุนและค่าขวดพร้อมฝาอีก 1.50-2 บาท จะเหลือกำไรประมาณ 22-35 บาทต่อซอสมะม่วง 1 กก. ถ้าทำได้จากมากกว่านี้ หากทำจำนวนมากๆ และขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบที่ถูกลงตามฤดูกาล

นอกจากจะใช้มะม่วงเป็นวัตถุดิบแล้ว ยังสามารถใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีเนื้อใกล้เคียงกันได้ เช่น มะละกอ ก็จะได้ซอสมะละกอ โดยใช้สูตรเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนวัตถุดิบเท่านั้นขึ้นอยู่กับนำไปประยุกต์พัฒนาปรุงรสให้เหมาะสมกับผลผลิตและความชอบของคนในท้องถิ่น



ซอสมะม่วง รสชาติดี มีคุณค่า

หากท่านสนใจเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต นอกเหนือไปจากการทำซอสมะม่วง สามารถติดต่อขอรับเอกสารและคำปรึกษาได้ที่ กลุ่มงานวิเคราะห์ วิจัยการแปรรูปผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร โทร. (02) 579-0151-9

ข้อมูลจาก นสพ.เดลินิวส์ 14 สิงหาคม 2542

เอกสารวิชาการเรื่องมะม่วง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร



อภินันทนาการจาก



บริษัท อัลฟานี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ห้องเลขที่ 128/131-133 ชั้น 12 พญาไทพลาซ่า 128 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rm. No. 128/131-133, 12th Fl., Payatai Plaza, 128 Phyathai Rd., Rajthavee, Bangkok 10400, Thailand
Tel: (662) 216-5657-64 Fax: (662) 216-5665

ขอสนับสนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปอง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วน.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการวิจัย และพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์

ด้วยความปรารถนาดี จาก

บริษัท ม.ต.ร.อุตสาหกรรมไม้ จำกัด

M.T.R.WOOD INDUSTRIES CO.,LTD

“ บริการ อบไม้-ไสไม้แปรรูปทุกชนิด ”

ในเครือ บริษัท มิตรมุงตารี จำกัด

ที่ตั้งโรงงาน 118/2 หมู่ 5 ซอยวัดคูบอน

แขวงคันนายาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

โทร. 5109927 โทรสาร 5101994

Pesik International Co.,Ltd

ถ้าคุณกำลังมองหา



DESIGN
LOC
WORLD

We are

**Autodesk
System Centre**

**Authorized
Autodesk Training Centre**

We offer drafting, scanning and 3D presentation services.

www.pesik.com

โปรแกรมช่วยออกแบบ อาคาร ถนน
ภูมิสถาปัตย์ และงานสำรวจ

กรุณาติดต่อ

โทร. 5414270-5

แฟกซ์. 5414330

Email. [pesik @ loxinfo.co.th](mailto:pesik@loxinfo.co.th)

ดูรายละเอียดสินค้าและตารางการอบรมที่
www.pesik.com

AutoCAD 2000

AutoCAD R14

Architectural Desktop

Land Development Desktop

Autodesk Civil Design

Autodesk Survey

516 Rachadaphisek Road, Huay-kwang, Bangkok 10320 Thailand

[pesik @ loxinfo.co.th](mailto:pesik@loxinfo.co.th)



องค์การมาตรฐาน

ผู้ผลิตยารายแรกของประเทศไทย

ที่ได้รับ... **ISO 9002**

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

75/1 ถนนพระราม6ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร.2460042

ขอสนับสนุน
วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับนี้
จาก

บริษัท ตั้งเจริญอุตสาหกรรม จำกัด

60/15 หมู่ 6 ถนนเอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน กรุงเทพฯ

โทร. 415-0070, 415-2456, 4154402, 894-3258 Fax 415-2935

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยศรีไพศาล

สำนักงาน 578 ถนนวานิช 1 สำเพ็ง กรุงเทพฯ ตราพัด ตราไก่เหยียบโลก
โทร. 222-1540, 223-4477, 622-6778-9

ทำการผลิตถุงพลาสติกตราไก่เหยียบโลก ถุงในลอน P.P. ในลอนชนิดบรรจุของเย็น P.E.

แผ่นพลาสติกห่อของ P.S. และเชือกไนลอน จำหน่ายส่งและปลีก โดยราคาย่อมเยา

ขอสนับสนุน
วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยฉบับนี้
จาก

โรงเรียน อัญมณีวิทยา แผนกประถม

90/1 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม.

โทร. 675-6970

ขอแสดงความยินดี

การจัดทำ

วารสาร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ขอสนับสนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อภินันทนาการจาก

โรงเรียนวีรสุนทร

วีรสุนทรบริหารธุรกิจ (ภาคต่ำ)

ช.เพชรเกษม 108 ถนนเพชรเกษม หอนงค์างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
โทร. 808-3751, 445-4501

ด้วยอภินันทนาการ

จาก

โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา

ซอยเพชรเกษม 28 เขตภาษีเจริญ กทม.
โทร. 467-0521

ขอสนับสนุน

วารสาร


วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

เพื่อการวิจัย และพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์

เทคนิคน่ารู้เกี่ยวกับ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์



การประหยัดพลังงานและการใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่กำลังจะถูกส่งเสริมและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีข้อควรรู้หลายอย่างในด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เพราะนับได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ทีเดียวสำหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าตัวนี้


ปัจจุบัน บริษัท แสงมิตรอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตโคมไฟ และโคมไฟประหยัดพลังงานได้ดำเนินการผลิตบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยได้ร่วมกับทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์และฮาร์โมนิกส์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวหน้ามีคุณภาพแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานจากต่างประเทศได้ โดยปัจจุบันสามารถผลิตบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล อาทิ IEC 61000-3-2, IEC 60929, IEC 60928, VDE 0712, ANSI, CISPR 15, มอก. 1506-22541 และผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 885-2532 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

หลักการพื้นฐานบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมาใช้กับหลอดไฟซึ่งทำให้ประหยัดกำลังไฟฟ้าโดยรวม เมื่อเทียบกับการใช้บัลลาสต์แกนหลัก โดยเป็นอุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น และสามารถทำงานในย่านความถี่สูงๆ ได้เพิ่มขึ้น ทำให้การประยุกต์ใช้งานด้านความถี่สูงได้รับความนิยมมาก เพราะต้นทุนการผลิตต่ำลง ประสิทธิภาพสูงขึ้น ขนาดเบาและเล็กลง และหลักการทำงานเหมือนวงจรอินเวอร์เตอร์ ซึ่งมีความจำเป็น




ต้องใช้วงจรเรียงกระแส (Rectifier) ก่อน ทางด้านอินพุต ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้อาศัยหลักการนี้ จะเห็นว่า ประสิทธิภาพของวงจรโดยรวมจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพทางอินเวอร์เตอร์และประสิทธิภาพของวงจรเรียงกระแสด้วย ทั้งนี้ ประสิทธิภาพทางวงจรเรียงกระแสจะขึ้นอยู่กับระดับที่ตกคร่อมตัวอุปกรณ์ และขนาดกระแสอินพุต (Input Current) ดังนั้น กระแสอินพุตจึงเป็นปัจจัย หรือแพคเตอร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย



รูปที่ 1 หลักการพื้นฐานของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

โดยปกติแล้ววงจรเรียงกระแสมักจะใช้ไดโอดเป็นอุปกรณ์ในการทำงานแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งจะทำให้กระแสอินพุทในวงจรเรียงกระแสมีความผิดเพี้ยนไปจากรูปคลื่นไซน์ เนื่องจากผลของกระแสฮาร์โมนิกส์ ทำให้มีผลกระทบโดยทั่วไป เช่น ทำให้ค่าตัวประกอบกำลัง (POWER FACTOR) ต่ำลง เกิดการสูญเสียในระบบโดยรวมสูง เกิดการรบกวนต่อระบบสื่อสารและเครื่องมือวัดแรงดันของแหล่งจ่ายลดลง และอุปกรณ์ทางไฟฟ้ากำลังมีพิบัติลดลง (เช่น ขนาดสายไฟฟ้าใหญ่ขึ้น)



รูปที่ 2 วงจรเรียงกระแสชนิดใช้ไดโอด

ฮาร์โมนิกส์ที่เกิดจากความผิดเพี้ยนทางกระแสเนื่องจากวงจรเรียงกระแส

จากรูปที่ 2 แสดงวงจรเรียงกระแสที่ใช้ในวงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Ls แทนค่าความเหนี่ยวนำในแหล่งจ่ายที่เป็นผลมาจากการใช้ความถี่สูง จากวงจรถ้าพิจารณาที่กระแสอินพุท (is) เมื่อแยกองค์ประกอบของรูปคลื่นกระแส จะสามารถแยกได้เป็น 2 ชนิด คือ

- องค์ประกอบความถี่มูลฐาน (Fundamental Component : i_{s1})
- องค์ประกอบฮาร์โมนิกส์ (Harmonics Component : i_h)

นั่นคือกระแสอินพุทของวงจรเรียงกระแสจะเท่ากับผลรวมของกระแสมูลฐานและกระแสฮาร์โมนิกส์ แสดงในสมการที่ 1 ซึ่งถ้ากระแสฮาร์โมนิกส์มากขึ้นจะมีผลทำให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กมากขึ้น และกระแส rms สูงขึ้น

$$i_s = i_{s1} + \sum i_h \quad (1)$$

กำหนดให้ V_s คือค่า rms ของ V_s

I_s คือค่า rms ของ i_s

I_{s1} คือค่า rms ของ i_{s1}

โดย

$$I_s = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_s^2(t) dt} \quad (2)$$

เมื่อพิจารณากำลังไฟฟ้าหลักการพื้นฐาน กำลังไฟฟ้าจริงจะเกิดจากแรงดันและกระแสที่มีความถี่มูลฐานเดียวกัน

$$P = V_s I_{s1} \cos \Phi_1 \quad (3)$$

เมื่อ Φ_1 คือค่ามุมต่างเฟสระหว่าง V_s กับ I_{s1}

สำหรับขนาดกำลังไฟฟ้าเสมือน (Apparent power) คือ

$$S = V_s I_s \quad (4)$$

ดังนั้นค่าตัวประกอบกำลังสามารถหาค่าได้จาก

$$\frac{P}{S} = \frac{V_s I_s \cos \Phi_1}{V_s I_s} \quad (5)$$

โดยที่ $\frac{I_{s1}}{I_s}$ คือค่าความผิดเพี้ยน (Distortion Factor : DF)

$\cos \Phi_1$ คือค่า Displacement power Factor (DPF) เป็นค่ามุมต่างเฟสระหว่างแรงดันและกระแสที่มีความถี่มูลฐานเดียวกัน จากทฤษฎีข้างต้นเราจะเห็นว่าถ้ากระแสทางด้านอินพุทของวงจรเรียงกระแสผิดเพี้ยนจากรูปคลื่นไซน์มาก (DF มีค่าน้อยลง) จะทำให้ตัวประกอบกำลังมีค่าต่ำ ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง

ส่วนค่าความผิดเพี้ยนของกระแสโดยรวม (Total Current Harmonics Distortion : THD) สามารถหาค่าได้จาก

$$\% THD_i = \frac{100 \times \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_{sn}^2}}{I_{s1}} \quad (6)$$

ซึ่งในปัจจุบันสำหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในประเทศได้มีข้อกำหนดของคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดย กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กำหนดให้ค่าฮาร์โมนิกส์รวมของกระแสไฟฟ้าด้านเข้า (% THD) ไม่เกิน 25% ตามมาตรฐาน IEC 61000-3-2 หรือ EN 61000-3-2 หรือ VDE 0712 Part 23/25 หรือ aNSI หรือมาตรฐานเทียบเท่า แต่คาดว่าในอนาคตทางผู้ผลิตภายในประเทศเอง ต้องมีการพัฒนาให้ค่า THD_i ต่ำกว่านี้ ดังนั้นแนวทางการลดความผิดเพี้ยนของกระแสโดยรวมให้มีค่าน้อยลงสามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการกรองแบบพาสซีฟ (Passive Filter) และแอคทีฟ (Active Filter) แต่จากผลเสียของวงจรภายในแบบพาสซีฟเองในแง่ของขนาด, การสูญเสียและแรงดันตกคร่อม ประกอบกับราคาของอุปกรณ์โดยรวมของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (Semi-Conductor) มีแนวโน้มราคาที่จะต่ำลงจึงคาดว่า วงจรกรองแบบแอคทีฟ จะเข้ามาเป็นที่นิยมในอนาคตอันใกล้นี้ ตัวอย่างของการนำเอาเทคนิคของวงจรกรองแบบแอคทีฟมาใช้ก็คือ การเพิ่มวงจรทบระดับ (Boost Converter) เข้ามาใช้ประยุกต์เป็นตัวควบคุมตัวประกอบกำลังแสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งจะทำให้กระแสอินพุทของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีรูปคลื่นเข้าใกล้รูปคลื่นไซน์มากขึ้น จึงมีผลทำให้ค่าตัวประกอบกำลังมีค่าสูงขึ้นเกือบเข้าใกล้ 1 (หนึ่ง) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบรูปร่างคลื่นของแรงดันและกระแสทางด้านอินพุทของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ แบบที่ไม่มีวงจรกรอง และแบบที่มีวงจรกรองแบบแอคทีฟ ได้ในรูปที่ 4 และ 5

น้ำดื่มตรา...


AmTECH
REVERSE OSMOSIS SYSTEMS
DRINKING WATER

แอมเทค

น้ำดื่มสะอาด...มาตรฐานสากล



เพื่อสุขภาพ...และ
ชีวิตที่ปลอดภัย...
ของคุณ...และ
ครอบครัว



แอมเทค น้ำดื่มสะอาด มาตรฐานสากล ผลิตจากกรรมวิธีการกรอง ด้วยเทคโนโลยีขั้นทันสมัย จากประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยระบบการกรอง 3 ขั้นตอน ที่รับรองมาตรฐานโดยสถาบัน FDA จาก สหรัฐอเมริกา

- ระบบรีเวอร์สออสโมซิส ที่สามารถแยกสารละลายออก จากน้ำได้มากกว่า 95% โดยเยื่อกรอง เมมเบรน ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า .0001 ไมครอน
- ระบบโอโซน ที่สามารถทำลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค พร้อมทั้งยังย่อยสลายก๊าซ พิษ และกำจัดกลิ่นต่างๆ
- แสงอัลตราไวโอเล็ต ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย

บริษัท เอแอนด์เอ รุ่งโอพาร จำกัด


79/128-130 ซ.ประชาราษฎร์ 18 ถ.ประชาราษฎร์

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 526-8715, 526-2006

AmTECH
REVERSE OSMOSIS SYSTEMS
DRINKING WATER


Water Quality
ASSOCIATION
MEMBER NO. 1003684




ตราชอระต้าย

วันเดอร์ เอิร์ท


WONDER EARTH



รูปที่ 3 แสดงการทำงานของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แบบมีการแก้ตัวประกอบกำลัง




รูปที่ 4 ไม่มีวงจรกรอง



รูปที่ 5 มีวงจรกรองแบบแอคทีฟ

รูปที่ 4 และ 5 แสดงแรงดันและกระแสทางด้านอินพุตของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์



บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดที่มีวงจรกรองแบบแอคทีฟ, กระแสฮาร์โมนิกส์ต่ำ และมีคุณภาพสูงที่ได้นำเสนอข้างต้นนั้น เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท แสงมิตรอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด สำหรับท่านที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทโดยตรง สำหรับโอกาสต่อไปทางบริษัทจะได้นำเสนอผลกระทบของ EMC (Electromagnetic Compatibility), EMI (Electromagnetic Interference), RFI (Radio Frequency Interference) หรือ noise ที่เกิดจากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบวงจรกรองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI Filter) ซึ่งหัวข้อดังกล่าวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาต่อไปสำหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์




**SAENGMITR
GROUP**




มอก. 902-2532
มอก. 903-2532


มาตรฐานโลก ISO 9001



โคมฟลูออเรสเซนต์



บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์



โคม PROFILE MIRROR LOUVER TYPE



ดาวนไลท์

ผู้ผลิตโคมไฟและบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ รายแรกของไทย ที่ก้าวสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเสมอมา ทำให้เราก้าวขึ้นสู่มาตรฐานระดับสากล ISO 9001 และ ISO 9002 ที่ทั่วโลกยอมรับ โดยเฉพาะ ISO 9001 ที่สุดยอดครอบคลุมครบทั้งมาตรฐาน คุณภาพ การออกแบบ การผลิต และการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีสม่ำเสมอ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

☒ ISO 9001 CERTIFIED
☒ ISO 9002 CERTIFIED

ISO 9001 Registered QMS



CERTIFICATION NO.99-1058



Accredited by
the Dutch Council
for Accreditation



Accredited by
the Standards Council
of Canada



Delight ชูรักช่อสิงห์

บริษัท รุ่งแสงฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (โรงงาน)
RUNGSANGFAH ELECTRIC CO., LTD. (FACTORY)

77/25 หมู่ 11 ถนนสวนผัก เขตคลองจั่น กรุงเทพฯ 10170
TEL. (662) 424-3964, 435-0464, 435-4254, 882-0545-7,
882-1654, 882-1656
FAX : (662) 435-0474, 882-0548, 882-1655

บริษัท แสงมิตร อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
SAENGMITR ELECTRIC CO., LTD.

984/33-34 ถนนพระราม 6 (อู่พงษ์ตัดใหม่)
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
TEL. (662) 215-6318 (10 คู่สาย) 215-7079, 215-8335, 215-8405,
215-7387-9, 613-7941-2
FAX : (662) 613-7943, 216-6498, 216-7074
E-mail : saengmit@samart.co.th

บริษัท พรีเมียร์ โมดูลซิส จำกัด

399 ถนนสุข 39 (ซอยอนาวิล) สุขุมวิท 77 สวนหลวง กทม. 10250


โทร. 721-5630, 721-4773 Fax : 321-8987

จากรังสีอัลตราไวโอเลต ด้วยฟิล์มนิรภัย


จาก

ประเทศ


ญี่ปุ่น



網入りガラス




ルミクール貼りガラス



08-S4-A




08-S5-A



: ฟิล์มฟ้า NONE GLAIR

FROSTED FILM

: ฟิล์มกันลื่น SLIPFILM



บริการด้วยน้ำใจไมตรี

ฟิล์มอาคาร 60 % 80 %

METALIC FILM, NON METALIC FILM

FROSTED FILM

(ฟิล์มฝ้าสำหรับงานตกแต่งภายใน)

ด้วยความปรารถนาดี

จาก

ประธานกรรมการบริหาร อบต. บางโกลน

นายบุญช่วย ศาสตร์ประเสริฐ

จ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 750-8740, 750-8741 ต่อ 211



IRQ บริษัท อัยเรศอีควิปเมนท์ จำกัด

56/151 ม.4 ถ.รามอินทรา แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร. 518-2969, 919-0107-8, 955-3360 แฟกซ์ 919-0108

ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด

งานโลหะ, เหล็ก, อลูมิเนียม
STEEL, METAL & ALUMINIUM

Mass Production

ผลิตชิ้นส่วนงานกลึงโลหะและอโลหะ
ทุกชนิดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป



วิรัช กิจสวัสดิ์
VIRACHAI KITSAWAS
Managing Director



บริษัท วิรpati บริษัท จำกัด

VIRAPAT PRECISION CO., LTD.

161/44 Moo 9, Viphavadi-Rungsit Rd, Srigun, Donmuang, Bangkok 10210

Tel. (622) 533-5990, 996-7989 Fax : (622) 533-5990



วท. บันทึก

วท. บันทึก

วท. บันทึก

“ วท.กับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ”

วรุตม์ ทวีศรี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กำหนดหลักการสำคัญอันผูกพันหน่วยงานของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้อย่างน้อยสามประการ ดังนี้

มาตรา 58 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจการใด ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ


มาตรา 34 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นกฎหมายรองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนจะสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องโปร่งใส ตรงกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ต่อมาเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ

วท. ในฐานะหน่วยงานของรัฐตระหนักถึงสิทธิของประชาชน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติข้อมูลฯ และนโยบายของรัฐบาลข้างต้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด โดยมอบ





วท. บัณฑิต

หมายเร่งรัดให้มีหน้าที่และวางแผนดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินการกิจด้วยความโปร่งใสของ วท. ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่มีอายุกว่า 36 ปี แห่งนี้

ปัจจุบัน วท. ได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมเกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหลายประการที่สำคัญดังนี้

1) การจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของ วท. โดยได้เรียนเชิญวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บรรยาย

2) จัดระเบียบ วท. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

3) กำหนดกรอบการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

4) จัดหมวดหมู่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมาย

5) วท. จัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการกำหนด ทั้งนี้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าถึงค้น หรือใช้บริการได้ในวัน-เวลาราชการ ณ ห้องข้อมูลข่าวสาร ราชการ อาคารอำนวยการ 1 วท. เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 5791121-30 ต่อ 1107, 1108, 1008

6) นำข้อมูลข่าวสารลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในส่วนโครงสร้างและการจัดองค์กรของวท.

7) การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับการตรวจสอบและทบทวนผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติในรอบ 1 ปี

8) การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการในวาระครบรอบ 2 ปี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

9) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลฯ ประจำหน่วยงาน เพื่อวางระบบการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เห็นเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น

10) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

11) จัดทำแผนโครงการประชุมสัมมนา ฝึกอบรมและแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงาน วท. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รองรับบริการแก่ประชาชน

จนถึงวันนี้ ความมุ่งหมายของกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล ภายใต้คำขวัญ **“รัฐรู้สิ่งใด ประชาชนมีสิทธิรู้สิ่งนั้น”** เริ่มเห็นผลเด่นชัดในทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของประชาชนและสังคมต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้น

ดังนั้น การที่ประชาชนมีโอกาสร่วมกันในการรับข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนควรให้ความสนใจและใช้สิทธิตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ที่สำคัญจะเป็นการปกป้องรักษาประโยชน์ของประเทศชาติอีกทาง

“วท.พร้อมแล้วที่จะให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. “



เปิดประตู...ฯ

ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย (ศบอ.)

ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย (ศบอ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) เป็นแหล่งข้อสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ ศบอ. สามารถอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารแก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของผู้ใช้ที่จะต้องหาข้อสนเทศที่จำเป็นต่างๆ ด้วยตนเอง

กองบริการสารสนเทศ (กบส.)

กบส. เป็นแหล่งรวมทรัพยากรอันมีค่า ได้แก่ หนังสือ ตำรา รายงานทางวิชาการ มาตรฐาน วารสารและสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นจำนวนมาก

กบส. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO 9002 จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) เมื่อเดือนมิถุนายน 2541 จากการบริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผ่านระบบ Internet


บริการอื่นๆ ของ กบส. ได้แก่

- บริการรายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
- บริการแปลเอกสาร
- บริการจัดทำบรรณานุกรม
- บริการจัดส่งเอกสาร (Document Delivery)
- บริการเลือกสรรข้อสนเทศ และเผยแพร่เฉพาะบุคคล

(SDI)

- บริการถ่ายสำเนาเอกสาร
- บริการรายชื่อหนังสือและวารสารใหม่
- บริการสารบัญของวารสารใหม่
- บริการแฟ้มข้อสนเทศ (Information Files)
- บริการจัดพิมพ์วารสารสาระสังเขป และดัชนี ผล

งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กองผลิตและเผยแพร่สารนิเทศ (กผส.)

เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ วท. กองผลิตและเผยแพร่สารนิเทศ มีหน้าที่ดังนี้คือ

- จัดพิมพ์และออกแบบด้านอาร์ตเวิร์ครายงานวิชาการและสิ่งพิมพ์อื่นๆ จากทุกหน่วยงานของ วท. และรายงานการประชุมสัมมนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะรูปเล่มและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการใช้ศัพท์ตามวิธีกำหนดโดยราชบัณฑิตยสถานสำหรับสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย

- รวบรวมแถบวิดิทัศน์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานทั่วไป

งานบริการจัดพิมพ์รายงานวิชาการ ซึ่งเป็นงานหลักของกองผลิตและเผยแพร่สารนิเทศได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 จากบริษัท Bureau Veritas Quality International (BVQI) เมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นการรับรองว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ



สถานที่ติดต่อ

สนใจขอใช้บริการโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย (ศบอ.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900

โทร. 579-5515 ต่อ 1231, 579-8594 แฟกซ์ : 579-8594


E-mail Address : tndc@mozart.inet.co.th Web Site : www.tistr.or.th



ตู้จดหมาย ตู้จดหมาย ตู้จดหมาย

196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

E-mail : TNDC @mozart,inet.co.th



คอลัมน์ “**ตู้จดหมาย**” ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านผู้อ่านซึ่งได้ส่งจดหมายแจ้งมาถึงการนำข้อมูลในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ทำให้คณะผู้จัดทำเกิดความยินดี และประสงค์จะเห็นการนำข้อมูลข่าวสารในวารสารนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและแพร่หลายมากขึ้น

“**ตู้จดหมาย**” จึงขอน้อมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากท่านผู้อ่านเพื่อที่คณะผู้จัดทำจะสามารถนำไปปรับปรุงให้ “**วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**” ของเราเป็นวารสารที่ควรค่าแก่การอ่านอย่างแท้จริง สมดังที่ผู้อ่านให้ความสนใจมาตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี

13 กุมภาพันธ์ 2543

เรียน คณะบรรณาธิการ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วย ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายไปขอหนังสือในส่วนที่พิมพ์ขาดหายไป บัดนี้ ข้าพเจ้าได้รับหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้อ่านบทความดังกล่าวในส่วนของสิ่งแวดล้อม และนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนและสอบกลางภาคแล้ว

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณทางคณะผู้จัดทำเป็นอย่างสูงที่ให้ความเอาใจใส่กับสมาชิกและจัดทำหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับผู้อ่านเป็นอย่างดี

ด้วยความเคารพและขอบพระคุณอย่างสูง

น.ส. นภาพร นิ่มสุวรรณ



007

เชื่อมสัมพันธ์คนไทยกับเพื่อนบ้าน
กับพม่า ลาว มาเลเซีย

หมดปัญหาเสียงก้องวันนี้ โทรทางไกลไปกัมพูชา กดรหัส 007
หมดปัญหาเสียงก้องวันนี้ โทรทางไกลไปกัมพูชา กดรหัส 007
หมดปัญหาเสียงก้องวันนี้ โทรทางไกลไปกัมพูชา กดรหัส 007



หมดปัญหาเสียงก้องวันนี้ โทรทางไกลไปกัมพูชา กดรหัส 007
หมดปัญหาเสียงก้องวันนี้ โทรทางไกลไปกัมพูชา กดรหัส 007
หมดปัญหาเสียงก้องวันนี้ โทรทางไกลไปกัมพูชา กดรหัส 007

หมดปัญหาเสียงก้องวันนี้ โทรทางไกลไปกัมพูชา กดรหัส 007

007 รหัสโทรทางไกลอัตโนมัติ ขององค์การโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วย FIBER OPTICS เชื่อมโยงการรับ-ส่งข้อมูล รวดเร็ว เสียงไม่ก้อง ไม่ดีเลย์ ทุกครั้งที่โทรไปยังประเทศกัมพูชา สู่ความคมชัดที่ก้าวล้ำ จนหูคุณบอกได้ถึงความแตกต่าง

โทรไปกัมพูชา กด 007+855 (รหัสประเทศ)+รหัสเมือง/รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่+เลขหมายปลายทาง
โทรไปพม่า กด 007+95 (รหัสประเทศ)+รหัสเมือง/รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่+เลขหมายปลายทาง
กลางวัน (07.00 - ก่อน 18.00 น.) นาทีละ 30 บาท
กลางคืน (18.00 - ก่อน 07.00 น.) และวันอาทิตย์ทั้งวัน นาทีละ 24 บาท

007

รหัสทางไกลอัตโนมัติ
จากไทยสู่ กัมพูชา พม่า ลาว มาเลเซีย



องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ฝ่ายโทรคมนาคมต่างประเทศ โทร. (02) 505-3491-3

สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง

ชสท. ยึดมั่นหลักสหกรณ์ เอื้ออาทรมวลสมาชิก



ตราพระอาทิตย์

30th
ANNIVERSARY

22 พ.ค. 2543 วันครบรอบ 30 ปี
บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด

จำหน่ายปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ตราพระอาทิตย์, ปุ๋ยรัฐบาล, วัสดุการเกษตร
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร ผลิผลทางการเกษตรทุกชนิด

จำหน่ายข้าวสาร คุณภาพดี ราคาถูก
รับพิมพ์งานและจำหน่ายแบบพิมพ์ทั่วประเทศ





ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

79 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 โทร. 5614567, 5614590-6 Fax : 9411230

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด

518/5 อาคารบนิยาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถ.เพลินจิต กทม. 10330 โทร. 2548301-7 โรงงาน 185 สุขุมวิทสาขาท่า ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 3239147

อภินันทนาการจาก




บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด ARCHITECTS ONE HUNDRED AND TEN CO., LTD.

3388/70-71 ชั้น 20 อาคารสิรินรัตน์ ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 367-5788(18 สาย) โทรสาร 367-5074-5
3388/70-71 20th FL.SIRINRAT BLDG. RAMA IV ROAD, BANGKOK 10110 THAILAND, TEL 367-5788 (18 LINES) FAX : (662)367-5074-5

E-mail : arct110@zyberzone.com



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
THE BANGKOK IRON AND STEEL WORKS CO., LTD.



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กลวดชนิดมีราตูลาร์บอนต่ำ

มอก. 348-2540
(JIS G 3505)

ตารางที่ 1 ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

ขนาด มม.	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	11	12	13	14	15	16
เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อน	1) TOLERANCE ± 0.40 mm. 2) OUT-OF-ROUND 0.64 mm. max.															

ตารางที่ 2 สัญลักษณ์และส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากเบ้า

สัญลักษณ์	ส่วนประกอบทางเคมี ร้อยละ			
	คาร์บอน	แมงกานีส	ฟอสฟอรัส	กำมะถัน
SWRM 6	สูงสุด 0.08	สูงสุด 0.60	สูงสุด 0.040	สูงสุด 0.040
SWRM 8	สูงสุด 0.10	สูงสุด 0.60	สูงสุด 0.040	สูงสุด 0.040
SWRM 10	0.08 ถึง 0.13	0.30 ถึง 0.60	สูงสุด 0.040	สูงสุด 0.040
SWRM 12	0.10 ถึง 0.15	0.30 ถึง 0.60	สูงสุด 0.040	สูงสุด 0.040
SWRM 15	0.13 ถึง 0.18	0.30 ถึง 0.60	สูงสุด 0.040	สูงสุด 0.040
SWRM 17	0.15 ถึง 0.20	0.30 ถึง 0.60	สูงสุด 0.040	สูงสุด 0.040
SWRM 20	0.18 ถึง 0.23	0.30 ถึง 0.60	สูงสุด 0.040	สูงสุด 0.040
SWRM 22	0.20 ถึง 0.25	0.30 ถึง 0.60	สูงสุด 0.040	สูงสุด 0.040

เหมาะสำหรับการใช้ชนิด : ลวดผูกเหล็ก, ลวดเหล็ก, ลวดคาน้ำ, ลวดหนาม, ลวดชุบสังกะสี, ตะปู,
ตะแกรงลวดเหล็กเสริมคอนกรีต และอื่นๆ

ตารางที่ 3 JIS G 3503

Class	Chemical Composition (%)					
Symbol	C	Si	Mn	P	S	Cu
SWRY 11	0.09 max.	0.03 max.	0.35 to 0.65	0.020 max.	0.023 max.	0.20 max.
SWRY 21	0.10 to 0.15	0.03 max.	0.35 to 0.65	0.020 max.	0.023 max.	0.20 max.

เหมาะสำหรับการใช้ชนิด : ลวดเชื่อมไฟฟ้า

WORLD FAMOUS BEAUTY PRODUCT BRANDS THROUGH ILC'S WORLD CLASS CUSTOMERS



Being committed to produce many worldwide cosmetic leading brands, ILC is determined to create the products that satisfy our customers by concentrating on quality, price and service.

ILC with more than 25 years of history and expertise is proud to be named as the largest Cosmetics Private Contract Manufacturer among the South East Asian Countries. It has attained the International GMP Standards and soon to be followed by ISO 9002 which is the Certificate of Quality Assurance for Global Market.



INTERNATIONAL LABORATORIES CORP., LTD.

HEAD OFFICE AND FACTORY : 549/2 SOI SAENG SUK SADHUPRADIST RD. YANNAWA BANGKOK 10120

TEL : (662) 2940091 FAX: (662) 2944479

BANGNA FACTORY : 62 MOO 8 BANGNA-TRAD RD. KM.18, BANGCHALONG BANGPLEE SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND.

TEL: (622) 3371791-9 FAX: (662) 3371348

Homepage : <http://www.ilc.co.th> E-MAIL NO. : interlab@lox1.loxinfo.co.th



ผู้ผลิตท่อคืบได้คืบ Jacking Pipe ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 - 3000 มม. สำหรับโครงการบำบัดน้ำเสีย จังหวัดสมุทรปราการ




THAI REUNG INDUSTRY CO., LTD.

บริษัท ไทยเรื่องอุตสาหกรรม จำกัด THAI REUNG INDUSTRY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 391 ถนนสิรินธร บางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700

โรงงาน : 413 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท กม.50 บางปู สมุทรปราการ 10550 โทร. 707 - 7420 - 3 โทรสาร 707 - 7424



หวานบริสุทธิ์ไร้สารฟอกสี

น้ำตาลมิตรผล ทุกเกล็ดดีต่อสุขภาพ



ลุ้น

รับโชคทันที
กับพ่อนกานา

ลุ้นรับทันที

โทรศัพท์มือถือ NOKIA 3210
จำนวน 100 รางวัล




ลุ้นส่งชิงโชค

กระเป๋าเป้สะพาย
จำนวน 500 รางวัล



รวมของรางวัล 600 รางวัล เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,968,000 บาท จักรางวัลวันที่ 20 ก.ค. 2543 ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ บมจ.ยูโนเต็ดฟูดส์ วันที่ 31 ก.ค. 2543 เริ่มลุ้นรับโชควันที่ 15 มี.ค. 2543 หมวดเขต 15 ก.ค. 2543 และ
หมวดเขตในการรับรางวัล 15 ส.ค. 2543 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บมจ.ยูโนเต็ดฟูดส์ โทร.415-0035



หมดเขตวันที่ 15 กรกฎาคม 2543



LSV



ฟอร์ดเรนเจอร์ แรงแรงแซงทันใจ ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าในเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี 12 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ประหยัดน้ำมันแต่ได้แรงม้าได้สูงสุดถึง 116 ตัว ให้แรงบิดสูงถึง 277 นิวตัน-เมตรที่รอบต่ำเพียง 2,000 รอบต่อนาที แรงที่สุดในเครื่องยนต์ขนาดเดียวกันและเครื่องยังเดินเรียบ เมาใหม่หมดจด ไม่สร้างมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม • ถุงลมนิรภัยคู่* • เบรก ABS* • คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง • โครงสร้างนิรภัย RBS มาตรฐานผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกา • ช่วงล่างแกร่งได้มาตรฐานส่งออกทั่วโลก



พิสจน์ ๕๔" i . √B ที่ผู้จำหน่ายฟอร์ดทั่วไทย

*†‡̂ιπ̃ϑ̄^αλ̇αε' ρ>...



פפדוא



เพียงนำต้นแบบสีที่ต้องการมายัง ศูนย์สีจอตัน มัลติคัลเลอร์ (JOTUN MULTICOLOR)
ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเหนือใคร จึงผสมสีสำหรับบ้าน...ตามที่คุณต้องการโดยใช้เวลาเพียง 3 นาที
▪ มีบริการตกแต่งเจดสีห้องตัวอย่างต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (Color Advisor)



Jotun Paints



ขอเชิญไป
ศูนย์สี JOTUN
MULTICOLOR
3 นาที




JOTUN
HOTLINE โทร.

655-6313

จันทร์ - ศุกร์ : 8.00 - 16.30 น.

โลกแห่งสี สันนิบาต 10,000 สี



CELLULAR
900

2 DIGITAL
GSM
WATTS