

มาทำความรู้จักกับ

เห็ดไข่หงส์

หรือ

เห็ดก้อนฝุ่นเหลืองทอง





เห็ดก้อนฝุ่นเหลืองทอง หรือ เห็ดไข่หงส์

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Scleroderma sinnamariense* Mont. *Scleroderma citrinum* Pers. (เห็ดไข่หงส์)

การใช้ประโยชน์: รับประทานไม่ได้ จัดอยู่ในกลุ่มเห็ดพิษ

หมวก รูปกลม สีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 6 เซนติเมตร สูง 2 – 3 เซนติเมตร ด้านบนแบนลงเล็กน้อย

ผิวแตกเป็นเกล็ดใหญ่ โคนมีเส้นใยหยาบเป็นกระจุกยึดติดกับดิน(สีนวลขาว) เปลือกหนา 3 – 4 มิลลิเมตร เมื่อดอกเห็ดแก่ด้านบนปริแตกออก

สปอร์ ภายในดอกเห็ดสีม่วงน้ำตาลบรรจุอยู่ รูปกลม ผิวขรุขระเป็นร่องแห เห็ดชนิดนี้ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวใกล้กัน และกระจายทั่วไปในป่า

เป็นเห็ดพิษทำให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน ไม่ควรรับประทานทั้งดิบและสุก



[เห็ดไข่หงส์ - ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์](#)

แหล่งที่มาของข้อมูล : <http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view3.aspx?id=12264>

เมื่อดอกเห็ดแก่ด้านบนปริแตก
ออกภายในดอกเห็ดสีม่วงน้ำตาล
บรรจุอยู่ รูปกลม ผิวขรุขระเป็น
ร่องแห เห็ดชนิดนี้ขึ้นเป็นดอก
เดี่ยวใกล้กัน และกระจายทั่วไป



[เห็ดไข่หงส์ - ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพจลนทรีย์](http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view3.aspx?id=12264)

แหล่งที่มาของข้อมูล : <http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view3.aspx?id=12264>

เป็นเห็ดพิษ ทำให้เกิดอาการ
คลื่นไส้และอาเจียน ห้าม
รับประทานทั้งดิบและสุก(ดอกเห็ด
คล้ายเห็ดหำพานที่รับประทานได้
ต้องระมัดระวังในการเก็บ)



[เห็ดไข่หงส์ - ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์](http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view3.aspx?id=12264)

แหล่งที่มาของข้อมูล : <http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view3.aspx?id=12264>