

มาทำความรู้จักกับ

เห็ดเผาะดาว

28/08/2014 07:43





เห็ดเผาะดาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Geastrum saccatum* (Fr.) Fischer. .

ชื่ออื่น : เห็ดดาว

การใช้ประโยชน์: ยังไม่มีข้อมูล

แหล่งที่พบ

พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 30°C ความชื้นสัมพัทธ์ 88% pH 6 ความเข้มแสง 605 Lux พบตลอดฤดูฝน

ลักษณะการเกิด

เกิดดอกเดี่ยวอยู่กันเป็นกลุ่ม 3-5 ดอก กระจายอยู่ทั่วไปบนพื้นดินในบริเวณป่าโปร่ง

ลักษณะสัณฐานวิทยา

ดอกเห็ดมีลักษณะกลม กว้าง 3 เซนติเมตร ผนังชั้นนอกแผ่เป็นรูปดาว กว้าง 5 เซนติเมตร ผิวเรียบ สีครีม ผนังชั้นในเรียบหรือคล้ายกำมะหยี่สีน้ำตาลแก่ ปลายบนของช่องสปอร์ มียอดทรงสูงเรียวแหลมสีน้ำตาลแก่ คล้ายทรงกระสวย เส้นใยรังสปอร์สีน้ำตาลทอง เนื้อเยื่อชั้นนอกสร้างสปอร์สีน้ำตาลแก่คล้ายสีของกาแฟ โคนแผ่กว้างทรงกลมขนาด 2-4 มิลลิเมตร มีส่วนที่คล้ายราก มีเส้นใยสีขาว

ลักษณะสปอร์ สีน้ำตาลดำ ผิวสปอร์ขรุขระ





แหล่งที่พบ

โดยมักขึ้นบนซากเศษขอนไม้ผุทับถมกัน
หรือเกิดบนขอนไม้ผุ

เกิดดอกเดี่ยวอยู่กันเป็นกลุ่ม 3-5
ดอก กระจายอยู่ทั่วไปบนพื้นดินใน
บริเวณป่าโปร่ง



บริเวณกลางดอก มีลักษณะเป็น
ก้อนกลมอยู่กลางดอกเห็ด ซึ่ง
เป็นที่เก็บสปอร์และฟุ้งกระจาย
ตามลมเป็นการกระจายพันธุ์ใน
พื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดเป็นเห็ดดอก
ใหม่

ลักษณะสปอร์ สีน้ำตาลดำ ผิว
สปอร์ขรุขระ




ดอกเห็ดระยะแก่ผนังด้านนอก
ดอกเห็ดแตกออกเป็นแฉก



ดอกเห็ดมีลักษณะกลม



ผนังชั้นนอกแผ่เป็นรูปดาว กว้าง
5 เซนติเมตร ผิวเรียบ สีครีม



แหล่งค้นคว้าข้อมูล

http://www.biogang.net/plant_view.php?uid=45964&id=177452

บัญชีภาพถาวรรมป่าไม้



ให้ดูเผาะดาว

ยังไม่มีข้อมูลว่ารับประทานได้

28/08/2014 07:43



ขอขอบคุณค่ะ

ไว้ติดตามชมชุดต่อไป